

F. Zuliani - Gibellini

55328/B

ZULIANI - GIBELLINI, Francesco

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Gibellini', with a stylized, cursive script.

DE APOPLEXIA
PRÆSERTIM NERVEA
COMMENTARIUS



B R I X I Æ



EXCUDEBANT FRATRES PASINI

SUPERIORIBUS ANNUENTIBUS

M. DCC. LXXXIX.

B. Luigi Langenotti

THE HISTORY OF THE
ROYAL SOCIETY OF MEDICAL AND NATURAL PHILOSOPHY
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
FROM ITS INSTITUTION IN 1662 TO THE PRESENT TIME
BY
JOHN HENRY WELLS, ESQ.
F.R.S.
LONDON:
PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1773.




LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

FRANCISCUS ZULIANIUS

MEDICUS BRIXIENSIS.



ueruntur homines passim, apoplexiam in præsentia plus, quam antea actis temporibus sævire in humanum genus. Hoc autem, quod malo quodam fato non videtur inficiandum, etiam Medici quidam haud parvi faciendi affirmare non verentur. Quid plura? Nunc apoplexia grassatur adeo, quibusdam præsertim locis, ut, nec injuria, visa sit epidemica. Quod si qui dubitent, an apoplexia vere sanguinea evaserit hoc sæculo crebrior, id de nervosa negari nequit omnino. Certum enim est, magis hac, quam alia ulla

ætate superiore generatim dominari nervorum morbos, inter quos haud raro maximus est apoplexia. Quæ quum ita comperiantur se habere, haud mihi videor improbandus, si quæ ægrotos invisens, ac sedulo observans, de hoc morbo collegerim, quæque de scriptis Auctorum nobilium decepserim, hoc commentariolo pro meis viribus exponam.

At mihi de nervea quidem apoplexia differenti videbatur haud esse incongruum, siquid de sanguinea adderem, deque serosa: de quibus fateor sane, me dixisse plus, quam prius statueram; quum disquisitioni meæ neutra præcipue esset objecta. Haud tamen pœnitet. Quibusdam enim proderit forsitan, si unus, & idem libellus præter illa, quæ speciatim ad nerveam apoplexiam spectant, ea quoque exponat, quæ ad cognoscendam,

curandamque generatim apoplexiam apta sint.

Quin forte urgeret necessitas, in proprio capite quasdam spasmodicæ apoplexiæ causas exposui. Id tamen ideo præstiti, quod istæ causæ discriminantur nimis, ac nimis diversam exigant curationis methodum.

Alicui forte videbor arguendus, quod sim locutus diffusius de apoplexia ex vaporibus mephiticis oriente, quum de ipsa differuerint quam diligentissime Scriptores plerique. At num in manibus omnium versantur illorum commentaria?

Inquirebam præterea aliquantulum diligentius de thermarum usu pro ea paralyfi, quæ apoplexiam excipit quamcumque. Id enim pro aliquibus haud penitus inutile duxi. Postremo tandem, ut morem sigillatim gererem junioribus Me-

dicis, nonnulla subdidi de vi electrica,
deque ejus administratione, de quibus in
præfens tot, ac tanta differunt Physici.
Utinam labor meus, quicunque demum
sit, aliquibus auxilietur ita, ut, quan-
tum per me fieri potest, mortalium pro-
vehat commodum vitamque proferat.
Vale.



I N D E X

C A P I T U M.

CAP. I. De Apoplexia in genere.	Pag. 1
CAP. II. Apoplexiæ sanguinæ indicia, ejusque causæ aliquæ: additur quoque de apoplexia ex sanguinis dissolutione, fluidique elastici extricatione.	12
CAP. III. Indicia Apoplexiæ serosæ, sive lymphaticæ.	42
CAP. IV. De Apoplexia convulsiva, sive nervea.	45
CAP. V. De Signis Apoplexiæ Nerveæ.	49
CAP. VI. In quo discriminentur Apoplexia Nervea præsertim mere convulsiva, Suffocatio hysterica, & Epilepsia.	72
CAP. VII. Apoplexiæ Nerveæ Divisio in idiopathicam, & in sympathicam.	78
CAP. VIII. Causæ exponuntur Apoplexiæ Nerveæ, præsertim idiopathicæ.	82
De Apoplexia ex vaporibus Mephiticis.	104
CAP. IX. De Apoplexia, quæ ex acrimonia oritur aliquando.	112
CAP. X. De Apoplexia, quæ oritur ex dolore quascunque corporis partes occupante.	116
CAP. XI. De Apoplexia, quæ oritur ex exinanitione.	119
CAP. XII. De Apoplexia Nervea sympathica, sive consensuali.	125
CAP. XIII. De Apoplexia signanter Biliofa, quæ inter Sympathicas frequentior observatur.	140
De Apoplexia ex febris intermittenti.	161
CAP. XIV. De Apoplexia Sympathica ex causis pectori insidentibus.	163

CAP. XV. Prognosis.	Pag. 171
CAP. XVI. De Curatione Apoplexiæ sanguineæ.	175
CAP. XVII. De Curatione Apoplexiæ serosæ.	195
CAP. XVIII. Ratio curandi Apoplexiam Nerveam Sympathicam, five Consensualem, & primo quidem Biliosam, five Saburralem.	202
CAP. XIX. Ratio curandi Apoplexiam a febris intermittente exortam.	219
CAP. XX. Ratio curandi Apoplexiam ex hypochondriaci, atque ex difficultate tum fluxus menstrui, tum hæmorrhoidalis, & etiam ex podagra abdominalibus nervis insidente.	226
CAP. XXI. Ratio curandi apoplexiam ex venenis per os sumptis, fungis, Opio, aliisque similibus.	231
CAP. XXII. Ratio curandi Apoplexiam, quam faciunt vapores Mephitici.	236
CAP. XXIII. Ratio medendi Apoplexiæ, quæ ex petore male affecto exoritur.	242
CAP. XXIV. Ratio medendi Apoplexiæ Nerveæ idiopathicæ, & primo illi, quæ a summa præcipue nervorum sensibilitate, ac mobilitate exoritur.	243
CAP. XXV. Curatio Apoplexiæ, quam peculiariter diximus Sensorii Communis.	254
CAP. XXVI. Curatio Apoplexiæ, quæ ex dolore originem ducat.	256
CAP. XXVII. Curatio Apoplexiæ, quæ oritur ex exinanitione.	258
CAP. XXVIII. Curatio Apoplexiæ ex acrimonia.	262
CAP. XXIX. Ratio curandi paralyfim, quæ Apoplexiam generatim consequitur.	264



APOPLEXIÆ

PRÆSERTIM NERVEÆ

COMMENTARIUS .



CAP. I.

De Apoplexia in genere .

I. **A**poplexiam sicuti Authores multimodis vocant, ita multimodis quoque definiunt. Arduum quidem est morbos haud paucos recta definitione circumscribere: hæc enim complecti debet præcipua morbi symptomata, quibus ille possit distingui ab aliis morbis, atque dignosci. At difficile est paucis perstringere apoplexiæ symptomata; tum quia multiplicantur nimis & ex varietate causarum, & ex diversitate morbi graduum; tum quia ex iis plura aliorum morbo-

A

rum assimilantur symptomatibus. Haud ergo mirandum, si ab Authoribus variimode definitur apoplexia.

2. Plures itaque inter definitiones magis illæ videntur congruere, quas tradunt MORGAGNUS, atque SCHROEDERUS. Hic apoplexiam describens asserit esse *resolutionem, sive magnam imminutionem virium nervosarum, quoad mentis universum cum suo corpore commercium, aut quoad omnes fere corporis functiones animales, vitalibus sæpe manifestius perseverantibus* (a). Hæc autem definitio cuilibet apoplexiæ gradui videtur accommodata. MORGAGNO vero apoplexia visa est *intimorum, qui in cerebro fiunt, motuum (cum videlicet movemus, sentimus, cogitamus) subita imminutio, tanta interdum, ut proxime ad cessationem accedat, aut in cessationem continuo transeat* (b); quæ quidem definitio plerisque atridet: alicui tamen difficultatem faciunt tum hujusmodi motus intimi, tum ratio, præcipue vero celeritas summa, qua illi imminuuntur: hanc enim haud satis congruere cre-

(a) Differt. De Apoplexiæ e Præcord. vitiis origine.

(b) De Sedib. & Causis Morb. Epist. II. n. 5.

dunt ei apoplexiæ, quæ lente, ac gradatim succrescit.

3. Tres interim apoplexiæ gradus observant Medici. HOFFMANNUS (c) eum vocat maximum gradum; in quo cum sensibus, motibusque animalibus vitales simul, omnesque totius corporis actiones uno impetu prosteruntur: medium, qui tollit sensuum, motuumque voluntariorum, atque rationis usum, non autem vitales posternit actiones: minimus, ait, iisdem ac secundus prodit se notis; differt tamen, quod breviori tempore depellatur. Alii vero tertium hunc statuunt gradum quando ægri procidunt motu voluntario ex parte abolito, sensibus tamen vel omnibus adhuc integris, vel saltem quibusdam tantum amissis.

4. Causæ efficientes eam, quam cum SCHROEDERO innuimus supra, resolutionem, imminutionemve virium nervosarum &c., plures esse possunt; internæ ex parte, ex parte externæ: sensibiles ex parte, ex parte insensibiles, quasque tantum assequi possumus conjectando.

5. Sensibiles inter offerunt se se sanguis , & serum , quum cerebrum occupant , uti plerumque ostendit cadaverum sectio : consulto enim externas causas hic omitto violentas , aliasque internas , uti abcessus , tumoresque varii generis cerebrum , cerebellum , medullamve oblungatam occupantes . Hinc binas morbi species distinguebant , sanguineam nempe , atque serosam .

6. Ast hæc divisio plerisque improbatur . Objiciebant enim præter sanguineam , & serosam alias plures observari apoplexiæ species : hujusmodi præterea divisio videbatur inutilis saltem quoad curationem morbi , quoniam certa defunt signa , quibus dignosci possit utrum a sanguine , an a sero exoriatur compressio . Addantur duo ; quæ distinctionem , quam supra innuimus , haud parum impugnare videntur : primum nempe , quod in cerebro plurimorum ex apoplexia vita functorum , nec sanguinis , nec feri observabatur aut in vasis nimia congestio , aut e vasis effusio , neque alia inveniebatur morbida cerebri immutatio : alterum tandem , quod vasis sanguine interdum , aut alio humore nimis exhaustis mortalis non minus exoriebatur apoplexia .

7. Signanter vero apoplexiam primario ferofam negaverunt plerique ante recentiora tempora, ut refert MORGAGNUS (d). MALPIGHIVS autem irridet, & BERGERUS eos improbat, qui serum incusant tanquam apoplexiæ causam, ut meminit TRALLES (e). Neque putant serum cerebro inventum apoplexiam gignere primario ferofam: asserunt enim ex cursu sanguinis perturbato in vasis cerebri, & ex intercepto ejus in venas reditu, serum ab ipso sejungi, illucque tradi, atque coacervari. Id autem, ajunt, observari in celebri experimento LOWERIANO: obstricta enim vena five jugulari, five crurali, five cava infra diaphragma, hydrops semper exoritur cerebri, crurisque, abdominisve.

8. Hisce etiam temporibus PORTALIUS CLARISSIMUS (f) negat apoplexiam existere vere ferofam; asseritque hanc effici a sanguinea, five morbum utrumque ab una gigni, eademque causa: Assumptum probare conatur observatio-

(d) Epist. Anat. Med. 2. n. 7.

(e) Usus Veficant. Salubr. & Noxius in Morbor. medela Sect. Poster. pag. 20.

(f) Giornale per servire alla Storia della Medicina di questo secolo Tom. IV. pag. 49. Venezia 1787.

nibus. Sectis enim eorum cadaveribus, qui e vita decesserant omnia prodentes signa apoplexiæ lymphaticæ, purum sanguinem unice invenit, aut e vasis cerebri effluxum, aut in ipsis congestum; nihil vero lymphæ, aut feri. Has inter observatione duæ, quæ sequuntur, institutæ fuerunt in duobus cadaveribus apoplecticorum, quorum primus jurisprudentiæ, alter militiæ vacabat.

Jurisconsultus morte correptus est omnia proferens signa apoplexiæ lymphaticæ; ipsi vero, vena nunquam contusa, emetica, purgantia, vesicatoria exhibuere. Sectum fuit cadaver post horas a morte quadraginta: evanescente enim post mortem gradatim pallore, facies ad naturalem colorem rediit, atque vividissimo rubore subinde tincta apparuit. At quo color fiebat vividior, eo magis augebatur cadaveris calor, qui post horas quoque viginti quatuor adhuc persentiebatur: hinc cadaveris sectio post horas quadraginta protrahabatur (1). Hanc tan-

(1) Præter hoc cadaver alia quoque alibi memorat PORTALIUS, inter quæ illud memorat cujusdam Cappucinatorum Monspessulanensium Superioris vera apoplexia sanguinea perempti, cujus cadaver, quum diu calens observarent,

dem perficientes, ut cautius agerent, tentarunt plantam pedis utriusque variis incisionibus, e quibus effluxit protinus notabilis copia fluentis sanguinis ruberrimique. In Calvariæ cavo invenerunt sinus Crassæ Meningis, præcipue laterales atro sanguine distentos vel maxime: venæ tam duræ, quam piæ Matris, ac vasa, quæ per anfractus cerebri dispertiuntur, totusque tandem plexus Choroides sanguine tumescebant. Tota Cranii basis patuit sanguine referta e vasis effluxo. Contra vero cerebri ventriculi, neque, ut solent, humescebant, sed arentes omnino inveniebantur, neque potuit in toto cerebro quidquam aquæ reperiri. Itaque Jurisconsultus iste, dum signa proferret lymphaticæ, exquisitè sanguinea moriebatur apoplexia.

Id quoque accidebat in eo, quem suprà innuebam militiæ adscriptum: deportabatur iste domum apoplecticus; signa autem erant apople-

serius tumulto dederunt. Observations sur les effets des Vapeurs Méphitiques dans l'homme &c., avec des Observations sur les effets des plusieurs Poisons &c., pag. 8. Diligentissimus quoque MORGAGNUS illud adnotavit, quod in quibusdam cadaveribus apoplecticorum calor post diem a morte servabatur, tempore præsertim hyemali.

xiæ lymphaticæ. Hinc suppeditabant emetica: consultus vero PORTALIUS jussit contundi jugularem: æger subinde levabatur. Accitus alter Medicus sanguinis emissionem improbavit, monuitque applicanda esse vesicatoria; hinc æger comatosus evasit, & nocte sequenti mortuus est. Dissecto Cranio, cavitas illa atri sanguinis copia scatebat: multum quoque concreti sanguinis inveniebatur qua lobi cerebri, ac cerebelli dividuntur: meditullium spinalis medullæ, præcipue ad collum sanguine rubebat vel maxime. Ast in ventriculis cerebri eam tantum lympham detegebant, quam in quibuscunque cadaveribus observare solemus.

9. Hisce observationibus, aliisque innixus PORTALIUS statuit in quibuscunque apoplexiis, quas dicunt lymphaticas, secandas esse jugulares, pedumque venas; asseritque hujusmodi sanguinis emissiones re ipsa mirum in modum ægros juvasse. Inter cæteros, quos memorat, describit apoplecticum quemdam athleticæ constitutionis, ætatis annorum quinque supra quinquaginta, qui stratus cubili inveniebatur pallens facie, spumas agens ex ore, prodensque pulsus satis exiles. Curabant eum emeticis, atque stimu-

lantibus: hinc res in pejus ruebant. Hanc curationis methodum PORTALIUS improbens repetitas iussit venæsectiones, quibus factum est, ut æger duabus hebdomadis convaluerit omnino. Quare clariss. citatus Auctor observationibus innixus tum cadaverum, tum ægrotorum, quos dicta methodo ad sanitatem perduxit, absolute existentiam negat apoplexiæ, quam serosam vocant, five lymphaticam.

10. At mihi haud quidem videtur ex his inquisitionibus, observationibusque Auctoris optime meriti inferri posse, nullam omnino dari apoplexiam mere serosam. Do libens, quod omnino incerta sint apoplexiæ lymphaticæ signa in suis ægris a PORTALIO observata; præcipue cum vigentes, imo & athleticæ constitutionis illos fuisse colligatur. Do quoque persuasus omnino, quod sæpe serum e vasis cerebri extrudatur a nimio sanguine, qui illud urget: tunc autem optimam duco PORTALII methodum: ast extant non paucæ observationes, quibus videtur luculentissime evinci apoplexiæ unice serosæ existentia. Sectis enim plerisque apoplecticorum cadaveribus aquam cerebrum occupantem invenerunt, quin ulla va-

forum sanguiferorum appareret distensio , ex qua illa aquæ coacervatio gigneretur .

11. Has inter observationes sufficit meminisse trium apoplecticorum , quos refert MORGAGNUS (g) , in quorum cerebro aqua pura inveniebatur absque ulla vasorum ex sanguine distensione . His addi meretur apoplecticus , quem RONDOLINUS (h) clar. Medicus Tergestinus observavit . Convaluerat ille nuper a quibusdam artuum inferiorum ulceribus , quæ lympham guttatim demittebant : idem repente apoplecticus evasit , paulloque post vita decessit . Ejus Calvaria sero redundabat , dum vasa sanguifera omnia encephali maxime pallentia erant , vixque visibilia . Quis ergo neget hujusmodi apoplexiam a lymphâ primaria productam ? Quomodo enim vocari aliter posset ? an forsan hydrops cerebri , uti vocatur hydrops pectoris , quum ipsum ab effluxo , coacervatoque sero occupatur ? At lis de nomine esset . Serum pectore accumulatum mortem gignit nimis comprimens , irritansque pulmonem ; capite vero coactum cerebrum comprimens , irritansque .

(g) *Epist. an. Med.* IV. n. 6. 28. 30.

(h) *Giornale per servire &c.* , loc. cit.

12. Insuper eam apoplexiam cur non dicemus serosam, quam ex metastasi STELLIUS observavit? *Complures*, ait Ipse, *repente moriebantur, cum ex febre acuta convalescerent, & cruribus adhuc essent œdematosi; si forte somno indulserant plus æquo; aqua enim ex inferioribus partibus subito ad encephalon decubuit* (i).

13. Quapropter Recentiores quidam gravissimi hanc divisionem apoplexiæ in sanguineam nempe, & serosam receperunt; tertiam tamen subdentes speciem, idest convulsivam, ad quas reduci posse alias hujus morbi species arbitrabantur. Hanc convulsivam præsertim efficiunt insensibiles aliquando illæ causæ, ac conjecturis unicæ obnoxiae, quas supra n. 4. indicabamus.

14. Quamvis autem aliquid differere ferat animus apoplexia super convulsiva præsertim, sive *Nervæa*; indicia tamen minus æquivoca attingam, quibus sanguineæ, serosæque species dignoscantur. Hinc mihi patebit aditus aliquas subdendi animadversiones, quæ ad consuetam medendi iisdem apoplexiis rationem pertinebunt.

(i) Rat. Med. Part. III. pag. 410.

CAP. II.

Apoplexiæ sanguineæ indicia, ejusque causæ aliqua: additur quoque de apoplexia ex sanguinis dissolutione, fluidique elastici extricatione.

15. **S**anguinea facilius corripuntur apoplexia, qui sunt natura sanguinei, pingues, brevemque collo; qui caput produnt amplum, faciemque, oculosque sæpe rubentes; qui virilem agunt ætatem, atque senilem; qui vitam ducunt laute, a curis semotam quibuscunque, atque laboribus. Ii procul dubio addantur, qui stuporibus, ac resolutionibus obnoxii sunt, quin causa adsit manifesta; qui sanguinis evacuationibus deficiunt; quibus jampridem assueti fuerint; qui incalescentibus facile humoribus præditi sunt; quique nativa cerebri debilitate laborant: hac enim de causa a Patre in Posteris diu sævientem observamus apoplexiam. Quodlibet anni tempus humidum, tepensque vires suppetit huic morbo, cui paralyfis unius lateris frequenter accedit.

16. Hic autem morbus adoritur raro, quin

signa præcedant. Quare *prælonga nonnunquam habere initia* olim affirmavit ARETÆUS (k).. Plerasque apoplexias *sensim genitas*, quæ tamen subito increverunt, asserit TISSOTIUS (l); nullumque morbum fortassè prænuntia antiquiora habere, quam apoplexiam idiopathicam contendit THYERIUS (m). Mihi vero pluries visa sunt hujusmodi prænuntia paucis tantummodo diebus morbum præcessisse.

17. Solent ergo morbum sæpe præcedere ea, quæ sequuntur phænomena; nimirum vertigines, cephalalgixque frequentes; hæmorrhagiæ narium, mentis segnities, & aliqua evanescentia; memoriæ labes; inter legendum facilis, & frequens a linea aberratio; responsiones implicatæ; ante oculos scintillæ micantes, maculæque vario-coloratæ vagantes; mox oculi unius, mox utriusque caligo, & auditus momentanea cessatio: præterea lacrimæ spontaneæ; somnolentia, aut somnus nimis placidus, aliquando tamen & implacidus valde; aurium susurratio; lingua fugaciter balbutiens; vox tre-

(k) De Caus. & signis Diurn. Morb. Cap. 7. pag. 66.

(l) Epist. var. argum. pag. 56.

(m) Medicinæ Experimentale pag. 145.

mula; membrorum gravedo, eorumque torpor mox ad unum, mox ad alterum latus, tactus aliqua obtusio; ad scriptionem tarditas, pedumque vacillatio: partiales tandem, licet levissimæ, momentaneæque paralyfes; repentinus ex membro aliquo frigoris sensus; incubus frequens, dentium stridor inter dormiendum, doloresque sensibiles, licet fugacissimi, circum præcordia. At quibus instat terribilis hic morbus, imprimis stomacho sæpe laborant, intestinisque; ac sæpe de nausea conqueruntur, de borborygmis, desidendique conatu; licet indigestionis abfuerint causæ, aliæve colluviei absint indicia. Hinc fit fortasse, ut apoplexia erumpat, dum quis nititur alvum deonerare: nisus enim huiusmodi præviæ superadditus dispositioni determinat ultimo apoplexiæ invasionem.

18. Sed nullis etiam præcedentibus signis aliquando hic morbus corripit repente, præsertim si ex sanguine ob nimiam copiam, impetumque e vasis effluxo exoriat; tunc autem subitus, vehemensque capitis dolor sæpe antecedit. Qui hac prosternuntur apoplexia faciem produnt fere sanguineam, præsertim post aliquas ab invasione horas, aliquando tamen &

pallidam ad mortem usque ; oculos aliquando languidos , aliquando rigentes , modo clausos , modo apertos ; os hians , & aliquando spumas agens ; pulsus fere elatos , vehementesque , qui tamen morbo crescente languescunt : at languescunt , ut plurimum , etiam iis , qui melius se habentes vitam protrahunt ; nervi enim paralyti correpti destituuntur viribus ; hinc & arteriæ , quarum musculares tunicæ filamentis nerveis sunt præditæ . Respiratio aliquando satis libera (2) , aliquando stertorosa . Si vero augescat morbus , graves æger trahit ronchos : accedunt tandem motus convulsivi , & paullo post interitus .

19. At quoad pulsum , libet hic animadvertere , illum aliquando perexilem esse ab invasione ad mortem usque , præsertim quum satis

(2) Imo naturalis omnino est respiratio aliquando , licet apoplexia sit validissima . Naturalis quidem observata fuit a MORGAGNO (Epist. 2. n. 13.) in quadam muliere apoplectica , quæ paucas post horas obiit . E vita pariter decessit die quarta morbi Apoplectica , cujus meminit VERRATIUS ; ejus tamen respiratio , ut ipse subdit , *per totum morbi tempus fuit parva quidem , & rara , sed tamen ordinata , & æquabilis* . Comment. Inst. Bonon. Tom. II. Part. I. pag. 184.

valida sit hæc apoplexia.. Adnotavit MORGAGNUS (n) inter alios apoplecticum quemdam sanguineum, subpinguem, & ætate mediocri ita pulsibus adventante morbo ad mortem usque defecisse, ut ne Medici quidem venæsectionem imperare auderent. Ego vero observabam Præbyterum quemdam, qui vita post triduum decessit apoplexia vere sanguinea, pallere ingruente morbo, ejusque pulsus adeo evanescere, ut tantum post horas septem, aut octo sensu deprehenderentur. Clarif. PANZANIUS (o) vidit hominem quemdam pallere repente, gelu, & convulsione corripì, solo supinum prosterni, pulsumque perdere omnino: quum vero pulsus surgeret subinde, redibat vultus color, stertorosa apparebat respiratio, aliaque omnia æger proferebat veræ apoplexiæ phænomena.

20. Neque id absolum est a ratione: cerebro enim oppresso, fit iners reliquum corporis, sanguinisque motui impedimenta gignuntur. Hinc liquet quamam ratione actio cordis siue penitus extinguatur, siue suspensa syncopem efficiat: quæ quidem in mortem desinit, si pe-

(n) *Epist. anat. Med. LX. art. 4.*

(o) *Giornale per servire &c. loc. cit.*

rit omnino vis vitæ; si vero sit ipsa potius subortas superare resistentias, cerebro tamen adhuc oppresso; insigniora tunc conspiciuntur apoplexiæ phænomena. Hujusmodi autem syncope est symptoma, ut ita dicam, causæ apoplexiæ.

21. Ejus causa proxima efficitur ab immunito, sublatove penitus commercio inter cerebrum, aliasque saltem corporis partes, quas ad sensus, motusque voluntarios prædestinavit natura. Hæc autem causa proxima gignitur a sanguine, qui in vasa cerebri, cerebelli, medullæ oblongatæ, sive meningum congeratur, vel ab ipsis disruptis exturbetur.

22. Sed plures ejusdem morbi remotiores existunt causæ a Medicis recensitæ, quas silentio præteream. Quasdam tamen alias hic libet recensere, quæ minus vulgatæ videntur; & primum eam memorabimus, quam affert Cel. WALTHERUS (p). Animadvertit enim sanguinis circuitum in cerebro peculiari quodam modo peragi: neque enim sanguis ab arteriis in

B

(p) Nouveaux Mémoires de L'Academ. Roy. des Scienc. & Beaux Lettr. an. 1782. Berlin. 1784.

cerebrum impulsus, a venis immediate ad cor revehitur; sed a venis exceptus cerebralibus internis in sinus inducitur duræ Matris, a quibus per venas externas ad cor redit postremo. At quisque novit, præsertim post WALTHERI, & MONROI animadversiones, sinus duræ Matris dilatari non posse: quare siqua plethora cerebro adsit, vasa cerebralia urgebit, eadem distensura, vel, ut sæpe accidit, disruptura.

23. Liceat quoque hic quærere utrum necne inter has causas sæpius, quam communis ferat opinio, recensenda sit convulsio? Hoc autem loci neque de hypocondriacis loquor, neque de hysteriis, neque tandem de iis, qui sua natura sunt convulsionibus obnoxii. Id enim quærebam de iis tantummodo, qui, quum optima corporis fruantur compage, viribusque valeant, ad veram tamen propendunt apoplexiam: ac de ea convulsione mihi tantum est sermo, quæ una cum aliis causis habeat sanguinem ita disponere, ut majore impetu in cerebrum actus, illuc congeratur vasa distendens, disruptensve. Mihi videntur profecto convulsiones haud raro sanguineam præcedere apoplexiam. Observavi enim, nec semel, homines satis vigentes, nun-

quam convulsos, sed ad apoplexiam sua propria compage pronos, quos insultus quodammodo apoplecticus adoriebatur: vena ipsis contusa statim valebant, ita tamen, ut per diem integrum urinam passim dejicerent ad instar aquæ purissimam; hoc est convulsivam. Neque ex alia, ut puto, ratione THOMAS WILLISIUS (q) asserbat raro plethoram tantum, sanguinisque acrimoniam gignere hæmorrhagiam, sed spasmodicos insuper motus accedere, qui sanguinis impetum ad caput dirigant. A spasmis item aliarum partium repetit cum SCHWENKE GATTENHOFFIUS (r) hæmorrhagiarum plerumque rationem.

24. Convulsiones ergo subsequi videtur saltem haud raro vera sanguinea apoplexia; & ita quidem, ut morbus aliquando videatur originem a nervis duxisse. Id autem pendet ne semper ab incipiente cerebri compressione? an idipsum innueret principium quoddam subtilius, quod nervos habeat irritare, humorumque massam inflammare, & expandere?

(q) Pharmac. Ration. P. 2. S. 2. Cap. 2.

(r) FRANK Delect. Opusc. Med. Vol. 3. pag. 106.

25. Ast hic morbus nimis metuendus homines corripit sæpe, qui ad summum sanitatis gradum pervenisse videbantur. Quare videntur functiones quoque ipsæ vitales nimis auctæ, vigentesque hanc aliquando efficere apoplexiam. Illæ enim sanitatem quandoque promovent ultra eum gradum, quem ferre possit animalis constitutio. Hinc diathesis inflammatoria; præsertim si aerem dominantur frigus, serenitas cœli, siccitas, aquilonesque: vel quum adsit aer quomodolibet inquinatus, aliæque invisibiles corporis dispositiones; humores ad rarefactionem, & ad alchalescentiam jam proclives excitantur ad eum motum intestinum, quem aliqui spectatissimi Viri suspicantur veræ apoplexiæ sanguineæ causam.

26. Hanc vero suspensionem ex observationibus ortam opinor adauctam ex iis, quæ de novo Recentiores differunt super caloris, motusque vitalis principio. Neque per tempus, neque per vires liceret diligentius perpendere hujusmodi doctrinam, quam quidem in nonnullis variaverunt Auctores. Videtur quidem super illam facilius aliquorum saltem morborum, apoplexiæ præcipue, adstrui posse theoriam. At

quidquid de his judicandum sit, pro certo habendum, quamdam existere apoplexiam sanguinis dissolutione exortam, *fluidique elastici* extricatione: quæ res motum procul dubio significant sanguinis intestinum. De hac interim apoplexia nobis hic habetur sermo: neque tamen prætermitemus animadvertere, quæ haud improbabiliter innuant intestinum sanguinis motum, omnes forte præcedere sanguineas apoplexias, aut plures saltem, quam communis ferat opinio.

27. Plures itaque apoplexias, quæ ex sanguinis dissolutione, *fluidique elastici* evolutione efficiuntur, observarunt Medici: imo in sectis hujusmodi apoplecticorum cadaveribus, quæ adhuc calorem, multumque sanguinis fluentis, spumosi que præferebant, nullam deprehenderunt aliquoties materialem morbi causam, præter aerem extricatum, quem quidem in venis cerebralibus, jugularibus, Cavis huc illuc inveniebant cumulatam: sæpius tamen invenerunt & in abdominis, & in thoracis cavitate cruentum serum; viscera aliqua liventia; in cavo autem Calvariæ vasa meningum, ventriculosque cerebri atro sanguine, spumosoque turgere.

28. Constat jam ex sanguinis, aliorumque

humorum animalium putrefactione, atque ex institutis in vacuo experimentis aerem, & quidem magna copia, principiis sanguinem constituentibus admixtum esse. Tunc autem sensibus comprehendi solum potest vis hujusmodi *fluidi elastici*, quum putredo, aut fermentatio naturalem humorum mixtionem pervertit, aut quum exterioris aeris minuitur satis compressio; quæ omnia sanguinis intestinum motum, quem supra indicabamus, promovent satis, augentque. Lethalis autem est fere hujusmodi aeris extricatio. Animalia enim pereunt anhela, convulsa, imo & apoplectica, si in eorum venas aliquid aeris arte invehatur: quid ergo molietur magna fluidi elastici quantitas haud raro in eorum cadaveribus observata, quos hæc peremit apoplexia?

29. Utilitatem afferret cognitio symptomatum, quæ apoplexiam hanc ex sanguinis dissolutione præcedunt, atque illorum, quæ eam comitantur in ægro adhuc vivente. Facilior saltem ex iis redderetur forte morbi difficillimi, ac fere semper lethiferi diagnosi. Sed ex observationibus, quas de hac apoplexia adnotarunt Medici, vix quidquam colligi potest. Mihi ve-

ro huc venit tantummodo adnotandum, quod apoplexiam, quæ repente peremit rusticum quemdam Clarensem mense Octobris ann. 1777, præcefferant notabiles lassitudines, insolita ad sudorem proclivitas, & signa vitiatæ in ventriculo digestionis: adnotandum quoque est, cum quatuor abhinc mensibus longa laboravisse dysenteria, a qua tamen convaleuit penitus. Hujus apoplectici cadaver paucis post mortem horis magnum sanguinis dissolutionis, aerisque interni extricationis exemplum suppeditavit. Toto enim corporis habitu immaniter tumescente dominabantur crassiores vesicæ, quæ serum, & sanguinem solutum, ac putrescentem coacervabant. Quacunque parte secabatur cellularis, velut data porta aer ruebat: ater, fluensque erat sanguis, eoque turgebant valde meningum vasa, sinusque Crassæ, ut mihi retulit Chirurgus. Eadem quidem incommoda, si dysenteriam excipias, mortem præcefferunt repentinam Æthiopis (s), & eorum aliqua mortem Piscatoris (t), quorum historias descripsit MORGAGNUS.

(s) Epist. V. art. 17.

(t) Loc. cit. art. 19.

30. Interim in sectis horum apoplectico-
rum cadaveribus observata præcipue fuerunt,
quæ sequuntur; nimirum vasa omnia venosa,
& sæpe, quod magis adnotandum, arteriosa
quoque satis plena, sanguis fluens, spumeusque,
& ex ipso *elasticum fluidum* extricatum, calor
præterea admodum sensibilis, membrorum fle-
xibilitas, oculique fulgentes, & pene viventis
oculos similes; quæ quidem per plures ho-
ras post mortem inspicimus in hisce cadaveribus,
quorum exterior habitus turgescit sæpe, maculis-
que livescentibus fœdatur. Hæc autem omnia
humorum inquinamentum, rarefactionem, &
augmentum eorum motum intestinum satis innuunt,
putridam solutionem, imminutamque valde ir-
ritabilitatem (3).

-
- (3) Congruere omnino videntur, quæ in hisce apoplectis,
eorumque in cadaveribus observamus phænomena cum iis,
quæ observantur in apoplexia ex opio, ex vaporibus mœ-
phiticis. aliisque stupefacientibus venenis. Quæ enim in
primis observantur, & in secundis deprehendebat PORTA-
LIUS: nimirum soporem, oris spumas, pulsus turgescen-
tem, ac difficilem respirationem dum adhuc viverent: in
eorum autem cadaveribus membrorum flexibilitatem, ca-
lorem haud mediocrem per plures horas superstitem inve-
niebat; fluenti, spumeoque sanguine vasa satis referta, ocu-

31. Neque tamen inficiabor aerem e sanguinis massa extricari posse aliquando, atque in

Iosque fulgentes, nec ullo modo obnubilatos. Op. cit. Chapitr. V. pag. 352. & seg. Nimis ne illuderem mihi, si has apoplexias majore tantum, vel minore; aut forte promptiore tantum, vel tardiore irritabilitatis læsione discriminari suspicarer? Et tanta phœnomenorum similitudo possetne innuere affinitatem aliquam causarum apoplexiæ, quam gignunt opium, vaporesque mœphitici, ejusque, quam observamus ex sanguinis dissolutione, *fluidique elastici* evolutione? Quidquid autem de hac similitudine censeatur; nemo tamen persuadeat sibi, quod putem eadem omnino ratione curandos esse tum qui ex opio, & mœphiticis vaporibus, tum qui ex sanguinis dissolutione, *fluidique elastici* extricatione apoplectici evasere. Admissa etiam, quam supra innuebam, similitudine; ratio tamen medendi diversa quidem, aliqua saltem ex parte, esse debet. Me enim haud latet apoplecticos ex opio ex. gr. juvari ex emetico, quod aliis sæpe noceret apoplecticis, ut suo loco ostendemus: nec me latet inter phœnomenorum similitudinem diversas adesse rerum circumstantias. Rationi tamen magis consonum videtur, methodum curationis refrigerantem, atque rarefactioni sanguinis obstantem, quæ valde juvat apoplecticos ex opio, & ex mœphitide, magis accommodatum esse apoplexiæ, de qua hic agimus, quam aqua submersis, ut aliqui crediderunt. Submersi enim multis ante mortem horis frigent, nec post mortem sanguinem produnt rarefactum, dissolutum, aut spumescentem.

bullas coire, licet absint dissolutionis, atque putredinis indicia, imo vero sanguis coagulatus adfit, ut post magnas sanguinis effusiones se observasse LITTRIUS (u) affirmat. Ast in apoplectîcis, de quibus hic agimus, præcipue vero in eorum cadaveribus, evidentiora habemus putredinis indicia: quare *fluidi elastici* evolutio videtur exorta ex humorum inquinamento, quod civit, auxitque putrida fermentatio, imo vero *fluidi elastici* extricata quantitas putredinis gradui videtur respondere. Hinc tum majora putredinis indicia, tum copiam aeris majorem in Piscatore, quam in Æthiope, quos observabat,prehendit MORGAGNUS (x).

32. Nec una videtur mors, ex quo celer, atque subita sit, *fluidi elastici* evolutionem parere. Novi quidem observatum fuisse aeris evolutionem sæpius in subito morientibus occurrere (y), sed contra tum de repente, tum ex apoplexia pereunt, juxta WALTERII (z) præsertim animadversiones, qui aquis submerguntur: ab

(u) Histoîr. de L' Acad. Roy. des Sc. an. 1714.

(x) Loc. cit.

(y) QUYSCH apud MORGAGNUM loc. cit. art. 25.

(z) Nouveaux Memoires de L'Acad. Roy. des Scienc. &c. Berlin 1784.

eorum tamen cadaveribus abest omnino aer extricatus : abest & ab eorum cadaveribus , qui de repente propter vulnera obiere . Ast absunt quidem & calor , & sanguis fluens , aliaque putridæ corruptionis indicia .

33. Aliis ergo causis , quæ plures esse possunt , diversæque , promovetur hujusmodi intestina sanguinis agitatio , & dissolutio : earum viribus , naturæque respondere debent phænomena , quæ vel præcedant , vel comitentur , vel hanc apoplexiam subsequantur . Ex hisce causis aliqua quamvelocissime agens sanguinem rarefacit , suum perturbat circulum , vasorum omnium auget distensionem ; quæ omnia minores ob resistentias majora præcipue minantur cerebro : hinc nullo modo prævisa erumpit apoplexia . Ad hunc modum agere possunt & quædam myasmata , & quædam atmospheræ vicissitudines , quæ præsertim validissimæ sint , ac repentinæ (4) . Et enimvero ; cadavera apoplectico-

(4) Omnes quidem norunt atmosphæram , prout ferunt præsertim substantiæ , quæ aeri dominantur , generatim in corpus humanum notabiliter influere : quas inter substantias electricitatem libet hoc loci recensere , quæ quidem vel maxime agere videtur , id licet negetur ab aliquibus ,

rum, quos observavit frequentes MUCAILLIUS (a) mense Decembris ann. 1747, cæruleas quasdam

in corpus humanum, juxta tamen diversas aeris vicissitudines. Certis enim temporibus fluidi electrici tum major copia, tum plures vicissitudines, & quidem diu, dominantur atmosphæræ: hoc idem observamus quoque diebus quibusdam procellosis, licet barometrum vix, aut ne vix quidem immutetur. Quare, quum sive solo, sive aere major excitetur electricitas, ut ad æquilibrium ubique sistat; ipsa quaquaversum furens pergit, ea transmeans corpora, quæ caditum patefaciant. At corpus humanum patet præ aliis fluenti electricitati, quæ per poros pellis, forte per bronchiales vesiculas, maxime vero per nervorum extrema itve, reditve; oscillationes equidem excitans alternantes, donec æquilibrata quiescat. In his autem electricismi turbis vis ejus repulsiva agit, ut ita dicam, in cohesionis vim: hinc partes fluidæ ad motum cientur intestinum, rarefiunt, atque inflammantur: ex hac eadem actione solidæ extimulantur partes, unde motus augetur circulationis. Quæ cum ita fiant, nonne ipsa quoque apoplexia exoriri potest in iis præsertim, qui aliis de causis ad hunc morbum procliviores sint?

Hæc autem mala magis metuenda videntur, si itus, reditusve vaporis electrici forte etiam intensi nimis aliis præterea jungatur, ut ita dicam, vitiis sive atmosphæræ, sive corporis animalis. Quoad atmosphæram enim

(a) *Histoire de L' Acad. Roy. des Sc. ann. 1747. pag. 63. & legg.*

prodebant maculas fatis amplas, aliaque indubia corruptionis indicia. Adnotabat autem mercu-

notum est, quum copiosa oneretur electricitate, onerari etiam aqueis, ut plurimum, vaporibus electricitatem vehentibus; adeoque aerem satis rarefieri, & saltem ex parte inelasticum fieri sæpe: minus ergo premet externam hominis superficiem; ex quo indubia sanguinis rarefactio. Quoad homines vero; qui ad veram apoplexiam sanguineam proclives sunt, ii multis viribus, staruraque firma vigentes, sanguine abundant, oleoque animali, adeoque ea electricitate, quam *nativam* dicunt ab aliquo quidem oppugnatam, ut videtur, injuria. In his rerum circumstantiis velut in unum conspirantibus nonne facillime exoriri poterunt rarefactio humorum, accensioque, nervorum irritamenta, atque inde apoplexia?

Ponantur itaque electricitatis atmosphæricæ augmentum, & major corporis humani electricitas, quam recensitæ excitant atmosphære vicissitudines; ponantur aliæ quidem noxiæ qualitates, quibus electricitas, dum corpus animale penetrat, exquiratque, circumvestiri potest; & aliæ tandem ponantur prædispositiones eorum, qui ad apoplexiam inclinantur; nonne satis explicari exinde possent etiam apoplexia ex sanguinis dissolutione, fluidique elastici extricatione, & ejus phænomena, quæ tum in vivis, tum in mortuis observamus? Nimirum convulsiones in adhuc vivis, & in eorum cadaveribus solutionem sanguinis, fluidi elastici evolutionem, fulgorem oculorum, calorem superstitem, membrorum flexibilitatem, facillimamque partium omnium putrefactionem? Hæc perpendant

rium barometro per unum pollicem, quatuorque lineas de repente depressum fuisse; ex qua qui-

alii, judicentque: certissimum est tamen ab electrica matetie nervos irritari, vimque ejus repulsivam ad motum provocare intestinum tum partes corporis fluidas, tum partium solidarum moleculas. Præterea notum est quod ex vapore electrico calorem augeri animale, & novissime perempti animalis carnes molliri, atque macerari; compertumque tandem est electricitatem ad alchalescentiam, dissolutionemque promovere animales substantias, ut res inflammabiles ad combustionem. Hinc observamus, quæ animalia vel naturali, vel artificiali icta sint fulmine, statim putrescere, eorumque arterias adhuc sanguinis partem servare; quod certum est affectæ irritabilitatis argumentum.

At dices fortasse; apoplexiæ frequentiores sæviunt, quum venti meridionales dominantur aerem, qui tunc inelasticus, humescens, ac minus gravitans minus sensibilia prodit electricitatis phænomena. Contra est tamen; quod nempe iisdem atmosphæræ constitutionibus major electricitatis quantitas aerem quaquaversum excurrit: excitata enim copiosa solo electricitas erigit humentes vapores, quibus *Conductoris* vices agentibus ignota peragrat; adeoque efficax tunc quoque humana corpora urgere potest, utpote quæ novum electricum continuo admittunt vaporem, atque transmittunt. Accedit vero, quod status hujusmodi atmosphæricus duo habet efficere; primo evolvere potest electricitatem aeris propriam, de qua perapte differit Cel. BECCARIA suis in Epistolis super electricitate

dem atmosphæræ immutatione exortas deducebat frequentiores eas apoplexias.

naturali; secundo habet excitare electricitatem animalem, ut ajunt, innatam. Quum enim aer minus gravitet in corpus, cujus quoque extrema vasculosa laxantur humiditate, vires intrinsecus impellentes prævaleant, necesse est: hinc ex aucto attritu major excitabitur electricitas animalis; quæ minus quoque exhalabit, impedita ab humiditate perspiratione.

Et revera, curnam vaporibus hisce quum sit atmosphæra impura, nostrasque fraugat vires; nos tamen insolito velut æstu servemus; quin hunc eundem caloris atmosphærici gradum thermometra significant? Nonne id accidit ex quo ab hisce aeris constitutionibus materies quidem vasis absorbentibus suppeditatur; verumtamen præclusa perspiratione difficilius e corpore exiliens diffunditur extrorsum electrica materies, quam hoc loci vocarent alii materiem forte caloris? Siquidem plerisque videtur probabile materiem utramque modificatione quadam discriminari tantum; re tamen vera in uno consistere igne elementari, quem pro variis ejus phænomenis aut calorem dicunt, aut electricitatem. Hinc ecce, ut in atmosphæra, quam venti dominantur meridiionales, enasci possit apoplexia a causis diversis conspirantibus, quas inter videtur electricitas quoque posse recenseri.

Rebus superius expositis subdi etiam posset, plures exoriri apoplexias ab Septembre labente ad veris usque æquinoctium, quam aliis mensibus: eo enim tempore juxta Clariss. Virorum observationes (BERTHOLON De L'Electri-

34. At crebro dissolutionis causæ lento agunt gradu in partes corporis solidas, fluidasque: harum paullatim immutant statum, crassimque; ordinem motuum, formamque pertur-

cité du Corps humain en état de Santé, & de Maladie Tom. I. pag. 107. ; HORVATH Physic. Particular. Differt. III. pag. 388.), electricitas frequentius tum magis extensas, tum diutinas exerit in atmosphæram vires. Sed addi ulterius posset argumentum, quod prober electricitatem sic motam in corpus humanum sensibilibiter influere; ex quo homines plerique, mutatione temporis ingruente, doloribus afficiuntur, distensionibus, facili sudore, diversisque velut in membra ictibus. Hæc enim phænomena nec ab aeris pressione, neque ab ejus humiditate pendent; quum tunc barometrum sæpe deprehendamus immotum, aeremque, post procellam, humentiolem. Id autem confirmatur experientia; arte enim electrizati homines supradicti ea, quæ erumpente procella, perferunt incommoda.

Quod autem dicebamus huc usque, innuit quemdam in corpore humano electricitatis excessum. Immutata vero aeris constitutione, aliisque subsequenribus electricismi vicissitudinibus, humanum corpus deonerari sua aliquatenus potest electricitate naturali; ut sæpe accidit æstivo præsertim tempore. Si enim aer egeat vapore electrico, quem e corpore humano hauriat; sæpe tellus eo tempore arens haud subito eam electricitatis copiam corpori potest suppeditare: imo tempore æstivo excitata animalis electricitas facilius in aerem diffunditur circumstantem nimis

bant ; secretiones , excretionefque impediunt : hinc velut præordinatur humorum degeneratio , & motus promovetur intestinus : quæ deordinationes , ſiquando aliqua cauſa ſupervenienſ accedat , licet admodum mediocris , augentur nimis , fluidum elæſticum extricant , hominique vehunt lethalem apoplexiam , cui diu prædiſponebatur . Et revera ſi rem diligenter expendas , quam ſæpiſſime invenies apoplexiam ſubſecutam fuiſſe phænomena , quæ inquinamentum humorum , diſſolutionemque jam ſignificabant ; ut ſunt laſſitudines , languores , ſudores inſoliti , nervorum ſpaſmi , rubræ maculæ modo hanc , modo alteram corporis partem occu-

C

aperta perſpiratione . Sed ex huiusmodi defectu electricitatis humanæ explicari poſſunt debilitas corporis , languor , putridæque ſolutiones ; hinc & aliqua apoplexia .

His tamen non obſtantibus haud mihi libet omnia hæc phænomena unice ab electricitate deducere ; licet apud Gallos ſcriptum ſit , plerique plaudentibus , apoplexiam ſanguineam ex ignis exceſſu , pituitoſam ex ejus gigni defectu . Sed hæc adnotavi , ut Lector videat , an apoplexia promoveri poſſit ab electricitate , aut ejus vires augeri ; & an ſibi probabile ſit , electricitatem aliis ſaltem cauſis , quæ multæ eſſe poſſunt diverſæque , conjunctam influere in apoplexias poſſe .

pantes , eruptionesque *erysipelatodes* , quæ vix exortæ aliquando evanescunt . Vidi haud semel fugax erysipelas præcessisse apoplexiam ; & paucis abhinc diebus in viro observabam hunc morbum , quem præcesserunt rubicundæ quædam maculæ fatis amplæ , quæ mox frontem , mox genas , subinde super palpebras dominabantur ; licet illi , ut mihi relatum est , contusa fuerit vena , supervenit fatis valida apoplexia , quum dies maximos inter nimbos efflueret .

35. Hæc quidem probant ex motu sanguinis intestino , ejusque dissolutione plures saltem originem ducere posse apoplexias . Fatendum tamen est in plerisque apoplecticis , eorumque in cadaveribus sanguinem non inveniri nimis fluentem , neque fatis turgentia vasa , iisque deesse omnino calorem superstitem , putrefactionemque , quæ saltem exoriatur cito : hæc autem phænomena semper apoplexiam consequuntur præsertim , quæ ex sanguinis dissolutione fit , fluidique elastici evolutione . At quæ discriminis hujus origo ? Apoplexiæ hujusmodi speciene differunt omnino , an majori tantum , minorive humorum solutione , aut expansione ? Hoc autem discrimen , siquidem existat , effici-

turne a vi diversa ejusdem causæ; an a causarum diversitate? Haud equidem inficiabor plures diversasque causas posse dictum gignere discrimen: hoc tamen effici quoque posse videtur ab una, eademque causa, quum ipsa sive diversa intrinsecus donetur efficacia, sive diversas nanciscatur vires inter eas vicissitudines, quas in corpore animali potest subire. Namque nos in omnibus fere apoplexiis vere sanguineis humorum rarefactionem deprehendimus, atque accensionem: cur ergo quæ causa aliquando humores commovet, expanditque, eosdem aucta fundere nequibit, ac putrefacere? adeoque evadat apta ad ea producenda phænomena, quæ in apoplexia conspiciuntur ex sanguinis dissolutione, fluidique elastici extricatione?

36. Extant vero non pauca, quæ ex motu sanguinis intestino innuunt omnes enasci apoplexias vere sanguineas, ut in quadam adnotatione sua (b) videtur suspicari Clariss. PANZANIUS. Et enimvero nonne sanguinem satis fluidum in apoplecticorum cadaveribus adnotavit sæpe MORGAGNUS? Nonne eundem & satis ru-

(b) Giornale per servire, &c.; Tom. IV. pag. 52.

brum observavit PORTALIUS in cadavere apoplectici jurisconsulti , quem (n. 8.) recensuimus? Nil quidem videtur , nisi motus intestinus , fluiditatem sanguinis in cadaveribus , fervare , superflitemque calorem .

37. Præterquamquod norunt omnes apoplexiam vocari ab HOFFMANNO cerebri hæmorrhagiam . Verum nonne , quum juvenes , virique robustiores hæmorrhagiis quibuscunque laborent , solidorum coarctationem , fluidorum vero expansionem , accensionemque invenimus ? Observatum est præterea , ut idem alibi adnotabat PANZANIUS (c) , aliique , cujuscunque speciei hæmorrhagias , ut plurimum , sævire mercurio barometri depresso , & in aerem dominantibus humiditate , calore , ac ventis australibus , in quibus hæmorrhagiæ quoque naturales ad morbum usque augescunt . Sed latet neminem tunc & humorum expansionem satis promoveri , & frequentiores excitari apoplexias : neque id absolum a ratione videtur . In ea enim atmosphæræ constitutione imminuuntur cordi resistentiæ dum sanguinem per carotides trudit ;

qui tamen venas peragrans satis retardatur, pondere atmosphærico deficiente. Haud tamen nego apoplexias dari sanguineas gravitante præter solitum atmosphæra; sed hoc unum dico, quod nempe & minus frequentes exoriuntur ea constitutione apoplexiæ; ac repentinæ, saltem plurimorum, mortes a viribus vitalibus pendent, quæ tunc oppressæ nequeunt motum servare circulatorium. Præterea atmosphæra quoque satis gravitante, aliquando haud defunt causæ, quæ sanguinem rarefaciant, accendantque.

38. Suppetunt alia quoque, quæ quidem confirmant intestinum motum præcedere apoplexias vere sanguineas. Autumno enim, hieme, ac Vere magis grassantur apoplexiæ. Atqui his anni temporibus promovetur magis motus, quem supra adnotabamus, humorum animalium intestinus. Vere enim, ut omnes norunt, expanduntur fluida, rarefiuntque; præsertim si ex atmosphæræ vicissitudinibus pondus imminuatur aeris, atque elaterium.

39. Progrediente vero autumno augentur forte motus intestini elementa. Tunc enim consequuntur frigus, imbres copiosiores, aer inconstans sæpe, sæpius vix comprimens, & in-

elasticus; quum ipse humescat, effluviisque sca-
teat corruptionis. Quapropter solidæ corporis
partes delassantur, *fuligines* inter expirandum
non excernuntur, perspirationes imminuuntur,
deordinantur secretiones, humorumque tota con-
taminatur massa. Nonne hinc motus promo-
vetur intestinus, quo ad ulteriorem omnia pro-
cedunt corruptionem? Addatur quoque tem-
pore æstivo bilem copiosiore fecerni, ac faci-
lius inquinari; olea animalia, & falia magis,
magisque attenuari; parantur inde lentæ dissolu-
tionis causæ, quæ tempore tandem autumnali
erumpunt lethales. Videtur ergo autumnii tem-
pus magis causas congerere motus humorum in-
testini: quumque tempore eodem frequentiores
exsurgant apoplexiæ; videntur probabilius a
motu hujusmodi, quam ab aliis principiis ori-
ginem ducere posse.

40. Hyemale quoque tempus plusquam æsti-
vum causas vehit hujusmodi motus apoplexife-
ri, qui haud raro ab autumnii vicissitudinibus
saltem ex parte præordinatur. Hinc MORGA-
HNUS hyeme præcipue in sectis apoplecticorum
cadaveribus fluidum adnotavit sanguinem, ca-
loremque ad horas usque post mortem viginti

quatuor superstitem . Nec mirum : major enim , quum æstivo , ignei elementi quantitas dominatur humana corpora hyemali tempore : hyeme nenpe & vires augentur extricantes igni-principium , quod fluidis , solidisque præsertim partibus juxta Recentiores latens adhærebat ; & idem evaoraturum cohibetur corporibus , præclusa perpiratione . Excitata itaque intestina humorum agitatione sive ab autumnii præordinationibus , sive a quacunque repentina causa , nil mirum si major percipitur calor , diutiusque servitur , uti observavit MORGAGNUS .

41. Hoc insuper igneum humani corporis principium aptis quibusdam agentibus causis , & coia augetur aliquando , & magis actuosum fit hinc nisi cito evanescat , fluida omnia animia , forte olea præsertim commovet , tenuat , dilblvit , fortuitamque sic inducit plethoram . Castica insuper , & tenuissima hujusmodi maters nervorum irritat filamenta , stimulos profer ad cerebrum usque , mentisque facultates perurbat , destruitque aliquando .

42. Ex hac quidem causa eæ mihi videntur pendere , quas tamen observamus raro , apoplexiæ , quæ quidem evanescunt , quum furens

illud principium ad partem aliquam adfluat, ibique coactum gangrænam gignat (5). Apoplecticus hac ratione probabiliter evasit, quem ego observabam hemiplecticum quoque ad latus dextrum. Illi rubebat ignito colore vultu, collum, & pectoris pars; fulgebant oculi, perturbabantur ideæ; pulsus incitati vigeabant vltimo: æger exagitabatur undequaque, aliquando amen quiescebat sopore occupatus. Tribus elapsis diebus, etsi copiosæ venæ-sectiones factæ fuissent, crus illi, & pes lateris paralyti affecti inflammabantur, aptioribusque nihil juvantibus remediis, cito subsequitur calcaneo gangræna evanescente statim apoplexia.

43. Ex dictis huc usque constare videtur agitationem humorum intestinam, expansionem accensionemque anteire, ut plurimum saltem, apoplexiis sanguineis, præcipuæ si sint vere idiopathicæ: hinc eæ videntur promoveri a motu

(5) Tunc autem prodit sæpe furentis in speciem erysipelati. Hæc ignea materies, ut mihi visum est, parvis ex causis extricatur aliquando, sævit, terribilesque gignit effectus: subinde per tempus aliquod externa alicujus membri erumpit superficie, ita ut æger videatur aliquantum se melius habere: at cito eadem sæpius retrocedit, & aliquo coacta viscere irreparabilem vehit interitum.

magis rarefactionis, accensionisque, quam a projectionis motu; licet uterque motus fere semper augeatur simul. Universalis ergo est hæc apoplexifera causa, pertinetque ad corpus totum, aut saltem ad ejus sanguinea vasa: universalis enim est liquidorum expansio, solidorumque distensio. Nonne id probant inflammationes, gangrænæque initia, quæ in intestinis observantur, & in hypochondriis, sive in pulmonibus apoplecticorum vita functorum? nonne id confirmat aqua cruenta, quam e vasis effluxam invenerunt in cavitate abdominis, thoracis, signanter pericardii?

44. At ego, licet probabile admodum esse exposuerim ex motu sanguinis intestino apoplexias vere sanguineas generatim enasci; haud nego tamen sanguinis cohærentiam, segnitiam, lentamque spissitudinem gignere posse sanguineam apoplexiam in iis maxime, in quibus adsit nativa quædam cerebri debilitas, aut difficilis sanguinis reditus e capite per venas. Hujusmodi vero sanguinis diathesis videtur potius eam apoplexiam effectura, quæ non subitanea penitus sit, quamque præcedant phænomena aliquantulum diutinia.

CAP. III.

Indicia apoplexiæ serosæ, sive lymphaticæ.

45. **A**poplecticos ex sero evasisse conjectabimus, quos dominantur malus corporis habitus, cachexiæ principia, fibrarum lassitudo, humoris lenti, ac pituitosi copia, quosque tandem ad hydropem vergere animadvertimus. Hujus morbi species patebit magis, siquid præcessisse constabit, quod quidem humores potuerit lentos, ac glutinosos augere; si morbus ingruerit haud repente, si vox paullatim perierit, atque loquela. Rem vero confirmabit vel maxime æger, cujus os, oculique multam expriment lympham, pulsus veluti evanescant, venæ deprimantur; cujus tandem ætas increbuerit, vires defecerint, palluerit facies (6). Imo hic adnotare liceat apoplexiam fere semper serosam esse, quæ, licet haud sit pessimus corporis habitus, ulcera consequatur exsiccata, vel suppressionem cujuscunque fœdi, albique stilli-

(6) Plura quidem ex hisce indiciis aliquando fallere possunt, ut videbimus, quum de morbi curatione nobis erit agendum.

cidii , cui natura jampridem assueta fuerit . Hujus generis fuere apoplexiæ , quas adnotavit MORGAGNUS (d) in quodam rustico , in quodam Anguizzola , & in quodam sene (e) , licet in hoc arteriolam quamdam inveniret sanguine turgidam . Eiusdem generis apprime fuit apoplexia , quam observavit RONDOLINUS , uti retulimus supra .

46. BONIOLUS tamen præstantissimus , ut mihi relatum est , in quadam Dissertatione plerisque innixus observationibus suis communem ferme impugnans opinionem contendit ulcus nulum licet inveteratum , cui inducatur cicatrix , lymphaticam invexisse apoplexiam , aliosve metastaticos morbos . Si ergo methodo ab eo indicata consolidetur ulcus , nihil metuendum censet Professor Clarissimus : vulneris enim expurgationem nullo modo pendere a vitio universalis sibi persuadet omnino . Quare usum quoque respuit fonticulorum : ex his enim haud fiunt secretiones , ut Ipse ait , *electivæ* . Hujus autem placitis adhærentes lego UNDERWOODUM , atque CAMPERIUM (f) .

(d) Epist. An. Med. IV. n. 13.

(e) Epist. V. art. 15.

(f) Giornale per servire ec. , Tom. III. pag. 139.

Ast alii plerique, ut vidimus supra, se haud raro observasse testantur, five arte; five sponte exsiccatis artuum præsertim inferiorum inveteratis ulceribus, apoplexiam exortam fuisse: quid ergo dicendum? Numne eos ægros dominabantur simul causæ aliæ, a diuturnitate forsan aperti ulceris sensim genitæ, ex quibus apoplectici evasere fortuito, quum ipsis ulcus coaluisset?

47. Huc tandem spectare videtur ea apoplexia, quæ ex leucophlegmatica cachochymia gignitur. In hoc morbo sanguis in laxiorem, frigidam, mucosamque degenerat naturam; bilis effœta est, totumque corpus iners. Homines hi valde debiles, & laxi, a quolibet ingesto tumentes, buccas tumidas, faciem inflatam, & labia prominentia habentes referunt bombyces, ut cum BOERRHAVIO loquar, ad sua duccenda fila paratos: ingravescente morbo frigidi toto corpore fiunt, torpentesque; tunicæ adnatæ color est pallidissimus, oculique humescunt; in membra quasi prementis plumbi pondus dominatur; hebescent sensus, & perpetuo torpent; si eos alloqueris, minantur responsum, sed cujus statim sunt obliti; tandem apoplectici decedunt.

48. Novi quidem BOERRHAVIUM hujusmodi apoplexiam deduxisse *ex spirituum defectu*: sane siue isti existant, siue tantum hypothetici sint, certissimum tamen est ad functiones animales peragendas requiri quiddam vividi, actuosi, energici, ideoque maxime elaborati in fluidis; & quamdam vim, cohæSIONem, & robur in solidis, quibus quidem omnibus deficiunt cacochymia leucophlegmatica laborantes. Mihi tamen videntur humores, quibus totum eorum corpus scatet, invekturi apoplexiam potius unice cerebrum comprimendo.

CAP. IV.

De Apoplexia convulsiva, siue Nervæa.

49. **P**ostquam frequentiora, minusque dubia apoplexiæ tum sanguinæ, tum lymphaticæ, ac pituitosæ descripserim signa, earumdemque specierum plures saltem adnotaverim causas; de convulsiva, nervosæque, uti proposui, dicendum est; de ea nempe apoplexia, quæ ex spasmo exoritur, & ex vi quadam morbosa, sin minus in nervos unice, in eos

faltem primario fæviente . Plerique forte dum ea legant , quæ fum dicturus de his apoplexiis , quas ad nervofam revoco , aliquam afferent fanguineam effe , aliquam vero ferosam : haud ego quidem valde obftabo ; dummodo nervos fateantur caufam morbi proximam , aut hanc eandem efficientes , putentque ideo medendi rationem aliquo modo diverfam adhibendam effe .

50. De hac apoplexia mentionem facit SYDENHAMIVS (g) afferens eam ab hyfterifmo caput exagitante produci , in hemiplegiam definere , atque pituitofæ affimilari apoplexiæ , ab hac tamen differt caufa : illa enim puerperas corripit ; confequiturque partum , vel magnam hæmorrhagiam , vel gravem animi perturbationem . Scripfit de hoc morbo magnus BOERHAVIVS docens (h) , quin ulla adfit materies , aut humorum mutatio , omnes nervorum morbos effici poffe ufque ad apoplexiam ; de qua plura quoque verba facit HOFFMANNUS (i) imo

(g) Differtat. Epift.

(h) De Morb. Nerv. Tom. II. De Sympath. pag. 221. edit. Venet. 1762.

(i) Medic. Syft. Tom. IV. Part. IV. Cap. 1. De nervor. refolut. & Tom. IV. Part. II. Cap. 7.

vero in suis Consultationibus aliqua hujusmodi apoplecticorum profert exempla . Hic tamen Auctor commemorat eos unice spasmos , qui partes a cerebro semotas afficientes majorem sanguinis copiam , motuque percitam majore in cerebrum cogunt . Hinc ipse opinatur magnas animi motiones , iram præcipue , metumque apoplexiam gignere ; quatenus illæ spasmodicas contractiones excitant : hinc sanguinis circuitus perturbatio , majorque ad cerebrum humorum quantitas , atque impulsus . Videtur idcirco HOFFMANNUS judicare tunc solum ex spasmo nervorum apoplexiam nasci , quum ex ipsa eadem causa nimius affluat sanguis ad cerebrum , ibique fiat ejusdem congeries , aut e vasis effluxus .

51. Apoplexiæ nervæ meminit Scardona (k) ; meminit etiam MORGAGNUS (l) . Uterque tamen convulsione affici meninges sibi suadet : hinc ex harum convulsione desumere conatur uterque principia apoplexiæ , aliarumque subsequantium paralysum ; eademque imo ratione apoplexias explicant , quæ spasmos vi-

(k) Aphorism. De curand. Morb. pag. 11. & 22.

(l) Epist. An. Med. IV. n. 5. Epist. XI. n. 18.

scerum abdominalium, aliarumque partium subsequuntur. At me quidem later, quid tandem intelligant Auctores isti, quum ajunt meninges convulsas. Numne eas contrahi, distrahique alternatim putant sive regulariter, sive irregulariter? Id sane concipi nequit in dura Matre, quæ quidem ubique cranio quamartissime adhæret. Bina apoplexiæ convulsivæ exempla profert etiam Celeberrimus TISSOTIUS (m), & bina quoque profert Clarissimus LORRYUS (n). De hoc tandem morbo HAENIUS (o), POMMIUS (p), & præ aliis BURSERIUS Illustr. (q), scripsere, alique.

(m) Epist. var. argumenti pag. 89.

(n) De Morb. Melanchol. Tom. I. Part. I. Cap. V.

(o) Rat. Medend. Part. IV.

(p) Essai sur les Affections vaporeuses des deux sexes.

(q) Institut. Medic. Practic. Tom. III. Cap. IV.

CAP. V.

De signis Apoplexiæ Nervæ, sive convulsivæ.

52. **S**emper refert valde morborum distinguere species: at, malo quidem fato, ea indubia defunt signa, quibus possit dignosci specierum maxima pars: earum contra similitudo Medicos sæpe fallit perspicaciores. Nitendum est igitur, ut hæ species dignoscantur, assumptis simul, perpensisque diligenter pluribus earum signis. Hoc autem magni est momenti in apoplecticis, quibus statim mederi plerumque necesse est. Quum autem in casu nostro pars symptomatum, quæ genus apoplexiarum comitantur, cum iis coexistat necessario, quæ ad nervosas apoplexias pertinent; hinc simul hoc loci ea descripta inveniet Lector; qui tamen res perpendens sedulo alia ab aliis facile, ut spero, sejunget.

53. Ex continua igitur, attentaque observatione colligitur illos maxime nervæ apoplexiæ obnoxios esse, qui irritabiles admodum sunt, atque sensibiles, quique multa volunt animo, ac fervida cogitatione rem quamdam undequa-

que perpendunt, diuque. Hos inter recensendi ideo sunt hypochondriaci, atque hystericae, praesertim si puerperae, aut spasmodis ex difficili menstruatione divexatae: addantur quoque, qui spasmodis abdominis, calculis cystidis felleae, arthritide anomala, epilepsia, ac magnis animi perturbationibus solent excruciaci; praecipue vero, si alvus difficile deoneretur, si crassioris sanguinis lentescat motus, sique fluxus haemorrhoidum, mensiumve; aut sudor (r) pedum, axillarumque repente deficiat.

54. Hujus speciei apoplexiam aliquando per dies aliquot praecedere solent vertigines tenebrosae, rigoresque frigoris leves, ac musculorum tremitus; tum vero quaedam sensatio illi similis, quae quidem excitaretur si aquae rivulus aliqua corporis membra permearet: praeveniunt etiam cutis ariditas, genuum nutatio, major totius corporis debilitas, perturbationes infimi ventris majores, & quaedam tum cogitandi difficultas, tum res perpendendi. Quum autem imminet apoplexia augentur arteriarum pulsus, praesertim carotidum, atque durescunt; acce-

dunt aliquando immanes cephalalgiae, horrendæque artuum convulsiones; extrema corporis, signanter crura gelu rigescunt, ac quidam veluti fervor caput exagitat; aliquando angustiae etiam ad pectus perfentiuntur, & ad hypochondria.

55. Jam vero, quum invadit morbus, ægro tinniunt aures, magis accenditur facies, augetur anxietas, turbatur stomachus, viresque deficiunt: hinc solo, sed sensim, prostermitur; aliquando etiam & stantem se servat, & aliquantulum graditur. Loquela, ut plurimum, intercipitur ægro; siquando loquitur, proprium rerum nomen difficillime invenit, inventumque profert mancum, atque imperfectum. Vis mentis illi imminuitur saltem; aliquando perit omnino. In ægris, quos ego observavi, debilitas tantummodo inveni, atque confusas mentis facultates. Hæ post horas aliquot restituuntur, ut plurimum; licet post morbum, etiam levi ex causa, rursus obstupefcant, ac perturbentur. Præterea isti apoplectici faciem produnt sæpe maxime floridam, aliquando tamen & lividam uti observavit LORRYUS (t); eorumque pulsum irregularem, mini-

(s) De Melancholia Tom. I. Par. I. Cap. V. pag. 115.

mum, pessimum bihorio ante mortem Celeber. adnotavit TISSOTIUS (t).

56. Hunc morbum crebro sive valida, sive remissior consequitur hemiplegia. Sicuti autem in aliis apoplexiis adest summa ad somnum proclivitas, sic abest ut plurimum ab apoplexia spastica, qua correptos vidi sæpe alienos ita a somno, ut vel maxima angerentur vigilia. In membris vero paralyti affectis, quæ non raro rigida contrahuntur, subsultus sæpe deprehenduntur convulsivi: præterea cum motu careant, sensu, ut plurimum, pollent, imo haud raro exquisitissimo, ut & summis eadem membra afficiantur doloribus (7). At artus non modo paralytici, sed & corpus totum acutissimo fere pollet sensu in hac apoplexia: hinc & levi fri-

(t) Loc. cit.

(7) Huc venit adnotandum, quod scribit BUCHANIUS Med. Domest. Tom. IV. pag. 252. Ed. Neapol. asserens paralytes, quæ membris adimunt motum, non autem sensum, frequenter hypochondriacos adoriri, atque hystericas. RIVIERIUS quoque Obs. Cent. 1. Obs. 74. ad hypochondriacam, sive hystericam passionem pertinere existimabat paralytes convulsioni, ac dolori conjunctas. Credit quoque dolorem partes occupantem paralyticas significare nerveam fuisse apoplexiam, quam consecuta est paralytis.

gore apoplectici istiusmodi anguntur, & tenui quoque rumore exagitati vexantur. His autem nequeunt medicamenta tum interna, tum externa, quæ quidem irritent, exhiberi, quin maximæ in iis excitentur perturbationes.

57. Rebus huc usque expositis addenda est quoque ætas eorum, quos morbus, de quo agimus solet adoriri. Observamus enim apoplexiam convulsivam sæpius corripere juvenes ætatis annum infra trigesium. Sed contra docet HIPPOCRATES (u) seniores magis apoplexiæ obnoxios esse. Quum ergo apoplexia, de qua agimus, juvenes sæpe adoriatur annum infra trigesium, erit a Medico semper ætas perpendenda, qua morbi diagnosim sibi faciliorem reddere possit. Semper tamen meminisse oportet apoplexiam cujuslibet speciei aliquando nulli parcere ætati. Addatur etiam hujusmodi apoplexiam eos quoque adoriri, qui corporis structura, sive habitu carent, quibus faciliores reddi vidimus sanguineam apoplexiam, atque ferofam.

(u) Libr. II. De Morb. n. 21. & Lib. de Aphor. Sect. III. Aphor. 31.

58. Innuebam (n. 56.) nerveam apoplexiam sæpe hemiplegiam gignere perfectam aliquando, sæpius imperfectam. Licet ne mihi ea super hemiplegia aliquot hic congerere conjecturas, quæ si fieri potest, indicia multiplicent, unde hujus morbi species distinguatur magis? Has me proferentem Medici, ut spero, haut fatis arguent.

59. Primo itaque videtur paralyſis ab apoplexia frequentius lævum, quam dextrum corporis latus occupare: idque mihi quoque confirmatur ad mentem revocanti plurimos, quos ego adivi apoplecticos. Hinc ill. HAENIUS apoplexiam describens (x) Joannæ Poldin, quæ quidem nervea videtur, paralyticam memorat evaſiſſe latere dextro; licet ut ſubdit veluti admirans: *paralyſis ab apoplexia in dextro latere rarius*. Auctor idem quæſitum quoddam alibi (y) inſtituit, quod, licet paralyſes quacunque ex cauſa ortas reſpiciat, ad rem tamen noſtram opinor pertinere. Sic enim ille quærit: *Si paralyſis omnes non afficit artus, cur*

(x) Rat. Medend. Par. III. Cap. VI. pag. 244.

(y) Loc. cit. Edit. altera Cap. VIII. pag. 110.

lævam potius quam dextram corporis partem occupat ² In recensitis, subdit, decem casibus unius modo dextri est lateris; in cæteris hic non recensitis plerique omnes sinistrum latus sunt resoluti. Dumque adnotata mea revolvo præctica, videor dudum idem observasse.

60. Alii quoque observarunt generatim paralyfim. frequentius latus lævum resolvere, quam dextrum, uti, colligitur ex Cel. BARTHOLO-
NO (z); & inter alios Clariſ. recenset GARDANEUM, qui addit latus finistrum paralyticum confanescere difficilius quam dextrum.

61. At video adcuratissimum quoque MORGAGNUM idem observavisse: animadvertit enim (a) quod in quindicim veræ apoplexiæ sanguineæ exemplis, tres vidit apoplecticos lævo, binos utroque, reliquos vero dextro cerebri hæmisphærio læsos; ac proinde tres tantum cum hemiplegia ad dextrum latus observavit: læso enim dextro cerebri hæmisphærio latus ferè semper resolvitur finistrum. Ut vero explicaret frequentiore hanc lateris sinistri para-

(z) De L'Électricité Du Corps Humain Tom. I. pag. 470.

(a) Epist. an. Med. III. n. 18.

lysim , attendendum esse , ait , *dextras nempe plerasque partes corporis esse ut plurimum in frequentiori motu consuevisse , quam sinistras , & quod consequitur , vasa quoque non illarum modo , sed & cæterarum , quæ a dextris sunt , ob communicationes , consensuque laborare magis , & dilatari solita esse .* His vero positis ratio aliqua constare videtur , qua fiat ut ad dextram cerebri partem major adfluat sanguinis quantitas . Dilatationi autem majori , quam in vasis lateris dextri jure quidem supponit MOR-GAGNUS , mihi videtur addenda carotidis , subclaviæque dextræ ordinaria positio , quæ magis obsecundare debet adfluxum sanguinis ad cerebri dextram partem . Constat enim subclaviam , carotidemque dextras ortum communem ducere ex arcu ipso Aortæ , ad quas eadem ferme directione , qua in Aortam ipsam , cor sanguinem impellit . Quapropter quum ex constitutione carotidis , subclaviæque dextræ , & usu majori dextrarum partium , major in illas sanguinis copia , motuque percita majori trudatur , supponendum videtur magis infirmari paullatim debere tenuissimorum vasorum tunicas , hinc in parte cerebri dextra læsionem facilius posse exo-

riri, quæ lateris oppositi, idest lævi paralyfim fere gignit.

62. Quamvis autem ex his constare videatur hemiplegiam ex apoplexia generatim frequentius lævum, quam latus corporis dextrum occupare; ex auctorum nihilominus observationibus, quæ perraræ non sunt, meisque propriis videtur evinci, apoplecticos ex vitio nervorum potius parte dextra, quam sinistra paralyticos evasisse. Et revera HOFFMANNUS hemiplegiam refert (b) lateris dextri ex apoplexia, quam quidem ex nervis fuisse opinabatur. Æger enim hypochondriacus erat, & flatibus, ructibus, vigilia, tristitiaque jampridem angebatur: imo vero apoplexiam præcessere graves animi curæ, molestiæque. Hinc consultus HOFFMANNUS respondit: *hæ sunt fere accessiones, quæ viros hypochondriacos, fœminasque hystericas sæpe numero infestare solent* (c). Idem Auctor alterum memorat paralyticum lateris dextri (d) ex apoplexia, quam ex vitio nervorum arguebat. Tertiam quoque hemiplegiam hujusmodi descri-

(b) Consult. & Resp. Med. Cent. Sect. I. Caf. XVI.

(c) Loc. cit.

(d) Loc. cit. Caf. XVIII.

bit (e) ab apoplexiâ probabiliter nervea : hanc enim præcessit magna animi perturbatio, nec subsequēbatur mentis facultatum amissio : æger a somno abhorrebat quam maxime, & qua parte paralyticus, spasmō angebatur. Hemiplegiam dextri lateris refert LAZERME (f) in apoplectico, qui antea colica nephritica laceſcebatur. Eandem lateris dextri hemiplegiam memorat POMMIUS (g) ab apoplexia, quam vocat spasmodicam : hic æger convaluit usu juris expulso, clysterium ex aqua, tepentiumque Balneorum. At contra æger in pejus ruebat, quum quodam utebatur medicamento ex enula campana, valeriana, cinnamomo, cascarilla. LANCISIUS (h) apoplexiam describens Ill. SPADÆ, eam fuisse opinatur ex acri, tenuissimoque quodam vapore nervos permeante ; & dextrum illi latus refert paralyticum. SALODINUS noster juvenis Medicus diligentissimus, bonisque studiis addictissimus hemiplegiam lateris dextri, quæ brevi tempore evanuit, in quadam muliere in-

(e) Loc. cit. Caf. XXII.

(f) De Morb. Capitis Consult. XVII.

(g) Essai sur les Affections Vapoureuses Obs. IX.

(h) Repent. Morb. Obs. IV.

venit dudum ex vitio nervorum apoplectica . JACOBUS ANDREOLUS doctissimus Medicus, mei-que amicissimus paralyfim in parte dextra mihi retulit Presbyteri cujusdam apoplectici, qui ap-
prime hypochondriacus erat, irritabilis, atque
sensibilis . Ejusdem apoplexia videbatur sane
nervosa : eam enim præcedebant causæ, subse-
quebantur effectus, quibus hæc morbi species
solet dignosci . Tres ego observavi epilepticos
hemiplegia tandem correptos, iisque latus dex-
trum defecisse : eodem latere paralyticam eva-
fisse puellam quamdam epilepticam RIVERO scri-
bit JACOTIUS (i) :

63. Ex hisce observationibus, aliisque, quas
mox describam, constare videtur id non usuve-
nire, si de apoplexiis nervosis loquamur, quod
asserebat HAENIUS; nempe *quod paralyfis dextri
lateris ab apoplexia rarius*, quod tamen, ut vi-
dimus supra, confirmaverunt MORGAGNUS, at-
que GARDANEUS . Quid ergo dicendum? Num-
ne casu quodam fortuito factum est, ut illi Me-
dici clarissimi plurimas observarent apoplexias
aliarum specierum validiores, quas sæpius conse-

(i) Observat. Communicat. pag. 115.

quantur quidem lævi lateris paralyfes ; contra paucas nervosas , quæ remissiones esse solent , quæ forte sæpius hemiplegiam gignant lateris dextri ? HIPPOCRATES quidem ea , quæ sequuntur scripsit (k) , videlicet ; *In convulsionibus vocis interceptio diu durans mala est ; parva autem aut linguae syderationem , aut brachii , aut dexterarum partium significat .* Non secus ac si levi ex aphonìa metuenda sit tantum , aut saltem præcipue paralyfis dexterarum partium : silentio revera præterit lævas , innuitque tantum dexterarum corporis partes .

64. Quid ergo dicendum , si in nerveis apoplexiis dextrum potius , quam sinistrum latus resolvatur ? qua ratione , ac causa id fieret ? Numne nervorum spasmus potius , quam in dextram , agens in lævam cerebri partem , in hanc impellit majorem sanguinis quantitatem , aut ex ipsa præcludit sanguinis redditum ? Quod dextram carotidem magis quam lævam circumeant nervi , numne promovere hemiplegiam valeret lateris dextri potius quam sinistri in iis , qui spasmus afficiantur ? Præterea paralyfis , quæ

(k) Coac. Prænot. Sect. II. vers. 175.

dextrum frequentius occupat latus, esset ne simplex sæpe spasmus nervorum in membris insidentium, quin ulla cerebri adesset læsio? Quæ viscera dextro lateri adhærent, essent ne ad spasmus in suis viciniis excitandum aptiora, aliove modo ad paralysem gignendam? Re quidem vera WYTTIUS, quem citat TISSOTIUS (1), observavit in ægris duobus debilitatem, & insensibilitatem in dextro latere exortam, quum hepar utrisque suppuraverit. Numne ergo in apoplecticis hypochondriacis ideo lateris dextri exoritur sæpius paralyfis, quia eorum jecur jam male affectum est utplurimum, & in ipsorum cadaveribus aliqua ex parte saltem observatur sæpenumero læsum?

65. Præterea major pars hominum plus dextro, quam lævo utitur brachio: hinc diameter arteriis subclaviæ, brachialique augetur magis, quam arteriis iisdem partis lævæ. At si arteriæ immutantur ita, cur non & nervi? Atqui brachiorum nervi a spinali exoriuntur medulla. Numne ergo ex usu frequentiori brachii dextri, & forte etiam, ut consequens est, ejus lateris

(1) *Trat. de' Nervi* Tom. II. Part. II. §. 41.

totius, nervorum status immutari posset ita, ut ii sensibiliores, mobiliioresque evaderent? Numne iidem nervi in vasculis cellulosæ telæ (ex qua magna ex parte coalescunt) exercitio dilatatis majorem haurirent fluidi copiam? Numne hæc tandem e suis receptaculis egrediens velut hydropem inveheret in dextram spinalis medullæ columnam? HIPPOCRATES ipse videtur illud confirmare, quod paralytis in iis membris determinetur facilius, quæ magis defatigentur usu: *ex tussientibus*, ait ipse, *qui manibus laborabant velut servus ille, qui sarmenta obtorquebat. & Aminthæ filius ambo sola dextra resoluti cessaverunt. Qui vero aut equitarunt, aut iter fecerunt in lumbis, ac femoribus resoluti sunt* (m).

66. At causa licet ignota, effectus tamen videtur confirmari ex aliis nerveis, quas ego observavi, ut supra innuebam, apoplexiis, quæ dextrum quasi constanter latus resolverunt. Aliquot ex iis præcipue mere convulsivis libet huc loci referre. Nimis fortasse prolixus in iis describendis alicui videbor: at siquid ego video,

ex hac nimietate luculentius hujus morbi patebunt indicia, quibus a junioribus Medicis dignoscatur.

NERVEÆ APOPLEXIÆ.

HISTORIA

I.

67. **I**llustris quidam Canonicus nunc septuagesimum quintum agens ætatis annum excessiva tum animi, tum corporis sensibilitate, anxique conscientia usque a juvenili ætate angabatur. Studiis enixe incumbibat, in iisque stomachi dolore certa quadam periodo laborabat: convalebat vero nocturna intermittens studia. Sacerdos initiatus magis, diuque religione sollicitabatur. Quum autem quindicim abhinc annis per dies aliquot auditor adfuisset, Verbum Dei prædicantibus iis, quos Missionarios vocant; tunc continuo aucta est, quæ magna jamdiu illi erat, tum conscientiæ, tum nervorum sensibilitas.

Pluribus transactis annis nox, quæ diem præcessit quartam junii, anni 1783. eum tur-

bis vexavit, magisque exagitatus sub auroram, tinnitu quodam aures percelli, mentis cogitationes sensit confundi, ac veluti primos deliquii limites adivit. Quum res ita se haberent vocatus adfui prima vice suppeditaturus artis remedia. Ejus vidi faciem non saturato, sed roseo colore tinctam: ejus mentem aliquantum confusam deprehendi, ac perturbatam; deglutendi difficultatem observabam; linguæ usum impeditum quidem, non tamen omnino sublatum; os detortum; paralyticum latus dextrum, quod quidem non adempto sensu, sed maxime aucto, diris torquebatur doloribus. Præterea æger toto corpore acutiori sensu pollebat; difficilis a pluribus diebus erat alvus; pulsus vero, licet turgentes, non tamen duri, tardique uti fere inveniuntur in sanguinea apoplexia.

Tunc jussi e vena sanguinem mitti: hinc ægro levamen aliquod, quod tamen non augebatur secta rursus post horas circiter octo vena: glutinosus exhibat sanguis, nulla deinde obductus crusta. Aperiebatur alvus clysteribus emollientibus; neque enim stimulantibus uti poteramus, quin maximæ in toto corpore excitarentur turbationes. Itaque clysteribus, sero la-

ctis depurato, aliquibusque sedantibus remediis Æger post aliquot dies ore componebatur; post aliquot hebdomadas libere loquebatur, ac facile deglutiebat: exactis aliquot mensibus crure quantum satis utebatur, aliquantulum & brachio. Mens autem post horas aliquot a morbi invasione sibi restituebatur omnino. Interea tamen partibus paralyticis dira convulsione conflictatis, genitalibus sævo erethismo distractis, vigiliis defatigantibus, mentis impotentia ad res serio perpendendas, summaque tandem totius corporis sensibilitate optimus Æger per plures menses afflictabatur. Quæ quidem sentiendæ vis adeo acuta evasit, ut ex solo contactu pilorum vestis pellicæ, ex tenui quopiam sonitu, ex urina etiam urethram percurrente nimis laceffitus animo deficeret. Nunc temporis autem retusa aliquantum hujusmodi sensibilitate, imminuta quoque sunt, quæ illud vitium sequuntur incommoda.

HISTORIA

II.

68. **O**rnatissima quædam Virgo altero supra trigesimum ætatis anno structura corporis foelix, natura summe cogitabunda, irritabilis, sensibilisque a quatuor diebus haud bene se habebat, per biduum autem somno insolito laborabat. Tunc temporis dominabantur in aere tum calor, tum humiditas. Quum sub vesperras diei decimæ sextæ Junii an. 1786. caput ejus stupiditate quadam molestissima obtunditur: vocatus adfui, quæque sequuntur observavi. Erat illi facies veluti rosea, mens confusa: verbum aliquod prolatura, illius solas primas pronunciabat syllabas; aliquando etiam nomen rei proprium perquirebat frustra, idque eadem animadvertens turbabatur. Præterea tum brachii, tum cruris dextri motus omnino impeditus, aliquantulum etiam sensus: stomachus vero, pectusque angustis magnis opprimebantur. Decem ante dies menstruus illi sanguis solita quantitate effluxerat; a sex autem diebus fœces ab alvo nullæ.

Quæ quum ita comperissem clysterem iussi, venæque sectionem; hinc Ægra optima solabatur: mane sequenti incommoda minuebantur adhuc; motus, sensusque ferme restitutus vigebat. Contra quærebatur ventrem flatibus perturbari, & caput affici, ac si receptaculo quodam angusto coarctaretur: hinc blande alvus purgata est. Elapsis diebus circiter octo omnia sedabantur; si tamen excipias reliquum aliquid difficultatis tum ad res enixe animo perpendendas, tum ad oculos in certum quodpiam objectum diutius intendendos.

HISTORIA.

III.

69. **I**ncepto Februario anni 1786. ingenua quædam Virgo ægrotavit. Ipsa valde sensibilis ab annis aliquot levi quodam manuum tremitu, subsultuque afficiebatur. Jamvero a pluribus diebus animo satis perturbata, menstruoque fluxu evasa, vix elapsis Februarii Kalendis, repente capite torquetur, quod primo æstus validus, sonitusque molestus urgebat. Facies, quæ quidem natura pallebat, florido

quodam rubore imbuebatur, elataque voce auxilium flagitavit: subinde vox intercepta est: mens illi confusa, tumensque lingua, atque torpescens. Familiares venam illi contusam cupiebant; Medico vero improbabatur, qui *Ægræ* antispasmodica obtulit remedia. Post horas aliquot soluta loquela, mens illi ordinabatur rursum, cogitatione tamen, memoriaque parum firma: imposterum lateri dextro omnis fere motus, sensusque patuit ademptus; dum membris reliquis naturalis mobilitas, atque sensibilitas mirum in modum augebatur. Post dies vero circiter decem, & latus paralyticum naturali motu, nimioque sensu vigeat.

Elapso circiter mense validior renovatur apoplexia. Virginis facies vivide iterum rubebat, tinniebant aures, lingua torpescibat: magna cum difficultate *Ægra* deglutiebat, atque loquebatur, imo loquens sæpe quædam verba invito animo proferebat, impotens ea, quæ volebat, pronuntiandi. Iterum latus ejus dextrum motu ferme, ac sensu carebat, osque detorquebatur: quæ quidem phænomena nonnisi post octo dies evanescebant; latusque corporis paralyfi affectum nonnisi post quindicim

reviviscebat. At major solito sensibilitas perdurabat, notabilisque tum loquendi, tum deglutiendi difficultas. Tunc temporis secta vena omnia in melius vergebant: hinc major sanguinis quantitas nova venæ-sectione emissa est: & omnia in pejus ruebant: adeo Medicum decet circumspectio in venæ-sectione imperanda, quum de nervorum morbis agatur! Ab Ægra tunc sumpti flores *Zinci* tenuissimam adferebant utilitatem, ferrum contra certum damnum.

Ægrotans, quum res ita se haberent, me consultura advocavit. Eam inveni magnis percitam terroribus, facile mente evanescentem, ad deglutiendum, atque loquendum impeditam aliquantum. Brachium utrumque deprehendi torpens, & corpus reliquum extra modum sentiens; ita ut maxime exagitaretur Ægra si qui colloquerentur, aut gradu moverentur: imo quidquid & tenuis susurri, strepitus etiam solearum lignearum, quibus sceminæ utuntur, eam vexabant ita, ut statim ejus linguam pungens torpedo; ac dentes, maxillasque lacefferet quædam molesta, terrenisque distractio. Memoria ante morbum satis firma vacillabat; nec

lectioni, nec scriptioni poterat vacare: scribere volens determinatum verbum, proprias ejus litteras, sed inordinate delineabat. Toto corpore angebatur, nisi tepido se colligeret loco: abhorrebat a cibis quam maxime, & linguam prodebat scdam.

Sic stantibus rebus mannam præscripsi: hinc cibos sumpsit libenter. Subinde per dies aliquot mane aliquantulum cremoris tartari, & mediocrem feri ex lacte depurati quantitatem potabat. Circa Nonas Majas, deprehensis pulsibus exasperatis aliquantum, atque durescentibus, paucum sanguinis mittebatur; hinc lento quidem gressu, sed continuo solabatur Ægra. Continuo illa de more lactis sero utebatur; interjectis autem vicibus aliquantulo cremoris tartari. Post dies vero a morbi invasione circiter quinquaginta sumebat quotidie modicam dosim valerianæ, atque chinæ-chinæ. Ex his levabatur valde; loquebatur enim facilius, melius deglutiebat, illique satis imminuebatur maxima nervorum sensibilitas, atque mobilitas; quod ut obtineret facilius præscripsi aliquantulum spiritus vitrioli aquæ immiscendum. Ad id temporis tepens Balneum domesticum, sed

valde caute adibat : hinc majus semper levamen , quod quidem adeo crevit in dies , ut convaluerit omnino .

HISTORIA

IV.

70. **N**obilissima quædam Virgo annum ætatis agens vigesimum quintum , ingenio , animique summa virtute prædita , nervis autem valde sensibilis , post noctem somno traductam apoplexia corripitur . Rosea illi erat facies , os detortum , oculus satis monstrose protuberans , mens aliquantum confusa , dextrumque latus paralyticum . Lenibus tantum medicamentis convaluit . Reliqua tamen illi adhuc est sensibilitas solito major , oculusque haud quidem suo loco restitutus .

71. Ast oportuniori loco aliæ hujus speciei exponentur apoplexiæ . Nunc vero , ut melius hæc nervea , sive spastica distinguatur apoplexia , præstat discrimina ostendere , quæ inter hanc , aliasque quasdam nervorum ægri- tudines intercedunt .

In quo discriminantur Apoplexia Nervea, præsertim mere convulsiva, Suffocatio hysterica, & Epilepsia.

72. **N**ervorum ægritudines spasticæ apoplexiæ affines sunt præsertim *suffocatio hysterica*, & Epilepsia. At nervea quidem apoplexia difficilior quam sanguinea, atque serosa distinguere potest a *suffocatione*: imo ea apoplexia, quam hysterica dicunt, vocari posse videtur postremus suffocationis hystericae gradus. Verumtamen tum quæ comitantur apoplexiam hysterica, tum quæ præcipue subsequuntur, ostendunt, aliquatenus, quam ab huiusmodi morbo differat *hysterica suffocatio*. Mulieres enim in *suffocatione* pulsus produnt angustos, depressos, nullos etiam aliquando, ut in syncope, quum nempe hysterica passio sæviat vel maxime: apoplectarum nervearum pulsus nimis diversi sunt, ut supra innuimus (n. 54.). Quum vero scæmina a *suffocatione* hysterica resurgit, memorat quidquid affidentes dicebant, quidquid operabantur, dum vita functa vide-

batur. Me quidem haud latet apoplecticas etiam ex nervis aliquando rerum meminisse, quæ morbo ingruente acciderant; quum nempe levis eas corripuit apoplexia, in qua rerum cognitio non aufertur, sed tantum, ut supra innuimus (n. 55.) confunditur: at fere semper memoria retinet confuse, nec omnia, quæ acciderant, sed tantum aliqua. Si vero validior ingruerit apoplexia, omnium quidem rerum obliviscuntur. Hoc quoque discrimen CAELIUS asserebat (ille autem loquebatur de apoplexia generatim) inter hos morbos intercedere: sic enim ait (n): *cessante affectione apoplectæ fœminæ nesciunt gesta; illæ vero, quæ matrice fuerint præfocatæ, resipiunt, atque narrant quemadmodum fuerint oppressæ.*

73. Accedit quod hysterica passione oppressarum clausos observamus oculos, & faciem naturali fere colore imbutam. Postremo tandem cessante *suffocatione*, licet diutina, nunquam paralyti, sed universali tantum atonia laborant: loquela illis non remanet intercepta, sed paulo post convalent omnino. Quid vero si vires

(n) Acutor. Morbor. Lib. III. pag. 145.

mentis attendamus ? Post *suffocationem hystericam* nihil ex mentis facultatibus adimitur . At quantum contra vires tum corporis , tum mentis , ut supra vidimus , ex apoplexia læduntur ?

74. Certis quoque indiciis distinguitur hic morbus ab Epilepsia . Hæc enim ægro & omnem , & semper cognitionem aufert , si perfecta : convelluntur præterea epileptici , totumque corpus insolitis omnino motibus torquetur , atque exagitur ; quæ quidem absunt ab apoplecticis . Postremo tandem apoplexia una tantum vice plus lædit mentis facultates , quam epilepsia pluries renovata .

75. Verum ægri recensitæ prædispositiones (n. 53.), phænomena morbum præcedentia (n. 54.), morbi ejusdem jam sævientis symptomata (n. 55. 56. 57. 58.), & ea tandem (n. 72. 73. 74.) exposita , quibus ab morbis affinibus discriminatur apoplexia nervea ; hæc , inquam , omnia observari unice possunt in ægro , qui adhuc vivat . Quoniam vero Medico rationem indicant medendi morbo , aliis præstare videntur , quæ sectis cadaveribus , queant deprehendi . Nec ista tamen spernenda sunt : & ipsa

enim morbi naturam significant, atque confirmant. Quamobrem nervosam dicunt certius apoplexiam, si sectum apoplectici cadaver cerebri prodatur, cerebellum, aliasque partes nullo vitio inquinatas, a quo gigni poterat mors.

76. Plura sine vitio observarunt Medici cadavera apoplecticorum: hoc loci aliquot satis est indicare. Duo observavit celeberrimus TISSOTIUS (o): in capite primi *ne minimum quidem inveniebatur vitium*: in altero etiam nihil vitiatum, si tamen excipias *cor paullo æquo majus, mollius, pallidiusque*. In secto juvenis foeminae cadavere, quam vita functam describit HAENIUS (p) ex apoplexia, ipse deprehendit unice pulmonem leviter pleurae adhærere, ileumque tres vermes continere. Nihil tandem vitii observavit BOUCHERIIUS (q) in cadavere Virginis, quæ anno ætatis suæ vigesimo primo convulsiva apoplexia occubuit, post iteratos epilepsiæ accessus. Mirum quidem est, re tamen vera non solum invenitur cerebrum, sed & aliæ corporis partes, quæ post mortem nullum læ-

(o) Epist. varii argumenti pag. 88.

(p) Rat. Medend. Part. IV. pag. 36. & 37.

(q) Apud BURSERIUM loc. cit. Tom. III. Cap. IV.

fionis indicium proferant, quum vivente homine vel maxime læderentur. Xenedochio Verfaillienfi, ait QUESNEYUS (r), observabantur colicæ quædam convulsivæ adeo sævientes, ut ægris mortem afferrent, quin tamen vestigium læsionis ullum in eorum intestinis post mortem posset deprehendi. Nuper clarissimus GENNARIUS (s) explicat qua ratione serum innumeras cerebri rimas, sive interstitia ab ipso observata pervadens, licet nec nimium, nec nimis densum, sed tamen præter solitum acre, morbos inferre possit lethales in cerebrum ipsum, quin ullam post mortem prodat morbidam imutationem.

77. Animadversis tamen in ægro vivente nervæ apoplexiæ indiciiis, non ideo negari posset hujus speciei fuisse morbum, dum aliqua aquæ quantitas post mortem in cerebro inveniretur. Quidquid enim actionem nervorum immittit, sive alio quocunque modo perturbat, imminuere quoque potest, atque turbare sanguinis motum per vasa cerebri: hinc major secernitur

(r) Memoires de L'Academ. Roy. de Chirurgie Tom. I. Part. I. pag. 19.

(s) Giornale per servire ec. Tom. I. pag. 377.

feri copia, quæ cerebrum obruere potest; tunc vero in cadavere inveniuntur signa compressionis, licet morbi causa sit unice sita in nervis male affectis.

Id autem colligi signanter potest ex epilepticis quibusdam, ut notat CULLENIVS (t). In iis enim plures post vices sævientis, quiescentisque epilepsiæ subsequi observamus aliquando aut dementiam, quæ quidem a nimia in cerebro collecta pendet ferositate; aut veram apoplexiam, & in horum cadaveribus, sanguinem, serumvè, quod cerebrum opprimit, invenimus; licet morbus primario e nervis exoriretur. Apposite ergo scripsit BOERRHAVIVS (u) *apoplexiam æque gignere aquam, quam quod gignatur ab aqua.*

(t) Instit. de Médec. Pract. Tom. III. pag. 71.

(u) De Morb. Nervor. Tom. II. pag. 221.

*Apoplexiæ Nerveæ Divisio in idiopathicam ,
& in sympathicam .*

78. **S**edes diversa causarum , quæ nerveam invehunt apoplexiam , Medicos induxit ad hunc morbum distinguendum in idiopathicum , & in sympathicum . Idiopathicam vocant hanc apoplexiam , quum causæ illam efficientes insident initio nervorum , idest cerebro , quod spasmo , aliave ratione laceßunt . Sympathicam dicunt quum dictæ causæ a cerebro semotæ in ipsum sympathice tantum agant . Sed quum mihi videatur aliquando arduum esse , sedem statuere tum causarum spasmi , tum spasmi ejusdem , ideo subdo me eam vocare apoplexiam nerveam idiopathicam , quam gignunt mobilitas excessiva , & sensibilitas nervorum , aut aliæ causæ , quæ sua natura primario , & immediate agunt vel signanter in sensorium commune , vel in totum nervorum systema ; cujus generis sunt animi pathemata , quædam venena , immanis dolor , immodicæ evacuationes , aliaque hujusmodi . E contra sym-

pathicam voco nerveam apoplexiam, cujus causæ saltem occasionales remotæ a cerebro videntur idem per consensum lædere; aut eam, quæ gignitur ex humoribus in cerebrum irrudentibus; si tamen eos illuc coegit spasmus a cerebro remotus, qui ex. gr. excitetur in imi ventris visceribus.

79. Non est forte explicatu arduum, quæ ratione gignatur ea apoplexia, quam supra vocavimus *idiopathicam*; quum infideant cerebro causæ, quæ ipsum irritantes, sive alio quocunque modo lædentes, possunt apoplexiam producere. Sed difficile quidem est explicatu quæ ratione illa excitetur apoplexia, quam dicunt *sympathicam*.

80. Duplici modo videntur, causæ a cerebro remotæ lædere cerebrum posse, unde *sympathica* exoriatur apoplexia. Primum lædunt, quod facile intelligitur, quum spasmus torqueant corporis partes in quas agunt; puta infimum ventrem: tunc enim sanguis, obstructis spasmus vasis abdominalibus, aut saltem eorum capacitate imminuta, majori quidem impetu, ac quantitate fertur in cerebrum; cujus vasa nimium distrahere, ac forte potest disrumpere. Sic sentit

HOFFMANNUS, ut (n. 50.) innuimus. Secundo ædem causæ possunt, quod tamen difficilius explicabitur, cerebrum lædere, licet ab ipso remotæ, simplici quodam consensu; quin tamen in cerebro post mortem ulla deprehendatur morboſa immutatio. Vana enim est opinio, ac falsa, saltem sæpe, eorum, qui putant ex convulsionibus sanguinem majori semper velocitate, ac quantitate in cerebrum trudi. Nam in plerisque convulsis arteriarum pulsus satis exiles, & aliquando evanescentes haud certe innuunt majorem sanguinis impetum. Revera dissectis infantum cadaveribus, qui periire convulsi, haud vasa cerebri sanguine proderunt referta (x).

81. Hanc summam difficultatem in *consensuali*, ut ajunt, apoplexia explicanda fatetur quoque Clarif. BURSERIUS (y). Hinc postquam aliorum opiniones confutare conatus est, canque etiam, quæ docet spasmodum per nervos cum medulla cerebri communicari, hac super re suas aliquas profert conjecturas. Numne, conjiciens ait, spastica contractio propagatur usque ad minimas cerebri arteriolas, quibus spasmo con-

(x) SENAC Trattato Della Strutt. del Cuore Tom. IV. pag. 44.

(y) Loc. cit. Tom. III. §. 104.

tractis commercium intercipiatur inter cerebri corticem, medullamque, atque inter hanc, & reliquas corporis partes? aut forte extrema nervorum a causis spasmi laceffuntur adeo, atque labefactantur, ut eorum etiam origo, cerebrum nempe, similem labem in tenerrima elementari fabrica incurrat? hinc autem ea fibrarum subversio, aut alia quælibet præter naturam mutatio exoriat, quæ motum, & sensum extinguat?

Quidquid sit de hisce Auctoris spectatissimi conjecturis, fateor me latere rationem, qua spasmus longe a cerebro excitatus cerebrum lædat ita, ut apoplexia enascatur, quin ullum in cerebro eodem morbi vestigium relinquatur oculis profectoris percipiendum. Ego enim ignorantiam minus odi, quam errorem. Quare his prætermiſſis ad causas spasmus efficientes investigandas statim tranſeo.

CAP. VIII.

Causæ exponuntur Apoplexiæ Nervæ præsertim Idiopathicæ.

82. **C**ertissimum est, præcipue hominis sensibilitatem, mobilitatem, atque irritabilitatem facilem efficere hanc apoplexiam. Iis enim positis dispositionibus, nervi levissimis causis ad extra existentibus, & ad tantos effectus imparibus perculsi eos motus vi propria excitant inordinatos, violentosque, qui turbas cient enormes; non secus ac si validissimæ in corpore adessent causæ. Cerebrum vero præsertim semper est ad spasmus proclivius: quapropter ex ejusdem spasmō enasci potest apoplexia.

83. Nil mirum ergo, si, qui multa cogitant, ac res diutius perpendunt, facilius hoc morbo corripuntur. Studia enim, rerumque meditatio signanter, & directe cerebrum defatigant; quod his de causis spasmus adoritur facilius, quam alias corporis partes. Nuper hujusmodi forte periit apoplexia immortalis EULERUS. Agebat annum ætatis suæ septuagesimum sextum. Die septima Idus Septembris,

inito calculo , ascensum aereostaticarum Machinarum metiebatur , quæ per totam tunc celebrabantur Europam : deinde super Planetam Herschellium , ejusque orbitam subtilissime differens , delapsa de improvviso , qua tabaci fumum hauriebat fistula , mathesi , ac vitæ ereptus est (z) .

84. Præterea cerebro hac ratione disposito , præcipue quum mens diutius rem unam meditatur enixe , anxieque , furor ille facile exsurgit , quem *enthusiasmum* vocant . Quot vero homines ex hujusmodi furenti , ut ita dicam , mentis æstro repente obiere ! Inter cæteros censendus est ille Actor , qui vita decessit , dum furens tragicam agebat personam . LORRYUS (a) Rhetorem quemdam agnovit , qui HOMERI lectione extra se ipsum rapiebatur ita , ut sæpe animo deficeret . Parochus quidam , uti refert celeberrimus ZIMMERMANNUS (b) , sacra commendabatur eloquentia : ut laudem hujusmodi servaret sibi , augetetque , diu noctuque conabatur men-

(z) Éloge de M. EULER par M. le Marq. de CONTORCET .

(a) De Melanchol. Tom. I. Cap. VI. pag. 144.

(b) Traité De L'expérience en general Tom. III. Chapitre VII. pag. 301.

te. Hinc viribus corporis destituebatur, memoriaque, quæ, & magis deficiebat, quo nisu majori eam augere contenderet. Postremo apoplecticus evasit, atque hemiplecticus. Qui ad excessum sacris vacant meditationibus, ferri solent in eos, quos dicunt *Raptus*, *Ecstasesque*; ac sæpe in apoplexiam desinunt. Novi paucis abhinc annis, Cænobitam quemdam, qui magno quum nisu res sacras meditaretur, stomacho veluti urebatur, ac pectore: paullatim defecerunt illi mentis facultates, atque lethali apoplexia correptus est. Hæc est apoplexia, quæ vocabatur a summo BOERRHAVIO (c) *apoplexia sensorii communis*, & quam immedicabilem fatebatur HELMONTIUS, scribens; *quando apoplexia oritur a superbia ideæ, hanc remedia paracelsica non curant, nam malum est spirituale; si vellem hic per medicamenta curare, nova indigerem arte.*

85. Ast haud rari sunt illi quoque, qui ex magnis animi motionibus apoplectici moriuntur. An hæc apoplexia ex eo gignatur, quod corpus spiritibus, ut ajunt, animalibus exina-

(c) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 221.

niatur; aut quod spasmus universi corporis majorem sanguinis copiam, motuque percitam majori in cerebrum cogat, quæ vasa ejusdem dirumpens hæmorrhagiam gignat, uti observamus in hæmophysi convulsiva; aut quod fiat paralyticum, percellentibus nimis animi motionibus, sensorium commune, uti videtur celeberrimo TISSOTIO (d); aut quod animi quædam pathemata fluidum nerveum, (quod ferme in idem recidere videtur) motu destituant, uti putat celeberrimus CULLENIIUS (e); aut quod in hisce violentis animi motibus fibræ sensorii communis obstringantur magis, magisque rigescant, adeoque actioni impares evadant, uti sustinet LORRYUS (f); an alia ratione; me libens fateor latere; meoque judicio alios quoque latere debet, cum certe pendeat a legibus commercii animam inter, & corpus; quæ densis nimis tenebris obducuntur. Certo tamen videtur hujusmodi apoplexia a nervis provenire, quos nimis percellunt animi commotiones.

(d) Tratt. De' Nerv. Tom. II. Part. I. pag. 201.

(e) Institutions De Médecine Pratique Tom. III. art. 1115.

(f) Loc. cit. Tom. I. Par. I. Cap. IV. pag. 94.

86. Re autem vera quot possunt apoplectici recenferi ex animi commotionibus, quibus homines obnoxii sunt? Ipsa eadem lætitia, qua tamen perfruimur raro, mortem repentinam invexit aliquando. Historici Romani matrem quandam referunt vitam liquisse repente, vix filio revifo, quem vita functum apud Cannas dudum crediderat. FOUCHETIUS celebris, vix ab ALØYSIO XIV. donatus libertate, obiit de repente. JUVENTIUS THALNA, vix novit decretum sibi de Corfis subactis triumphum, ad Aras gaudio interiit repente, dum Numini grates sacrificiis agebat (g). TISSOTIUS DIAGORÆ mortem ex nimio gaudio commemorat, postquam tres Gnatos vidisset corona vinciri (h). Plura hisce similia profert Auctor idem. Meminit quoque LORRYUS (i) hæredis LEIBNITZII e vita repente decedentis, inventa, ac vix inspecta, quæ auro cumulata erat, arca. Alios quoque HALLERUS (k) innuit obiisse repente aut *libertate*, aut *reddita sibi amata puel-*

(g) Apud ZIMMERMANNUM loc. cit. Tom. III. pag. 218.

(h) Essai sur les Maladies Des Gens Du Monde art. V.

(i) De Morbor. Conversionibus pag. 118.

(k) Elem. Physiol. Corp. Human. Lib. XVII. Sect. II.

la. Narrat BOERRHAVIUS (1) Pyratam crudelissimum præ summa lætitia repente mortuum fuisse, quum filium suum vidisset redemptum, quem pro perduto habuerat. SOPHOCLES victor pronunciatus in tragœdia repente exanimatus est: idem FILIPPIDI accidit Comœdiarum auctori. Libet tandem hic adnotare, quod apud Historicos Venetos legimus. VICTOR Patritius Venetus ex Patre ALOYSIO DIEDO, adolescens indole ingenuus, ingenio perspicax a Patre tradebatur Obses anno 1480. Turcarum Imperatori in Urbe Constantinopolitana. Suis Ipse manibus testudinem quamdam concinnavit egregie, a qua musicos eliciens sonos, Tyrannum suaviavit adeo, ut ab ipso libertate prius donatus, magnis subinde cumlaretur muneribus. Progressu temporis data fide de reditu suo, Venetias, assentiente Sultano, Suos convifurus contendit. Idque vix Pater, Fratres, Sorores, Consanguineique persentire, præcupidum juvenem multis comitantibus Cymbis obviaturi ad eum pervenerunt, quem Portum duorum Castrorum vocant. VICTOR spectaculo

(1) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 222.

commotus, gaudioque vocem amittens repente apoplecticus inter Suorum complexus interiit.

87. Ex ira quoque apoplexiam enasci haud raro observatum est. Id confirmat inter cæteros SCARDONA (m) observatione quadam, quam TOZZIUS refert; *Ipse novi, scribit, lanionem quemdam, qui cum vellet quemdam adoriri, a quo fuit injuria affectus, ab illo frustra carnis ictus ira simul, & timore commotus repente concidit, & mortuus est.* Apoplexiam ex eadem causa adnotavit TISSOTIUS (n). Lis erat inter puellas amicas super colore funiculi, quo vincienda erat vestiuncula cujusdam parvi suarum deliciarum simulacri. Hac super re satis rixatæ sunt: una ex ipsis ætate annorum septem, quum summa exardesceret ira, e cubiculo evasura in januæ limen corripiebatur apoplexia: hinc ipsi læva manus paralytica, qua nunquam convaluit. Vir quidam Bernæ tum in bellicis rebus, tum in politicis præclarus magni momenti munus exposcebat: denegabatur; indignatus apoplexia, & post horam morte corri-

(m) Loc. cit. pag. 16.

(n) Loc. cit. Tom. II. Par. II. Cap. IX. §. 119.

piebatur (o). Alii quoque morbi apoplexiæ affines ex ira jam observati fuere. Uxor, referente VALERIO MAXIMO, NAUSIMENIS Atheniensis prospiciens gnatum, filiamque incestuose coire, insanabiliter obmutuit. *Puella*, inquit STOLLIUS (p) *ob negatam ab Hera mercedem irascitur. Mox phrenitica fit, frequenter convellitur; perit die quarta. Cadaver sedulo perquisitum nil prorsus alieni ostendit.*

88. Terror etiam vitam repente adimere potest. TISSOTIUS refert, reum quemdam, vix nuntio audito de mortis pœna a iudice contra eum pronunciata; subito obiisse (q). Auctor idem spectatissimus alibi (r) mulierem quamdam memorat prægnantem, quæ uterinas experiebatur hæmorrhagias: fauste hæc compeſcebantur, vigeabant vires, pariendi imminebat tempus; hinc de ejus salute spes satis certa affulgebat. At gravi perculsa terrore deficit, excitata delirat, crastina die nova, sed prima minor accedit hæmorrhagia, & Ægra unius ho-

(o) ZIMMERMANN. Loc. cit. Tom. III. pag. 272.

(p) Rat. Med. Tom. III. De Caus. & Sed. Phrenitid. pag. 242.

(q) Loc. cit. Tom. II. Par. I. pag. 247.

(r) Epist. var. argum. pag. 91.

ræ spatio moritur. *Et quidni*, subdit, *ex nervis mors?*

89. At grandis quoque animi dolor, qui de repente excitetur, apoplexiam invehit aliquando. HELI Pontifex Hæbreorum, Judexque annum agens nonagesimum octavum interiit statim, ac dolens audivit populum ab hoste profligatum, Arcam Testamenti abreptam, gnatum utrumque peremptum (s). PUB. RUTILIUS obiit repente, quum Fratri consulatum negassent Romani (t). LANCISIUS (u) vidit Senioremem quemdam inter cœnandum repentina morte sublatum, quum ipsi adventum nuntiassent consanguinei sui, quem non sibi honoris futurum esse putabat. Adolescens quidam (x) viduam amans perditæ, accepto per epistolam repulsæ nuntio, procubuit humi, eademque die mortuus est. LORRYUS (y) observavit apoplexiam, quam quidem dicit hysteriçam, ac subsequentem paralysem cujusdam Matronæ, audito

(s) Lib. I. Regum Cap. IV.

(t) PLIN. Natur. Hist. Lib. VII. Cap. XXXVI.

(u) De Subit. Mort. Lib. I. Cap. IX. art. 18.

(x) SAUVAGES Nosol. Class. VI. §. XXVIII.

(y) De Morb. Melanch. Tom. II. Par. I. Cap. II. pag. 157.

vix nuntio sibi funesto. Memorat BOERRHAVIUS (z) Virum quemdam, qui in Galliis ad tumultum paternum hærens, deflensque mortuus est. Celeberrimi GAUBII quidam amicus monitus de morte Fratris sui properans pergit Hagam Comitum: ejus cadaver conspiciens angitur, viribus destitutus sedet, moriturque ita subito, ut cum Fratre tumultatus fuerit (a). In obsidione Budæ occidebatur (b), Germanus fortissimus, qui vel superna virtute pollens hostes profligare cernebatur. Dux exercitus inquirebat quis esset occisus? agnoscens unigenitum suum hærens aliquantum obstupuit, & mortuus est. Dum scribebat ZIMMERMANNUS celebrem de Experientia librum, vita defuncta est Uxor Principis GEORGII ALOYSII Olfatiæ: Vir mœstissimus accedit feretro, quod ex lignis pretiosis nuper fabrefactum sustentabat Uxoris cadaver. Cubiculario quemdam pium librum legente, ut Princeps jusserat, idem ex oculis lacrymas, ex pectore effundens suspiria moritur repente (c). Amicus meus, compaterque, vix

(z) Loc. cit. pag. 223.

(a) Serm. Acad. alter. pag. 27.

(b) BOERRHAV. loc. cit.

(c) Loc. cit. Tom. III. Chapitr. VI. pag. 259.

lectis litteris, quibus ille in iudicium vocabatur de summa rerum, apoplecticus evasit, laterisque dextri paralyticus, loquelam amisit omnino, non tamen cognitionem; at ille perfecte convaluit.

90. Quum vero prægnantium, & puerperarum nervi sint ad spasmum procliviores, hinc iis periculum imminet majus hujusmodi spastica, de qua agimus, apoplexiæ (8). Et, ut verum fatear, mihi plerumque visum est, præcipue ex spasmī causa mulieres vitæ periculum subire, sive illis immineat partus, sive in partus actu, sive expleto jam partu. Spasmo e contra evanescente eas facile adjutas, tum arte, tum natura haud raro observavi.

(8) Puerperarum nervi æstimari solent ita sensibiles, morbo-
sisque obnoxii deordinationibus, ut purent plerique ean-
dem ipsam *puerperalem* febrim, aliquando saltem, indolis
esse nervosæ (ERN. CHR. NOLTE Dissert. de Febre Puer-
perar.). Hoc idem suspicatus est Clariss. FRANKIUS val-
de plaudendis innixus meditationibus. Ejus suspicionem
confirmant quæ mulieres sub ipso partu mortali corripimur
apoplexia, *quam aliquando*, ut Ipse scribit, *nervose*
indolis esse in parturientibus dubium non est. Delect.
Opusc. Med. Vol. V. pag. 57. in Adnot.

91. Adnotavit jam BOERRHAVIUS (d) nonnullis mulieribus in extremis partus nixibus exoriri semper epilepsiam, ita ut sine ullo pariant sensu; addiditque in summis primi partus laboribus plures mulieres maturiore nuptas ætate affici epilepsia, & fere semper cum suo fœtu mori, nisi hic prompte educatur. Nuper observavi mulierem spasmus dire occupatam, cui fœtus extrahebatur, epilepticos motus procedere, subinde mori repente.

92. Hæc autem terribilia accidunt facilius, si mulieres hujusmodi animo commoveantur. MORGAGNUS (e) terrens puerperæ fatum narrat. Ipsa affectionibus hysterice obnoxia in lucem emisit fœmineam prolem, quum multiplici ex causa præcuperet masculinam. Vix partu peracto, Vir quidem imprudens sexum prolis nunciavit uxori: illico huic pulsus defecerunt, corpus friguit totum, & intra sesquihoram mortua est. Defatigatio ex partu difficili, & terror exinde ortus in causa fuere, referente SEBASTIANO ALBRECHTO apud MORGAG-

(d) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 320.

(e) Epist. Anat. Med. XLVIII. n. 44.

GNUM (f) cur alia puerpera *inter loquendum præter omnium opinionem* mortua fuerit.

Ruricola quædam mulier pro sua conditione satis delicata paullo post partum putrida corripiebatur febre. Aptaverunt coxendicibus vesicatoria, quibus ruditer pertractatis a quodam rustico, qui vices gerebat Chirurghi, ira exardens, ac dolore pressa ululavit ægra, statimque emortua est.

LORRYUS (g) sensibiles adeo, mobilesque credit puerperas, ut aliquando subita morte earum quasdam corripere opinetur ob nimiam, qua affluunt, lætitiâ exactis partus laboribus, nuntiataque prole mascula in lucem emissa. Quare, qui sive prægnantibus, sive puerperis adstant, in primis evigilent, necesse est, sedulique caveant, ne illæ irritentur, aut alia animi commotione afficiantur; præcipue si habitudine sint sensibiles valde, mobilesque. Tunc enim unicum quandoque verbum, gestumque functionissimos gignere potest effectus.

93. Itaque affirmabam nervosæ indolis apoplexiam adoriri prægnantes, puerperasque; nec

(f) Loc. cit.

(g) Loc. cit.

tamen easdem puto esse immunes apoplexiā, quæ sive fit ex partus conatu vasa cerebri dirumpente, sive ex lactea, sive ex lochiali, quæ in cerebro colligatur, *metastasi*. Non me latet in cranio post subitam mortem sæpius inventam fuisse lacteam materiem (h): nec latet HIPPOCRATEM scripsisse (i); *Si mulieri puerperii purgatio ad caput irruat (id enim contingit), plerumque statim moriuntur*; quod quidem posteriores confirmant observationes (k).

94. Ast aliqui forte censere possunt, potius ex syncope, quam ex apoplexia induci mortes huiusmodi subitaneas, quas ego cum Recentioribus plerisque clarissimis ad genus apoplexiæ revoco: nec quidem cum hisce falli existimo. Si enim, præsertim ante hæc tempora, non omnes ita opinabantur; ideo forte erat, quod violentæ animi affectiones sæpenumero mortem adferunt ita repentinam, subitamque, ut sæpe symptomata, quæ solent apoplexiam comitari, nequeant prodire. Atqui nonnulli maximis animi perturbationibus perciti, quum dies

(h) VAN - SWIETEN aphor. 1329.

(i) De Morb. Mulier. Lib. I.

(k) VAN - SWIETEN loc. cit.

aliquot vivant, mentem ratione orbatam, aut satis confusam, os detortum, hemiplegiam, aliaque hujus generis proferunt symptomata: hinc mihi ad apoplexiam spectare posse videntur mortes subitanæ, quas invehunt animi perturbationes, licet per tempus nequeant solita apoplexiæ phænomena observari. Et sane si plures mentis commotiones, signanter vero terror, & horror epilepsiam haud raro gignunt potius quam syncopem; cur juxta varios earum gradus, variamque virium naturam, ac juxta patientis constitutionem efficere nequibunt apoplexiam, quæ gradus Epilepsiæ maximus censetur?

95. Præterea licet concederetur cordis motum spasmo, sive paralyfi intercipi in animi perturbationibus; non ideo tamen syncope esset necessario idiopathica, sed potius sympathica ex cerebri læsione. Videtur enim certum hujusmodi causas primario in cerebrum agere. Latet quidem, quænam sit hujusmodi actio, quæque perficiatur ratione: latet quoque, quænam sit physica cerebri conditio, quum magnis afficiatur animi perturbationibus; nec semper patet, quid in cerebro physice immutetur ingru-

ente nervea apoplexia , de qua loquimur in præfens : invisibilia enim cerebri machinamenta sæpe deordinantur ita , ut mortem vehant , quin ullum deordinationis vestigium in ejus substantia reliquum conspici possit . At nihilominus cerebrum primario affici probabilius videtur : in animi enim commotionibus aliqua perceptione opus est , quæ quidem ad cerebrum spectat . *Quapropter*, inquit HIPPOCRATES (1), *cor quidem , & præcordia maxime sentiunt ; sapientia tamen minime participant , sed omnium horum cerebrum causa est .*

96. Cerebrum est , quod ab animi affectionibus sive hac , sive illa vi , atque ratione affectum aliquando minus , imo & nihil penitus influit in cor ; hinc syncopes , & mors sæpe exoriuntur : e contra aliquando influit plusquam solito in cor ipsum , quod palpitat vehementer , vique majori sanguinem ad cerebrum impellit , quod , apoplexia exorta , morbidam etiam sui immutationem post mortem conspiciam prodit .

G

(1) Lib. De Morb. Sacr. art. 17.

97. Ex hisce vero inferri licet unam, eandemque causam ferre posse eundem morbum pluribus, & quidem diversis modis, sicuti & morbum diversum: forte quædam animi commotiones sæpius symptomata syncopis evidentiora; quædam aliæ apoplexiæ phænomena efficient. At certum videtur, generatim mortes subitas ex animi violentis perturbationibus ad apoplexiam præcipue, de qua hic agimus, revocari posse; syncope enim censenda est sympathica, non vero idiopathica. Hanc syncopem observamus aliquando sympathicam ingruente etiam vera apoplexia sanguinea, uti exposuimus (n. 19. 20.) licet in ea nullam aliam post mortem observemus morbosam imutationem, nisi in cerebro sanguinem aut congestum, aut e vasis effluxum.

98. Ex dictis huc usque facile colligitur, quid responderi possit illis, qui putarent syncopem esse morbum primarium, ex quo observatum sit ventriculos cordis haud raro, ac proxima vasa sanguine coagulato satis referta esse in cadaveribus eorum, qui ex animi affectionibus repente perierunt. Verum plusquam satis forte hac super re disseruimus: incæptam

igitur persequamur nerveæ apoplexiæ causarum enumerationem.

99. Adnotavimus jam (n. 76.) nihil vitii BOUCHERIUM detexisse in cadavere virginis, quæ ex apoplexia occubuit, postquam pluribus epilepsiæ accessibus vexata fuisset. At porro epileptici sæpenumero evadunt apoplectici, sive ut melius dicam, ad eum epilepsia pervenit gradum, quem apoplexiam dicimus. Hæc autem apoplexia inter nerveas recensenda est; inter quas etiam ea revocanda ut plurimum erit, quæ in coitu exoritur, quo cerebrum in convulsionem cieri potest. Novi quemdam juvenem Pharmacopolam in coitu semper, extra coitum numquam epilepsiæ correptum fuisse.

100. Nerveas inter apoplexias ea quoque adnumeranda est mors subitanea, in quam definit aliquando mania, ut bis observavit LORRYUS (m).

Odores quoque, de se licet innocui, tunc tamen apoplexiam, de qua agimus, efficiunt, quum magna odoriferarum partium accumuletur copia, diuque inspiretur (n).

(m) Loc. cit. Tom. I. pag. 69.

(n) VOGEL De Apoplexia aphor. 558.

101. Etiam in ebrietate nervi videntur primario affecti ; meritoque ebrietatem esse affectionem nerveam brevem asseruit LORRYUS (o). Aliquos agnosco homines , qui , dum merum , aliosque liquores potant , convulsi prius , quam ebrii fiunt . „ In Miscellaneis Naturæ Curiosorum , inquit BOERRHAVIUS , (p) „ legitur exemplum „ de milite quodam , qui se replebat tanta co- „ pia potus fermentati , ut distentus se vix pos- „ set movere , sed in scamnum se ponens paul- „ lo post ab eo delapsus expiravit . In cada- „ vere reperitur notabile nihil ; nihil in capi- „ te , nec in pectore . Hinc , subdit , effectus „ inde orti irradiationi cuidam spiritali adscri- „ bendi sunt , eodem modo , uti dixi , de va- „ pore per nares hausto “ .

102. Videntur a quadam pendere nervo- rum læsione mortes quoque repentinæ , quibus pestis magis , magisque sævit , ac terret . Aut enim exoriuntur a myasmate pestilentiali , quod , quum subtilissimum , ac summe efficax circu- lando ubique penetret , actionem destruit ner- vorum ; aut a vera gignuntur asphyxia , quam

(o) Loc. cit. Part. I. pag. 123.

(p) Loc. cit. Tom. I. pag. 83.

invehit aer venenatus regionis infectæ, quamque promovent maxime dejectio animi, & Incolarum terror. Sed quidquid ex his supponas, certum est apoplexiam hujusmodi a nervis lethaliter affectis pendere.

103. Nerveam esse apoplexiam, quæ ex venenis gignitur, nemo est, qui dubitet. Certo enim constat nervos præcipue lædi a venenis. Horum autem aliqua in cerebrum sæviunt immediate: alia vero, quum immediate agant in alias corporis partes, in cerebro tamen terribiliores eorum actionis perferuntur effectus. Id satis probant, quæ venenorum actionem subsequuntur symptomata (9). Quod autem secta veneno peremptorum cadavera nullam proferant aliquando mutationem morbo-

(9) Plura venena repente occidunt. Id præstat morsus serpentis, quem a *Sonaglio* vocant (TISSOT Tratt. de' Nerv. Tom. I. Par. II. Cap. VIII.) Aspidis morsus hominem statim obstringit sopore lethali, referentibus PLUTARCHO, atque LUCANO. Historia romana meminit tum veneni, quo statim periit VIBULENUS AGRIPPA, tum illius, quod quidem a Locusta paratum NERONIS jussu exhibitum fuit BRITTANICO, ex quo repente interiit. At Tyrannorum factus, improborumque hominum plurima hujusmodi ostentant exempla.

san, ex qua oriri mors posset; id probat præcipue apoplexias hujusmodi nerveas fuisse (n. 75.).

104. Ast aliud adest venenorum genus, quod aut veram infert repentinam mortem, aut mortis speciem, quam tamen verus consequitur interitus, nisi illi apta objiciantur remedia. Hæc vero terribilia efficit aer, qui tumulos mortuorum, puteos profundos, & antra quædam dominatur. Vis eadem mortifera inest quoque vaporibus, quos quidem liquores fermentescentes, ignitique exhalant carbones. Quot autem homines interiire, qui venenatis hujusmodi se obtulerunt vaporibus? Historia unicuique memorat JOVIANUM (q) Imperatorem, quem quidem cubantem invenerunt orbatum vita ab accensis carbonibus, qui ad humiditatem repellendam suo servabantur cubiculo. Sic regno eripiebatur anno ætatis suæ trigesimo tertio sapiens ille Cæsar, qui a septem tantum mensibus regnabat. Celebris est quoque historia Studiosorum Jenensium, qui, quum thesauros venarentur, a fumo accensarum prunarum interierunt (r). Ex me-

(q) EUTROPIUS Lib. X. pag. 274.

(r) HALLER Elem. Physiol. Lib. VIII. pag. 140. in Adnotat.

phitico autem aere tumulis coacervato mortem sæpe subeunt repentinam, qui sive pietatis, sive sui muneris causa sepulchra ingrediuntur. Postremis hisce temporibus Cremone duo Vespillones sepulchrum quoddam publicum adeuntes repente obiere, ut refert (s) de hoc argumento optime meritus Ab. ISIDORUS BIANCHI.

105. Præstat animadvertere præter carbones, & fermentescentes liquores, alias quoque substantias gaz hujusmodi mephiticum, mortiferumque diffundere. Quodlibet corpus, dum comburitur, eundem præstare potest effectum; & quilibet aer nisi renovetur, virulentus evadit, si in illo ad quoddam tempus quædam determinata combustibilis substantiæ quantitas aduratur. Corporis, quod comburitur, status metitur, ut ita dicam, aeris venenum: nam quanto magis vitatur aer, tanto magis ignis comburens tenuatur, qui quidem deficit omnino, quum aeris vitium ad summum pervenerit gradum.

(s) Lettera sulla morte apparente de' Soffocati, e de' Sommersi. Milano 1783.

106. Tristis experientia docet aerem quoque, quem expiramus, vitam aliquando adimere posse; non secus atque aer, quem liquor fermento actus, aut carbo ignitus exhalat. Sensibilitas, atque irritabilitas læditur valde, destruiturque aliquando hominibus iis, qui coacti sunt aerem inspirare diu eundem, quin renovetur. Horreret penitus, si legeres exactam malorum descriptionem, quæ in carcere quodam Regni Bengalensis mense junio an. 1756. gignebat aer non renovatus, vitiatusque plurimorum hominum exhalationibus: eorundem malorum exitum unice attingam. Pro-regis jussu sub vespas centum quadraginta quinque viri cum una muliere in eum carcerem una conjiciebantur, quem Angli dicunt *nigrum foramen*: ejus area pedibus quadratis constabat decem & octo: cuilibet hinc detento spatium erat pollicum quadratorum decem & octo. Carcer amplo muro circumscriptus duabus tantum modicis findebatur fenestellis, quæ ferreis munebantur cancellis. Reclusis mane sequenti januis vix tres supra viginti ex centum quadraginta sex prodire semivivi. Funestum quoque hujusmodi phænomenon observabatur in Ur-

be Oxonii ann. 1559. In ejus enim Aula publica Judices, postquam in reos quosdam sententiam dixerant, Assessoresque pene omnes de repente obiere: hinc Cives eum vocarunt *atri judicii* diem.

107. Et sane miserandum videtur, hacce cognita aeris aut nihil, aut parum renovati vi deleteria, homines nihil animum advertere ad qualitates aeris, ex quo pluribus diei, noctisque horis spiritum ducunt. Medici tristes quidem observant quotidie morbos, quibus obnoxii sunt illi, qui aeris qualitates despiciunt. Id autem mihi dolendum summopere, quod despiciant utique, qui inter viros sunt sensibiliores. Spiritum enim iis in locis pervicaciter ducere volunt, in quibus aer pene mephiticus dominatur. Neque eos terrent acutissimi capitis dolores, terribiles asthmatis aggressiones, rheumata periculo plena: adeo mortales refugiunt animo ab ea vitæ ratione, quæ minus mentem, sensusque suaviter percellat. Sed finis fiat episodio; quod tamen non valde est abs re nostra.

108. Itaque tum aer pulmonum exhalationibus nimis refertus, tum vapores fermentantium liquorum, ignitorumque carbonum, non

secus atque venenum quodlibet apoplexiam potest efficere, quæ quidem dicenda erit nervosa: sensibilitas enim hominum, atque irritabilitas ita læduntur, ut & deficient omnino. Mirabilius tamen phænomenon, quod ex mephiticis vaporibus extincti proferunt, est auctum sanguinis volumen, ejusque fluiditas. At quæ horum causa? Id ne præstat vapor idem mephiticus, vel aer externus sanguinem penetrans? an forte *fluidum elasticum* ejusdem sanguinis, quod explicetur, ac turgeat? Recentiores aliqui vaporem causantur mephiticum; plerisque vero videtur difficillimum statuere, quænam ex recensitis vera sit phænomeni causa. Ast observatione sæpius repetita compertum est, infelices hujusmodi, qui vita functi videntur, & per diem integrum, ad vitam tamen redire. Hinc hominem decet auxilia illis suppeditare, quæ dicemus Cap. XXII.

109. Me quidem haud latet, aliquod dubium oriri posse, utrum vaporibus affecti mephiticis emoriantur ex syncope, an ex apoplexia. Apoplecticam mortem vocabunt, opinor, ii, qui ex vaporibus mephiticis putant respirationem primario impediri, sanguinisque reditum

a cerebro ; cujus hinc vasa , ventriculosque turgentes sanguine aliquando observantur (t) . Neque id illi negabunt , quibus persuasum est vapores mephiticos in cerebrum primario vim suam deleteriam exerere . Hi tamen facilius nervosam , illi vero sanguineam fortè affirmabunt apoplexiam .

110. At contra morbum , sive mortem conjectabunt ex syncope potius cardiaca , qui eos vapores agere affirmant immediate in cor , aliosque musculos , quin cerebrum urgeant . Hoc autem sibi suasere forte Physici quidam celebres , postquam phænomenon inspexissent in corde ranarum . Corda enim ranarum suo se-jungebant corpore , earumque unum aeri mephitico , alterum naturali exponebant aeri ; hoc serius , illud quamcito suam amisisse irritabilitatem comperiebant .

111. Sed horum Physicorum observationibus plura opponi possunt . Et primo quidem saltem analogia probatur , vapores mephiticos vim suam exerere in cerebrum ; ex eo vero in corpus reliquum . Opium enim agit

(t) PORTAL. *Histoir. de L' Acad. des Sc.* an. 1775.

non secus atque vapores mephitici, uti Clariss. observavit PORTALIUS (u). Sed opium, ut constat observationibus, quas primum instituit WYTHIUS, subinde iteravit PORTALIUS, opprimat primo cerebrum, ex eoque corpus reliquum. WYTHIUS enim binas ranas sumebat, quarum uni obtruncabat caput: utrique vero pellem detrahebat, qua Venter obtegatur: in ventrem inde utriusque quandam tincturæ Opii quantitatem fundebat. Observabat autem cor ranæ sine capite diu servasse, alterius vero cor amisisse suam quamcito irritabilitatem. Videtur ergo dicendum, quod & vapores mephitici, mediante cerebro, corpus reliquum afficiant. Hinc patet quam ratione nervi sive compressi in sui origine, sive quomodocumque inertes effecti, neque in alias corporis partes agere queant, neque in cor ipsum.

Secundo videtur sane majorem saltem phænomenorum partem, quæ in homine efficiunt vapores mephitici, potius ad caput immediate spectare, quam ad cor, & forte etiam ad re-

(u) Observations sur les Effets de Plusieurs Poisons Dans le Corps de l'Homme Chapitr. V. pag. 352.

spirationem. Id autem propriis experti observationibus affirmant plures, celebresque Medici; quos inter enumerandus venit BOERRHAVIUS, qui (x) inclinationem in somnum memorat, dolorem capitis, ejusque tensionem ad dies aliquot perdurantem; sed ne verbum quidem facit de læsa respiratione. HOFFMANNUS quoque nullam respirationis difficultatem, sed innuit tantum ex hisce vaporibus stuporem inductum, soporemque. Illustr. SWIETENIUS asserit homines a vaporibus carbonum læsos nunquam de anxietate conquestos fuisse; semper vero de acutissimo capitis dolore, & de quadam ejus, ut ajunt, plenitudine (y). Id probat observatione WEPFERI, ex qua colligitur hominem quemdam ab alto sopore ex hisce vaporibus orto revocatum asseruisse, se haud anxio spiritu, sed somno suavi occupatum fuisse. Revera neque HELMONTIUS anxietatis meminit dum proprium a vaporibus carbonum apoplexiæ periculum describit, incipientemque hemiplegiam. Clarissimus BANAUS (z) ad vitam revo-

(x) Loc. cit. pag. 104.

(y) Comment. §. 1010.

(z) Apud PORTALIUM Loc. cit. pag. 57.

cavit Presbyterum quemdam vaporibus mephitis oppressum ; idque methodo refrigerante PORTALII. Redivivus Sacerdos adstantibus affirmabat ; se ignorare utrum nec ne mente quidem excogitasset auxilium petere ; nullum enim aiebat effectum pensensisse ejus vaporis metuendi , quum ab ipso afficiebatur . Fatebatur autem odorem aceti , quo sibi provisum fuit , sibi visum fuisse *quid divinum* : tunc vero , nisi a quadam mentis confusione non angi . Marchio autem de TURGOT (a) Academia Parisiensis historiam retulit Virginis cujusdam Normannæ , quam cum oppressisset vapor carbonum , methodo PORTALII sanaverunt . Ad vitam rursus excitata asseribat , hoc unum memoria retinere , quod ante asphyxiam parte capitis anteriore angebatur quam maxime : subinde vero per biduum dolore totius capitis torquebatur . Quid plura ? PORTALIUS meritissimus (b) asserit pluries audivisse paullo ante mortem canentes eas aves , quas Ille vaporibus mephitis exponebat : ex vero nutantes conspicie-

(a) Apud PORTAL. loc. cit. pag. 60.

(b) Loc. cit. pag. 16.

bantur, ac velut ebriae vacillantes; adeo verum est a vaporibus hisce potius caput, quam pulmones laedi, saltem saepe. Hic addi quoque potest PORTALIUM (c) observasse vesicam eorum, qui ex mephiticis vaporibus defecere, urina plenam, atque distentam, uti non raro in apoplecticis conspicitur.

112. Celebres hinc plures Medici jure ergo, ac merito affirmant ex apoplexia potius, quam ex syncope perire vaporibus mephiticis affectos. Celeberrimus CULLENIIUS (d) opinatur mobilitatem extinguere humoris nervei, asseritque sibi videri hasce substantias neque in organa respirationis agere, neque in sanguinem; alibi vero (e) sibi persuasum ait esse, quod hujus speciei asphyxiae ad genus spectent apoplexiae. Postremis hisce temporibus Celeb. WALTHERUS (f) contendit mephiticis vaporibus laesos mori apoplecticos. Hisce autem plerique alii addi possent.

113. Ex huc usque expositis fatis constat,

(c) Loc. cit. pag. 67.

(d) Loc. cit. Tom. III. Cap. I.

(e) Synopsis Nosolog. Methodic. pag. 135. Edit. Ticin. 1787.

(f) Nouveaux Momoires de l'Acad. des Scienc. Berlin an. 1784.

ut spero, has asphyxias, five mortes ad genus apoplexiæ pertinere, aut saltem eo nomine vocari posse. Si vero cadaveribus eorum observatis, qui ex hac causa periere, suspicio syn-
copis suboriretur, hic ea quoque adderem, quæ (n. 19. 20. 95.) adferebam.

CAP. IX.

*De ea Apoplexia, quæ ex acrimonia
oritur aliquando.*

114. **S**i causæ nervorum principium occupent, irritent, vel alio quocumque modo ejus structuram lædant, exoriri potest apoplexia, quam (n. 78.) diximus *idiopathicam*. Hanc propterea gignere potest acrimonia, quam faciunt præcipue curæ tristes diutinæ, aut quædam sanguinis vitia. Curæ enim tristes nervos generatim lædunt, ac lente debilitant, appetitum, somnumque subripiunt, vires adimunt stomacho, vitiantque digestionem: densatur bilis, cogiturque hepate; hinc omnes deordinantur humores, atque vitiantur. LANCISIUS (g) obser-

(g) De Subit. Mort. Lib. I. Cap. VIII. art. 14.

vavit Cardinalem quemdam ex hac causa apoplecticum evasisse lethaliter. De hac apoplexia loqui videtur HIPPOCRATES (h), quum dicit : *cerebrum autem cladem perfert, ipsum etiam sanum non existens; sed siquidem erodatur, turbationem multam sustinet, & mens decipit, & cerebrum convellit, ac distrahit totum hominem, qui in se ipso vocem non edit, ac suffocatur; & hæc affectio syderatio, ac græcæ apoplexia vocatur.*

115. MORGAGNUS (i) plures profert apoplecticos, quorum morbum non ex compressione conjicit fuisse, sed ex convulsione, & ex quadam coarctatione meatuum cerebri ab acri inducta materie. SCARDONA (k) vero contendit hanc esse apoplexiam, quam Veteres *calidam* vocarunt. *Quam calidam*, ait, *Veteres appellarunt, Moderni ab acri irritante materia nerveas cerebri, ac Meningum fibrillas pungente, vellicante, convellente repetunt.* Hæc porro eos adoritur, quorum fluida sulphureis, subtilioribusque particulis onusta sunt, solida vero nimium

H

(h) Lib. De glandulis n. 9.

(i) Epist. Anat. Med. IV.

(k) Loc. cit. Lib. I. Cap. I. Aphor. 24.

tensa , atque ad oscillandum parata . Quæ quum ita sint , spiritus volatiles , oleosos , salia volatilia , elixiria , frictiones dolorificas , sternutatoria , purgantia , emetica , atque alia hujusmodi insensissima esse nemo est , qui non videat . Ad hanc propterea apoplexiæ speciem compescendam citatus Auctor remedia tantum laudat , quibus corpus refrigeretur , humectetur , atque mitescat .

116. Huc quoque revocari debent apoplexia , hemiplegia , & dolorificæ convulsiones , ac rigiditates , quas ex scorbuto observavit inter cæteros SENNERTUS (l), quasque ipse credit exoriri ab acri , calidoque vapore nervos occupante . Iidem fuerunt apoplectici a Clariss. SAUVAGESIO (m) observati , quorum calida , & sicca erat temperies , alvusque constipata , dum sani erant .

Novi , & ut Medicus adivi Virum quemdam stirpe , ingenio , virtute nobilissimum , ex cujus facie certis anni temporibus erumpit admodum mediocris herpeticæ materiei quanti-

(l) Lib. III. Part. V. Sect. II. Cap. IV. De Scorbuto .

(m) Nosolog. Method. Class. VI. Ord. V.

tas. Accidit aliquando, ut Ipse sese exponeret aeri, qui de improvifo rigefcebat: ex ejus aëtione materies herpetica extemplo retrocedebat aliquantulum: tunc & admirans, & dolens Virum egregium subito aspiciebam velut animo multa volutantem, inter agendum ancipitem, dubiumque, ac summa melancholia deordinatum, oppreffumque. Qui vero animadvertat quam subito Ille lædatur, haud quidem dubitare poterit, quin nervi id agant, quum a vix retroceffa, licet pauca irritentur materie. En qua fieri ratione poffit, ut acris quædam materies nervos magis percellens prorfus gignat apoplexiam.

117. Hæc eft quoque apoplexia, quam gignit materies rheumatica, & morbillofa, five fcabies retropulfa, five, ut quidam afferuere, perfpiratio, quæ retrocefferit. Hæc quidem apoplexiæ fpecies dici poteft *metaftatica*: hujusmodi tamen metaftafes, utpote minimæ, ut plurimum, ac nimis subtiles, potius irritando fæviunt, quam comprimendo.

CAP. X.

De Apoplexia, quæ oritur ex dolore quasunque corporis partes occupante.

118. **D**olor, præcipue si immanis, quacunque corporis parte excitatus apoplexiæ speciem gignit aliquando, quæ nervorum læsæ actioni, præcipue vero communi sensorio vi doloris deordinato, quomodocunque id fiat, haud dubie est attribuenda. Sive enim MOR-GAGNO (n), atque BURSERIO (o) adhærens putes, contracta spastice, quam occupat, parte, nimium sanguinis ad cerebrum cogere; sive aliorum probans opinionem dicas dolorem propagare spasmus ad cerebrum usque, aut a doloris vi nervorum destrui energiam, quod probabilius videtur; hoc unum asseris, quod ex dolore exurgere possit apoplexia. Hanc vero vel sympathicam, vel idiopathicam dicunt prout sunt partes a dolore lacesitæ.

(n) Epist. An. Med. III. n. 5.

(o) Loc. cit. Tom. III. Cap. IV. §. 32.

119. Revera quantum valeat dolor & ad frangendam, & ad delendam nervorum actionem satis probatur exemplo tauri furentis, qui fractis omnino viribus procumbit statim, ac canes ei testes convellant. Hoc quoque adnotavit celeberr. CALDANIUS (p) scribens neminem fugere doloribus vel ingruentibus; vel sævientibus robur plus minus infirmari, ac pene destrui: tantam vero doloris aliquando esse potentiam corporis nostri vires, motusque destruendi fatetur HOFFMANNUS (q), ut effectus doloris venenorum assimilet effectibus. Animadvertit quoque HALLERUS (r) ex dorsi dolore in caput saliente hominem ad instar mortui solo prosternei: ex multis autem observationibus, quas Ipse collegit, evincitur satis, graviolem in nervis irritationem cerebrum primum in consensum ciere (s). En itaque qua ratione hinc nervea exoriri possit apoplexia.

120. Hujusmodi morbum adnotavit quidem & LANCISIUS (t), asseruitque eundem a

(p) Instit. Physiol. n. 218.

(q) Tom. II. Cap. XI.

(r) Element. Physiol. Tom. IV. Lib. X. Sect. VII. pag. 225.

(s) Loc. cit.

(t) De Morb. Subit. Lib. I. Cap. IX. art. 19.

spasmo produci. Hujus est speciei apoplexia ex summo dolore exorta, qui in membrorum amputatione torquet ægrum, præsertim si debilis sit, ac summopere sentiens. Non ita pridem vidi ego ipse maxime dolens mortem repentinam amici mei, licet sanissimi, atque fortissimi, quum in eo immanis dolor ex fracto crure atrociter sæviret. Legitur in SEPULCHRETO (u) nihil morbosum inventum fuisse, nisi uterum convolutum, & in vesica fellea calculum formæ ovális, *dactylum* integrum referentem, in cadavere mulieris cujusdam, quæ summis doloribus lacescita obiit repente.

Prudentissimus idem MORGAGNUS non ausus asserere biliares calculos, quos non comitetur dolor, efficere posse apoplexiam; hujus morbi causam esse posse pro certo habet calculos eosdem, si modo doloriferi sint (x) & nuper Clariss. BURSERIUS putat dolorem acutissimum ubicunque excitatum gignere posse apoplexiam (y). Afferit MOLLIUS *Passionem iliacam*, quæ vel maxime sæviam, spalticam apo-

(u) Tom. I. Lib. II. Sect. XI. Obs. L.

(x) Loc. cit.

(y) Loc. cit.

plexiam afferre aliquando . Et revera nuperri-
me affirmari video , nihil , quod sub sensus ca-
dat , observari posse in sectis eorum cadaveri-
bus , *qui a vi dolorum , ad torturam positi , su-
bito extinguuntur* (z) .

CAP. XI.

De Apoplexia , quæ oritur ex inanitione .

121. **E**xhaustis e corpore humoribus ita ,
ut qui reliqui sunt a corde acti nequeant cere-
bri arterias necessaria æquabilitate adimplere ,
oritur illa , de qua hic agitur , apoplexia : col-
labuntur enim organa sensus , motusque . Sive
spiritus animales , scripsit celeberr. TISSOTIUS (a)
secerni impediuntur , & distribui , sive ex-
haustis viribus deficient , oritur apoplexia , qui
morbus est ille , in quo nervorum cessat sensus ,
& ex sensus defectu , voluntaria actio . Hujus-
modi vero apoplexia fieri non videtur quidem
a cerebri , ut ajunt , compressione .

(z) FRANK Loc. cit. Vol. V. pag. 57. in Adnot.

(a) Epist. var. argum. pag. 87.

122. Morbi invasionem præcedunt anxietas quædam præcordialis, difficultas ad motum, pallor faciei, oculorum languor, visus obumbratio, leves vertigines, aurium tinnitus, debilitas magna, membrorum tremor, ac sensuum internorum imminutio.

123. Huic apoplexiæ obnoxii sunt illi, qui sanguinis immodicam quantitatem amittunt, præcipue si id fiat repente: dixit ideo HIPPOCRATES hanc vulneratis accidere. Neque alia præsumenda est causa mortis repentinæ mulierum, quæ aut ex abortu, aut ex partu magnam sanguinis copiam deperdunt. Sæpe enim tanta fit hæmorrhagia, ut ægræ incipiant deficere, in somnum, & stertorem delabantur, omnes sensus perdant, & brevissime moriantur. Hanc lethalem apoplexiam observavit Clariss. STORCHIUS (b) cum paralyfi lateris dextri in muliere, quæ ex nimia quidem uteri hæmorrhagia post horas tres periit convulsa.

SAXTORPHIUS (c) describit mulierem quamdam ab octo mensibus prægnantem, quæ tunc temporis haud raro uteri hæmorrhagiæ obnoxia

(b) Ann. Med. I. Tom. I. pag. 119.

(c) Act. Societ. Medic. Hauniens. Vol. I. Edit. 1777.

erat notabili. Hoc quum incommodum conjectaret Medicus exoriri, ex quo placenta jam sejungeretur ab utero, ipsum fœtum pronuntiavit extrahendum. Hisce peractis mulieri quidem sedabatur hæmorrhagia; sed ipsa convulsa periit repente. Hujus subitæ mortis causam repetit SAXTORPHIUS, ex quo utero citius evacuato, vasa cerebri, cordisque de improvviso deonerabantur in vasa abdominis: hinc partes corporis mobiliiores, cerebrum præcipue, stimulo naturali destituebantur, ac naturali distensione.

124. Consideranda utique est in puerperis hæc humorum copia, quæ quin exeat de corpore, irruit in viscera imi ventris, quæ a fœtu comprimebantur: hujusmodi compressione sublata, irruentibusque illuc humoribus cerebrum iisdem destituatur oportet. Eadem causa videtur mortis repentinæ quæ Paracentesim consequitur in Asciticis; præcipue si magna aquarum quantitas simul, & semel extrahatur.

125. Hinc mihi delitescit ratio, qua SYDENHAMIUS hystericam vocat puerperarum apoplexiam, quæ *easdem haud infrequens adoritur confestim a partu, magna sanguinis vi simul eje-*

Æta (d). Hæc enim apoplexia nequaquam ab hysteria, sed a tanta sanguinis jactura exoritur, ut non fatis possit cortex cerebri impleri. Hanc ipsam observavit BOERRHAVIUS (e) post narium hæmorrhagiam: dum enim parabantur illa, quæ sanguinem sisterent, & corpus replerent, æger in talem incidit apoplexiam.

126. Insuper ad hujus speciei apoplexias ea quoque pertinet, quæ nimias alvi consequitur evacuationes; si præsertim hæc a causa irritante promoveantur. Ex violenta purgantium remedium actione, signanter hellebori, observarunt sæpe Medici subsequutos spasmos, mortemque festinam: idem observarunt in cholera morbo. Ex hacce causa lethalem vidit apoplexiam STORCHIUS (f) in viro, postquam diarrhæa adeo violenta laboraverat, *ut spatium quinque horarum viginti quatuor pintæ feri biliosi absque ullo dolore ano effluxerint.*

127.. Præterea certum est, inediam quoque apoplexiam sæpe facere, senioribus præcipue. Siquis conatur aliquid agere, conatibus

(d) Dissert. Epist. pag. 89.

(e) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 261.

(f) Loc. cit.

que vires, corporis nimio jejunio attritæ nequeant obfistere; miserum adoriuntur vertigines, oculorum obnubilationes, mentisque perturbationes, qui quidem tristissimi effectus in veram desinerent apoplexiam, nisi conatus illi intermitterentur. Observatum est etiam (g) canes magna fame extenuatos apoplexia sæpe obisse.

128. LANCISIUS (h) autem cum aliis & ex nimia venere autumat apoplexiam haud raro, maxime in senes, infectam fuisse. Hisce inanitionis, languorisque causis libenter addo cum Clariss. VOGELIO (i) immoderata quidem studia, vigilias nimis productas, meditationes intensas, ac demum diutinam tristitiam. Ab his enim causis nervorum vel maxime delassantur vires.

129. Hæc, de qua hic loquimur, apoplexia marasmo senili finem tandem imponit. *Est apoplexiæ species* ait Illustr. HAENIUS (k) *solo spirituum defectu oriunda, quæ jam pluries*

(g) SCARDONA loc. cit. Lib. I. Cap. I. aphor. 7.

(h) De Subit. Mort. Lib. I. Cap. VIII. art. 14.

(i) Loc. cit. Part. II. §. 559.

(k) Rat. Med. Part. IV. Cap. V.

intentaverat mortis minas vetulæ cuidam annum ætatis centesimum alterum agenti, quæ tandem apoplectica decessit. Ab hac repente corripuntur quoque, affirmante TISSOTIO (l), qui diutinis morbis, præsertim sanguinem dissolventibus conflictati fuere; quique tandem nimis diligunt remedia, quorum nimia assiduitate vires dejiciuntur omnino.

130. Hanc apoplexiam a solo defectu spirituum probat summus BOERRHAVIUS (m) exemplum proferens militum, qui viribus exhausti, & labore fracti dormiunt juxta ipsa bellica tormenta, unde bombardæ ejiciuntur, ad quarum sonitum vix possunt excitari. Imo & ita dormientes sæpe expoliantur, moventur, deferunturque de loco in locum, quin evigilent. Vocat hunc statum *apoplexiam naturalem*, quæ sanatur dum per somnum regenerantur amissa.

(l) Loc. cit.

(m) Loc. cit. Tom. II. pag. 253.

CAP. XII.

*De Apoplexia Nervea Sympathica,
sive Consensuali.*

131. **S**icuti immodica nervorum sentienti vis, atque mobilitas facile efficiunt apoplexiam nerveam *idiopathicam*, sic faciliorem quoque reddunt *sympathicam*, sive *consensualem*. Hinc hujusmodi apoplexiæ, ut vidimus (n. 53.), hypochondriaci, fœminæque hystericæ præ aliis obnoxii sunt. Isti enim sæpe numero solent viscerum abdominalium, artuumque inferiorum spasms torqueri; quapropter HOFFMANNUS, aliique opinantur earum partium vasa spasmo constringi, sicque sanguinis motum in iis partibus præpediri, aliorum averti, cerebrumque versus majori impetu determinari: hinc fit aliquando, ut vasa cerebri oppleantur, distrahantur, imo quandoque disrumpantur.

132. Et revera non ne sæpe observamus inter spasmos hypochondriacos, atque hystericos, carotides validius solito pulsare, dum pulsatur de more ad carpum arteria? Non ne crebro persentitur quoque enormis illa pulsatio,

qua hypochondriacorum, atque hystericarum abdomen immaniter exagitatur, quaque tangentis manus mirum in modum percellitur? Ex quo autem totus succutiatur abdomen, atque ex variis, profundisque punctis exoriaturs pulsatio; arguimus haud semper Cæliacæ ramum pulsare, sed Aortam ipsam. Rami, in quos ista dividitur, spasmo coarctantur: hinc in truncos quasi refluit sanguis; sicque per carotides cor majorem illius quantitatem ad cerebrum propellit. Hac ideo ratione ex spasmis abdominalibus gigni potest apoplexia; quæ & facilius enascitur, si nervi etiam pectoris spasmo afficiantur.

133. Hæc porro apoplexia frequentius, quam ferat communis opinio, adoritur illos præcipue, qui sive magnis negotiis, sive severioribus studiis incumbunt. Hujus enim classis viri vix, aut ne vix quidem corpus exercent, dum intercalaribus horis inordinatam non raro agunt vitam. Hinc sæpe nervea corripiuntur melancholia, obnoxiique, ut plurimum, sunt spasmodicis abdominis affectionibus.

134. Ast ex harum affectionum continuatione enascitur haud raro eadem atra bilis:

imminuitur enim sæpe diameter tum vasorum hepatis, quæ bilem secernunt, tum aliorum viscerum in abdomine; imo vasa eadem satis arefcunt, obstruunturque. Hinc motus bilis lentescit nimis; quæ propterea aliunde nimis densa cunctatur in iis visceribus, eoque inficitur colore, & acrimonia, quæ bilem *atram* constituunt. *Atram* hic loci voco eam degenerem bilem, quæ quum colorem sumpserit nigricantem, aqua diluta virescit; nigra rursus evadens, si aqua evanescat. Hæc autem Principis forte nimis horrenda, & forte a Recentioribus non satis æstimata suas aliquando metuendas vires exerit in præcordia, quin ventrem infimum linquat: sicque aliquando apoplexiam facit *consensualem*.

135. Quoniam autem de spasmodicis abdominalibus hypochondriacorum hic sermo habetur, notandum credo, nerveam quoque melancholicam posse in cerebrum inducere metastasim, ut ajuat, nervosam; quin ullum post mortem læsionis vestigium queat observari. Enim vero quam ratione negari queunt metastases illæ nervosæ, quæ ab actione potius, quam a materie alio translata sæpenumero pendent?

Præterquamquod extiterunt, & extant adhuc doctissimi Viri, qui quidem affectiones nervorum opinantur ortas, atque ad tempus vigentes ex quadam versatili, subtilissimaque materie, a tenuissimo quodam *gaz*, cujus magna quantitas principio nervorum coacervata, licet mortem inducat, adhuc tamen observatori & diligentissimo nullum sui post mortem indicium præberet (10).

136. Hac de causa ortam putavit LANCIUS (n) apoplexiam, qua obiit Rever. SPADA. Erat hic staturæ proceræ, habitus ad graci-

(10) BURSERIUS Clariss. loc. cit. §. 108. innuit apoplexiam hujusmodi vocandam esse metastaticam, hujusque metastasis in cerebro indicia porro non deficere debere. Ast Ille dat materiem illam, quæ *ab imis ventris latibulis, aut ab utero* exoritur, sanguinem densare, ut in cerebri vasis consistere, atque hæreere debeat: haud omnes tamen hoc concederent. Magnus quidem BOERRHAVIUS de hypochondriacis scribens cum materie sic loquitur. „Raro in-
 „veniuntur hypochondriaci cum materia, in quibus non si-
 „mul lædantur functiones cerebri, & nervorum; hinc illi
 „plerumque patiuntur vertigines, cephalæas, donec tandem
 „moriantur apoplectici illæso tamen cerebro“. De Morb. Nerv. Tom. I. pag. 59.

(n) Repent. Mor. Obs. IV.

lem tendentis, convulsivo asthma obnoxius, & tensionibus etiam circa hypochondria. Post frigus, inediam, deliquium, immanesque dolores circa dextræ mandibulæ articulationem, proxime tandem post irregularem totius corporis motum apoplexia corripitur, cui dextri brachii sideratio, oris tortura, auctaque linguæ naturalis hæsitatio illico successerunt: subrubra erat facies, & tensa hypochondria.

Missio sanguine ex pede, & oleo amygdalino exhibito, omnia feliciter progredi videbantur. At postridie tumida, ac subrubra recurrit facies, turbatur mens, convelluntur artus: utebantur Medici anti-epileptici, vesicatoriis, pediluviis, ac diluentibus, laxantibusque remediis. Utilitate tamen parva nimis. Tandem in femore, & crure dextri lateris efficiebatur, tanquam opportunus decubitus, paralytis. Tunc omnia satis quieta: suppeditabant ægro aquam Nucerianam; emulsiones; neque omissa fuere balnea aquæ dulcis. Moriebatur autem post aliquot hebdomadas præcedente præcordiorum, atque laryngis sensibili strangulatione. Credit LANCISIUS materiem subtilissimam, & acrem in hoc ægro ex hypochondriis ad cerebrum,

& ex hoc per nervos ad universum corpus erroneo motu fuisse transductam.

Plura profecto nervos hujus Prælati ostendebant male affectos fuisse; uti habitus gracilis, asthma convulsivum, tensiones circa hypochondria, aggressio apoplexiæ post frigus, inediam, immanesque dolores; facies subrubra; dextri brachii addatur, si placet, sideratio; præcordiorum tandem, atque laryngis contractio.

137. At aliquando materies illa, quæ morbos nervorum generat, alitque, haud ita tenuis observatur: id patet præcipue, quum ex morbo nervoso tumescunt artus. In his enim spasmus pertinaciorum deprehendimus, quia ejus causa & minus versatilis, & minus tenuis est. Id etiam patet, quum affectiones nerveæ in quosdam alios desinunt morbos. Aliquando enim observamus hypochondriacam passionem defecisse omnino, Phthysi superveniente (o). Ego quoque paucis abhinc mensibus affectionem nerveam contumaciorem observavi penitus evanuisse, suborta tussi, quam consequiebantur dolor

(o) LORRYUS loc. cit. Tom. I. pag. 63.: MORTONUS Phthysiol. pag. 92.

oppressivus pectoris, sputumque puriforme; hæc autem observabam in Equite ornatissimo, cui optimus erat corporis habitus. Hypochondriasm quoque retundi vidit Clariss. FRANKIUS (p) erumpentibus lividis, latis, copiosissimis maculis. Itaque si in cerebro istæ metastases factæ fuissent, quæ forte apoplexiam induxissent; & in cerebro procul dubio signa reliquissent morbi conspicua.

138. Cæterum non sola hypochondriasis, sed plures aliæ nervorum infirmitates desinunt in apoplexiam, aliove morbos ob mutationem situs materie nervos jam prius occupantis. Video, dum hæc scribo, omnium artuum tremorem, quo jam usque ab adolescentia Nobilissimus quidam Vir vexabatur, evanescere omnino suborta protinus antiaurosi, atque dementia. At magis ad rem opinor levis apoplexiæ exemplum describere ab hac ipsa causa exortæ.

Auriga quidam ætatis annorum triginta septem mense Septembris 1787. hemicrania periodica sinistrorsum laborabat: alvo purgata, ac sanguine emisso facile convaluit. Post men-

(p) Delect. Opusc. Vol. I. pag. 10. in Adnotar.

ses aliquot eum rursus adoritur, sed dextrorsum hemicrania, vi tamen mitior, ac duratione. Expergefactus mane dolore vexabatur leviter usque ad meridiem; subinde dolor evanescebat omnino. Post duas, tresve hebdomadas sine remediis optime convaleuit: sic mihi retulit ipse.

Per dies circiter quindecim optime se habebat; quum mane repente expergefactum non dolor, sed læsit imperfecta dextri lateris paralysis cum aliqua mentis confusione. A capite aberat omnis dolor: videbantur illi aquæ guttæ permeare latus totum paralyticum: putabat faciem madere lacrymis, quas manu sana nitens abstergere, nullas esse deprehendebat: brachium dextrum videbatur illi rigere gelu, crus contra ardere. Venæ sectione, tepidisque aquæ dulcis balneis convaleuit. Nonne verisimile est eandem materiam, quæ nervis infixam prius hemicraniam, effecisse postea hemiplegiam de prima sede demigrando?

139. At plures extant observationes, ex quibus colligitur unam situs mutationem ejus materiei, quæ nervos occupabat, apoplexiam invexisse. Sexagenaria quædam mulier veteri

surditate laborabat : audiebat autem quum ab apoplexia correpta fuisset , dextroque latere paralytica , ac muta evasisset . Imposterum contra , quum & paralyfis deficeret , & lingua expediretur , illi rursus impediabatur auditus . Triennio post apoplectica denuo eadem prodebat phænomena (q) .

140. Præterea morbos inter , quos menstruatio parit , si difficilis , ac dolorifera , enumerari potest hæc , de qua agimus , apoplexia . Hac de causa apoplecticam quamdam refert LORRYUS (r) : „ Mulier , inquit , viginti circiter & quinque annos nata , jamdudum summa mobilitate prædita , mensstruis instantibus , aliqua perturbata mœstitia , loco solitæ evacuationis , oris distortionem , somnolentia , alta , lateris unius paralyfi corripitur . Uterus & tensus erat , & dolore manifesto ad tangentis manum afficiebatur . Subsultus aderant in tendinibus etiam partis paralyticæ , & vultus præter modum , atque rationem lividus sanguinis impeditum per venas jugu-

(q) Apud TISSOTUM Tratt. De' Nerv. Tom. II. Part. II. Cap. XI. §. 68.

(r) Loc. cit. Tom. I. Part. I. Cap. V. pag. 115.

„ lares arguebat regressum. Ipsa si e sopore
 „ excuteretur mœsta, & anxia. Plures per
 „ dies status iste perduravit; sed eam solvit
 „ insperatus successus. Etenim cum aliqua par-
 „ tium omnium convulsione illico & sui com-
 „ potem, & artubus omnibus exercendis parem
 „ fecere menstrua, quæ copiosius fluxerunt “.
 Qui quidem Auctôr haud raram existimat hu-
 jusmodi apoplexiam, eamque vocat *spasmodi-*
cam.

141. Quod de fœminis autem dictum est,
 quibus menstrua difficile, ac cum dolore fluant;
 id quoque repetendum de iis, quibus solitus
 hæmorrhoidum fluxus, aut retardetur, aut de-
 ficiat omnino. Nonne enim illarum fluxum
 antecedunt frequenter tum intestinorum flatu,
 tum maximæ universi abdominis spasticæ per-
 turbationes? Facile autem intelligitur, quo-
 modo nervi irritentur in iis, quorum vasa, so-
 lito fluxu impedito, distrahantur, ac tumescant.
 Sed hæc irritatio non uni fere respondet vaso-
 rum pressioni: *latet etiam aliquid mysterii*, in-
 quit LORRYUS, in fluxu hæmorrhoidum; hoc-
 que evincitur, tum ex atra sanguinis natura,
 tum ex terribilibus morbis, qui eo impedito flu-

xu suboriuntur; inter quos enumeranda venit apoplexia.

142. Insuper spasmi, qui ab irregulari podagra, præcipue vero ab ea, quam *atonicam* vocant, excitantur, apoplexiam gignere possunt quum sanguinis circulum satis perturbent. *Fortassis etiam*, inquit MOLLIUS agens de apoplexia biliosa, *quæ arthriticis, & podagricis familiares sunt, apoplexiæ huc referendæ sunt* (s).

Et revera nonne podagrici monentur primo flatibus, nauseis, doloribus circa ventriculum, atque intestina? Si debiliores ergo naturæ vires non amplius valeant podagricam materiem ad articulos propellere; ideoque in præcordiis relicta ibi irritationem faciat, spasmodumque, mortem apoplecticam promovere potest, sive spasmodum tantummodo cerebro communicando, sive ad illud majorem sanguinis quantitatem propellendo. Idem BOERRHAVIUS de hac re agens habet sequentia: *videtur ergo, quod causa hujus morbi, idest podagræ, non manifesta sæpe hæreat in succo nervoso, sed manifestans se circa nervos abdominales, & quod hinc*

(s) Loc. cit. pag. 26.

fiant vertigines, dolores colici, vel iliaci, & apoplexia (t).

143. Videtur præterea materies podagrica in cerebrum lata, acriterque stimulans invehere posse immediate in cerebrum ipsum spasmos, quibus enascatur apoplexia; quæ quidem *metastatica* dicenda esset. Et revera plerique evasere repente apoplectici vix retroacta podagra. Celeber. autem CULLENIVS (u) conjicit apoplexiam, quæ aut præcedit, aut consequitur podagram retrocedentem, exoriri a quadam potius succi nervi inducta immobilitate, quam, ut ajunt, a *compressione*. Id autem sibi persuadet, quia videntur ab iis ægris omnia abesse phænomena, quæ cerebri compressionem innuant; pleraque contra adesse unice nervorum, qui male afficiantur, indicia. Hæc igitur quoque apoplexia ad nervosas est revocanda.

144. Sed & sympathica nasci potest aliquando apoplexia a putrefactione, & a maligna qualitate, quam pus in abscessibus internis a capite remotis acquirit; ut inter alios adno-

(t) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 2555

(u) Inst. Med. Prat. Tom. III. art. 1118.

tavit QUESNÆYUS (x). Hujusmodi venenatum, ut ita dicam, pus non unice erumpendo, sed aliquando etiam abscessu occlusum, aliquando ex illo & guttatim fluens mortem attulit repentinam. Nos quidem latet qua ratione hæc terribilia fiant; sed observatione haud rara istiusmodi comperiuntur effectus. SENNERTUS quidem putabat hanc diram corruptionem, ut & venena, apoplexiam inducere posse. *Quidni, ait (y), ergo talis spiritus in corpore generari possit, qui, cum ante quietus latuisset, aliqua causa agitatus & motus; instar venenorum subito in actum erumpat, & spiritus animales a natura sua mutet, & quasi coagulet?*

Neque ego ardentem eos impugnarem, qui hanc mortem potius ex syncope, quam ex apoplexia investitam sustinerent: subderem tamen hæc substantias agere fere in cerebrum primario; sicque eam gignere apoplexiam, quam CULLENIIUS, (z) vocat *venenatam*.

(x) Memoires de L' Acad. Roy. De Chirurg. Tom. I. Par. I.

pag. 93.

(y) Tom. I. Lib. I. Parr. II. Cap. XXXIII. Quæst. III.

(z) Synops. Nosol. Meth. pag. 137.

145. Sympathicam quidem dicimus , five consensualem illam quoque apoplexiam , quam gignunt plura venena , statim ac ventriculum ingrediuntur . Plures enim videmus homines ad pristinam sanitatem redire , quum haud nimis fero totum evomuerint venenum . Adeo verum est plura venena stomachum irritantia , five quomodolibet lædencia perturbare vel maxime cerebrum , nervosque omnes ; quin tamen pars ulla veneni aut in sanguinem influat , aut illi communicetur , aut in cerebrum ipsum quomodocunque feratur .

146. Aliquando fungi quoque hunc dirum pariunt effectum . Subitam mortem ex fungorum esu adnotavit BONETUS (a) . Clariss. LUPINUS (b) exemplum habet apoplexiæ ex esu fungorum natæ , quam vomitorio sanavit . Celeb. Eques ROSA (c) dulcem memorat amicum , qui , quum quosdam fungos comedisset , horrens , furensque credebat semetipsum gehenna sepultum . Vix fungis rejectis exhilarabatur , atque sanabatur .

(a) Sepulchr. Lib. II. Sect. XI. Obs. 39.

(b) Histor. Morb. difficil. Ratisbon. 1768.

(c) Saggio di Osservazioni pag. 186.

147. Inter cœteros idem citatus Dodiffimus Auctor opinatur Opium quoque tantos præstare effectus, quorum pessimus est apoplexia, quum agat præcipue in stomachi nervos : & revera ab illo ejicitur sæpe ejusdem omnino ponderis, quo, quum deglutiretur, constabat; licet suas in nervorum præcipue imperium jam exeruerit vires. Nihil tamen prohibet, quin pars aliqua Opii halituosissimi ab hostiis vasculorum inhalantium absorbeatur, quæ vel sanguiferorum vasorum nervos afficiens actionem, vel impressionem, primo loco factam augeat; vel cum sanguine peragrans, ejus crasim immutet. Resolutio equidem putrida sanguinis, & alia putredinis indicia, quæ in cadaveribus ex Opio exanimatis observantur (d), probare videntur illud per os ingestum haud unice viis primis coerceri. Quidquid sit tamen, huc utique revocanda, quam memorat SENNERTUS (e), *ex narcoſi* apoplexiam.

(d) PORTAL Loc. cit. Chapitr. V. pag. 352. & MURRAY Apparatus Medicaminum Vol. II. Ord. XXI. pag. 187. Edit. Ticin. 1787.

(e) Tom. I. Lib. I. Part. II. Cap. XXXIII.

148. Sed & purgantia, quæ nimis stomachum, & intestina irritent, eadem aliquando ferunt mala. Describit HOFFMANNUS (f) in foemina dum fumebat pulverem ex resina jalappæ, & tartaro vitriolato confectum, non modo vehementissima tormina, verum etiam unius lateris paralysem cum aphonia, brachii-que contractura molestissima: curata fuit antispasmodicis, nervinis, & oleosis demulcentibus.

CAP. XIII.

De Apoplexia signanter Biliosa, quæ inter sympathicas frequentior observatur.

149. **A**poplexias inter sympathicas, si-
ve consensuales ea profecto mihi frequentior vi-
detur, quam *biliosam* dicunt. Neque biliosam
eam unice voco apoplexiam, quam una parit
bilis stomacho, aliisve, ut ajunt, primis viis
coacervata; sed eas omnes juxta plurimorum
doctrinam, præcipue Doctissimi MOLLII (g),

(f) Adnot. ad POTERIUM Centur. I. Cap. LXXIX.

(g) Differ. De Apoplexia Biliosa pag. 22.

biliofas appello, quæ ex quapiam morbosa primarum viarum faburra efficiuntur, aut ex viscerum vitio, quod bilis colluviem promoveat.

Adnotaverat quidem mirum hunc effectum, quo ventriculus gravatus cerebri functiones turbat, HELMONTIUS (h) dicens: *Si autem suboriatur mucilago putida ad amarorem prona vertiginem, & fortius insurgens apoplexiam suscitatur*: quam sane inferri minus dubitabit a pravis ad præcordia collectis humoribus, & a vitiata viscerum hypochondriacorum conditione, qui mente perpendat vitia, quæ in hypochondriis apoplecticorum ostendit sæpe cadaverum sectio, uti præ aliis adnotavit SCHROEDERUS (i).

150. Hanc promovent apoplexiæ speciem ira, mœror, ingluvies, cibus pinguis, ac facile putrescens, labor nimius, æstivum Cælum, & autumnale. Illi vero præsertim huic morbo obnoxii sunt, qui hypochondriorum vitiis, stomachi indigestionibus, vomitibus spontaneis, diarrhæis biliosis, atque cardialgiis sæpe vexantur; qui oculos produnt aut ad flavedinem vergentes, aut cum modica flavedine subviren-

(h) In Capit. A sede animæ ad morbos §. 12.

(i) Loc. cit. pag. 36.

res ; linguam vero flavescente , vel albescente viscositate obductam . Nec minus eidem morbo obnoxii sunt , quorum labia exsicca , os amarum , saliva insipida , abundans , atque spumescens : quæ vero indicia augebunt anorexia , ructus amari , anxietas tandem , repletionisque sensus ad præcordia .

151. Quare si apoplexia corripiatur , qui prius ostenderet aliquas , seu plures supradictarum dispositionum , haud equidem a ratione aberrabis , si talem ægrum asseras correptum apoplexia consensuali , quæ a regione hypochondriaca originem duxerit .

152. In quo quidem confirmaberis ulterius si diebus autumnalibus id accadat , si morbi congeneres eodem tempore grassentur , si æger valde sensibilis , & irritabilis periodicas patiatur vertigines , si ætas sit virilis , si arteriarum pulsus neque magnus , neque pressioni valde resistens , sique præcipue apoplexiam huiusmodi præcesserint acutissimæ cephalalgæ ; quarum indolem , & causam ex earum ipsa intentione gastricam esse dignoscimus , nullatenus inflammatoriam (k) .

(k) STWOLL Rat. Med. Part. III. pag. 201.

153. Haud rara quidem sunt biliosæ apoplexiæ exempla: Plerosque apoplecticos profert biliosos Clariss. MOLLIVS; duos autem memorat, quos refert Clariss. MEDICUS: æger uterque apoplexia periodica defunctus est: secto utriusque cadavere, summaque diligentia perlustrato, nullum morbi vestigium in cerebro apparuit; primæ autem viæ patuere refertæ materiis biliosis, quibus membranæ, proximæque partes supra modum conspiciebantur fœdatæ.

Auctor idem præterea meminit aliquorum, quorum apoplexia omnino evanuit postquam ipsi, aut sponte, aut remediorum ope biliosas materies evomuisent. Postremo quandam describit apoplecticam, quam Ipse observavit. „ Mulier „ quædam, ait, aliquot annos ante insultum „ apoplecticum hæmoptoe correpta, & ab ea „ liberata est. Mox in dysenteriam incidit, e „ qua venæsectionis, evacuantium, & acidorum „ auxilio iterum convaluit. Deinde febre biliosa „ correpta est, a mœrore, & curis „ nata, qua profligata brevi post inter ludendum „ in apoplexiam incidit. Oculi erant „ flavedine tincti, & pupilla valde dilatata „ paruit; lingua fordibus albis obducta fuit,

„ ventet tumuit, & alvus adstricta fuit. Pur-
 „ gantia, repetitaque venæ sectio eam in pri-
 „ stinam restituerunt sanitatem. “

154. Duo subitæ mortis exempla a subito-
 bilis in ventriculum affluxu adnotavit BONE-
 TUS (l). Monuerat jam summus BOERRHA-
 VIUS (m): *totum systema nervosum in capite tur-
 bari posse, nullo vitio in cerebro existente, sed
 illo tantum in præcordiis, vel ventriculo hæren-
 te*. Præceptoris doctrinam confirmavit Illustr.
 ejus Auditor, ac Commentator SWIETENIUS (n)
 exemplo cujusdam viri, qui inter amicos apo-
 plexia tactus procubuit humi: post horæ qua-
 drantem magnam pituitæ quantitatem præter
 ingesta vomitu spontaneo rejecit: hinc sensu
 rursus viguit, motuque; imo vero post noctem
 quieto somno traductam optime valens futuros
 elusit hæredes, qui, nuntio de ejus morte au-
 dito, festinanter illuc convenerant.

Non sponte, sed arte excitato vomitu pa-
 rem exitum habuit affectio apoplectica cujusdam
 Agricolæ ætate annorum octo supra viginti.

(l) Sepulchr. Lib. II. Sect. XI. Obs. 34. & 36.

(m) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 144.

(n) Comment. Aphor. 1017.

Hic mense januario , in quo biliosæ dominabantur pleuritides , domum ingrediens suis coram domesticis querebatur satis : nutabat enim cruribus , viribus deficiebat , incertoque intuitu vexabatur : subinde sedenti sensim increbuit morbus , evanuit mens , os apparuit detortum , ac dextrum crus sensu , motuque orbatum ; arteriarum vero pulsus videbantur naturales , vix tamen pressi digito cedebant . Suppeditatum fuit ægro tartarum emeticum cum Ipecacuanha , quo magnam ejecit materie flavæ , viridisque copiam : continuo ipse mente vigeat , componebatur ore , ejusque crus post octo dies sensu pollebat , ac motu . Ast aliud quoque hujusmodi apoplexiæ liceat hoc loci describere exemplum .

Reverendissimus N. N. ætate annorum triginta trium , optima corporis structura , magna-que nervorum sensibilitate præditus me dudum consulturus adivit , quum de quadam oculi sinistri debilitate quereretur . Hæc , quæ sequuntur mihi prænarabat Ille : „ Vir dignitate sum-
 „ mus nuper me incusavit , acriterque arguit ,
 „ injuria . Ego satis perturbatus animo me
 „ cœpi male habere : progressu dierum , os mi-

„ hi amarescebat , lingua fœdabatur fatis , a
 „ cibis nimium abhorrebam . Subinde crura ,
 „ & pedes frigescebant , totum corpus agitaba-
 „ tur ; a somno oculi alienabantur : die autem
 „ sequenti quodam deliquio deficiebam , vix in-
 „ cedere poteram , cogebarque caput inclinare .
 „ Accito Medico secta fuit vena , leniterque
 „ laxata alvus ; hinc levabar ita , ut iter po-
 „ tuerim milliarium viginti quatuor vicens con-
 „ ficere . Ast haud perfecte valebam : ideo
 „ mane sequenti dosim sumpsi modicam cassiæ
 „ cum tartaro , ex qua res in melius vergere
 „ videbantur . Re tamen vera post horas ali-
 „ quot omnia rursus in pejus ruebant . A ci-
 „ bis enim abhorrebam quam maxime , crura ,
 „ & pedes gelu quodam , totum corpus inque-
 „ tudine , molestisque venter flatibus vexabantur .

„ Quapropter sub horam diei vigesimam
 „ alteram , ut mihi mœrore confecto consule-
 „ rem , convisurus adibam amicum . Sed in
 „ ejus aulæ limine corripiebar apoplexia ; quod
 „ quidem elata voce innuebam auxilium im-
 „ plorans : lente fedi ; mens aliquantulum ob-
 „ tenebrabatur ; crura gelu majori rigeabant ;
 „ totum corpus torpescerebat , cor palpitabat : sub

„ ore frontis quædam veluti constrictio , sub sple-
 „ ne vero quædam distractio cum summo do-
 „ lore dominabantur . Ego vero natura du-
 „ ctus manu tentabam qua parte dolebam ; at
 „ manus paralytica opem renuit : tunc me sen-
 „ si hemiplegia læsum latere lævo , quod ta-
 „ men nec motu , nec sensu caruit omnino .
 „ Os detorquebatur ; post aliquot tamen horas
 „ in statum pristinum rediit : lingua implicaba-
 „ tur omnino , oculusque sinister suam extra
 „ orbitam videbatur depressus .

„ Post horas aliquot a secta tum brachii ,
 „ tum pedis venia , emeticum ex Ipecacuanha
 „ suppeditarunt , quo magnam evomui bilis fla-
 „ væ , viridisque copiam . Subinde per horas
 „ octo in pejus ruebam ; præcipue vero cogni-
 „ tio mihi imminuebatur vel maxime . Mane
 „ autem sequenti valde solabar . Imposterum
 „ me curare continuabant lenibus purgantibus
 „ repetitis , venæque sectionibus , quarum post
 „ quartam , quæ fuit jugularium , ita male me
 „ habui , ut mortem mihi imminuentem per
 „ dies plures putarem . Progressu temporis ta-
 „ men omnia paullatim optime restituta sunt :
 „ reliqua solum est in præsentia oculi læsio ,

„qua super te consulturus adveni “. Sic ille . Ego vero , rebus mature perpenſis , oculi ſanitatē perfectā brevi confeſciturum prædixi , quin ulla exhiberem remedia . Id autem factum fuiſſe poſt aliquot hebdomadas lætatus ſum : nunc temporis vero optimus ille Vir bene viget omnino .

Plures forte offeret Lectori animadverſiones hujus morbi hiſtoria . At ſiquis unquam apoplexiam huc uſque deſcriptam ad ſimplices ſpaſmodicas potius , quam ad bilioſas ſpectare opinaretur ; illi , meo quidem judicio , reſpondendum eſſet , bilis tum quantitatem , tum qualitatem , quam æger evomuit , ſatis confirmare , quod de eo morbo ſentiebat Medicus , quem magnifacio . Phænomena vero ſpaſmodica ad ægri pertinent ſenſibilitatem , atque ſummam irritabilitatem , quæ quidem , ut ſupra diximus , habent quam maxime apoplexiam quamcunque promovere conſenſualem .

155. Triplici autem modo videtur bilis humana apoplexiam gignere poſſe . Primo nempe , quum illa ſtomacho , ejuſque viciniis inſidens agit per ſolum , ut ita dicam , conſenſum in cerebrum ipſi ſpaſmum communi-

cando. Secundo, quum (quod forte ut plurimum accidit) invehit in caput majorem sanguinis quantitatem, sive ejus impedit regressum, ex quo congestiones ibi fiant, & hæmorrhagiæ (11). Ac revera ex causa hujusmodi in

(11) Materies, quæ insit stomacho irritans sæpe præcludit sanguini reditum a capite. Constat enim experimentis motum diaphragmatis interrumpi, ac respirationem, si nervum phrenicum comprimamus, vel irrites (HALLER Elem. Physiol. Tom. III. Lib. VIII. Sect. I. §. 38.). Hoc autem phænomenon videtur quoque futurum Clariss. COMPARETTO (Occurs. Medic. §. CXI.) siquidem irrites vel funiculos, qui pervadunt fibras diaphragmatis cum vasis sanguineis, vel in ventriculo ramos plexus nervi Octavi paris, quoniam ab hoc plexu *furculi*, cæterum *ventriculo dato ad Septum transversum accedunt*, ut notat loc. cit. HALLERUS. Etenim qua ratione acris materies ventriculo inhærens respirationem valde impedire queat, sanguinisque reditum a cerebro præcludere; hinc vero apoplexiam efficere. Refert ORTESCHIUS (Giornale di Medicina Tom. III. n. 51.) lacrymandum juvenis cujusdam Vicerini factum. Ipse structura corporis, viribus, valetudine satis viciens, natura vero irritabilis valde, sensibilisque, & nimis edax; repletus pane, non quidem communi, sed acriori ex nimia fermenti quantitate, quo forte abutuntur Vicerini, pectore repente angustiabatur cum spasmo insuperabili: hinc anno ætatis suæ vigesimo quarto obiit apoplecticus, & in secto cadavere inveniebatur stomachus eo pane refertus.

primis viis agente exortas observamus ophthalmias , ac narium hæmorrhagias , quæ tamen evanescunt emeticorum usu , atque purgantium . Tertio vero , quum illa eadem bilis fatis corrupta , & absorpta una cum sanguine circumit : tunc enim vires suas irritantissimas exerere potest immediate in cerebrum , apoplexiamque efficere . Et enimvero Clariss. STOLLIUS (o) observavit cerebri cujusdam substantiam *modice ictericam* .

156. Bilis autem facilius , quam humor quilibet animalis , aliquando corrumpitur adeo , ut in speciem veneni vigeat , noceatque . Quod quidem confirmatur vel maxime ab observatione diligentissimi CICOGNINI quam refert MORGAGNUS (p) . Adolescens quidam extenuatus tertiana febre , periit convulsus . Dissecto abdomine præter alia morbi vestigia , inventa est stomacho magna bilis æruginosæ copia , cujus attactu scalpellus violaceo colore inficiebatur . Eundem scalpellum eadem bile stillantem in carnem unius , & alterius columbi cum leviter

(o) Rat. Med. Part. III. pag. 388.

(p) Epist. An. Med. LIX. n. 18.

impressissent, ita ut bilis intra vulnus remaneret; haud multo post uterque, ac convulsus periit. Quin etiam mica panis, illa admixta bile, a gallo gallinaceo devorata, hic quoque parem habuit exitum.

PORTALIUS (q) quoque tres nuperrime affert observationes, ex quibus colligitur bilem aliquando ita acrem evadere, ut in speciem atrocioris veneni videatur agere. Vidi ego aliquando vim corrodentem, quam bilis ab ægris rejecta exercuit in metallicas æruginosas pelles, quibus recipiebatur. Quam sæva igitur erit ejusdem actio, ac virulenta in stomachi nervos, atque in præcordia, quibus insideat?

157. Ac revera a bile in præcordiis coacerata, & ab aliis primarum viarum fordibus congeneres apoplexiæ affectiones exoriri sæpe observamus. Haud raræ quidem sunt paralyfes, quas gignunt degeneres materiæ, atque irritantes infimo ventre insidentes. Neglecta hujus colluviei evacuatione dysenterici evadunt aliquando paralytici. CAROLUS PISO (r) histo-

(q) Observations ec. Chapitr. V. pag. 482. et suiv.

(r) Ib. De Morb. ex Serof. Colluvie Obs. XIII.

riam narrat Virginis cujusdam, quæ de repente hemiplegia correpta est: convellebatur præfertim parte capitis posteriore cum oris tortura, adstrictione maxillarum, totiusque corporis torpore, Vix tamen bilem multam evomuit, omnino convaluit. Clariss. STOLLIUS (s) quam plurimas ostendit esse phrenitides consensuales; quæ nempe a bile, aliave putrida materie primarum pendent viarum. Omnes pene norunt, deliria sive acuta, sive chronica, ut plurimum excitari a materie corrupta, atque vellicante præcordiis insidente. Neque enim hujusmodi deliria evanescunt, nisi ea materies, quæ fere semper biliosa est, eliminetur.

158. A colluvie primis viis hærente non semel terrentes observavi sopores. Hoc unum sufficiat exemplum. Ab humanissimo Clararum PRÆPOSITO inventus est publica via Gallus quidam mortali sopore occupatus, cui quidem adstabat uxor gemitibus auxilium implorans. Illo curante adsportabatur æger ad Xenodochium, ubi ego aderam Medicus. Uxor interrogata mihi negavit virum sumpsisse cibos, aut potus,

(s) Loc. cit. Part. III. De Caus. & Sed. Phrenitid.

qui tantum adferre possent detrimentum: fatebatur autem eum præcedentibus diebus, a cibis satis alienum, morbosæque fiti, ac lassitudine laborantem: nuper vero aliquid quietis captare volentem tetrissimo illo sopore oppressum fuisse. Pulsus nil durescebant; videbantur contra molles, ac vix febriles. Curavi ut æger aliquot tartari emetici grana deglutiret; excitabatur vomitus, sed levis; soporque persistebat. Jussi validiorem ejusdem emetici dosim propinari, qua ille magnam bilis viridantis, oleosæque quantitatem evomuit. Repente sopor evanuit, convaleuitque æger omnino.

Legitur in Sepulchreto (t), bilem subfuscam, quæ vesicam felleam distendebat, causam fuisse mortis in puero, qui sævissima cephalalgia excruciatu aliquando, subsequente tandem sopore perit. Nullum enim in cerebro vitium inveniebatur.

159. Aphoniam quoque ex hac eadem causa genitam observavit PROSPER ALPINUS, quem citat MOLLIUS (u), eamque observavit ex ven-

(t) BONET. Tom. I. Lib. I. Sect. I. Obs. 37.

(u) Loc. cit. pag. 28.

tricoli vitio SIMSONUS, quem memorat HAL-
LERUS (x). Vidit etiam HOFFMANNUS (y) sæ-
pe aphoniam a vermibus stomachum, aut inte-
stina vellicantibus; & ex verme terete cum
involuntaria fœcum dejectione aphoniam vidit
SWIETENIUS (z); imo, & ex binis vermibus
adhuc vivis vomitu ejectis catalepsin conspexit
mulieris quadragenariæ (a). CULLENIUS in sua
Nosologia jam *verminosam* adnotavit apople-
xiam.

160. At vis apoplexifera colluviei biliosæ
colligitur quoque ab iis apoplexiis, quas veluti
epidemicas observarunt Medici aliquando. Istius-
modi enim apoplexiæ videntur quidem ex vi-
tiata saburra, præsertim biliosa, primarum via-
rum exoriri, quum iis temporibus frequentiores
sint causæ, quibus bilis vitiosa solet infimo ventre
coacervari. Et revera MALOVINUS (b) Parisiis
observavit apoplexiam velut epidemicam decur-

(x) Loc. cit. Tom. IV. Lib. X. Sect. VII. pag. 224.

(y) Med. Syst. Tom. IV. Part. IV. Cap. VII.

(z) Aphor. 1364.

(a) Aphor. 1040.

(b) Histoîr. & Memoir. de L' Acad. Roy. Des Scienc. ann.

1748. pag. 552., et pag. 553.

rentibus mensibus Junio, Julioque anni 1748., a qua corripiebantur homines cujuscunque ætatis, & pueri etiam. Adnotabat Ille tamen aerem eo mense Junio præter solitum humentem æstuisse, hominesque fuisse valde vexatos biliosis tum vomitibus, tum diarrhæis.

161. Verum quidem est easdem apoplexias homines afficere quoque, quum tusses sæviunt, ac rheumatismi, ideoque eadem quoque conjici possent genitæ a cutanea suppressa perspiratione. At quoties tusses, affectionesque rheumaticas una cum bilis colluvie conjunctas observamus? STHOLLIUS inter alios tussim jam descripsit *stomachicam* (c), *biliosum* rheumatismum, *biliosumque* catharrum (d). Cæterum videtur quidem frequentiores epidemicas futuras esse apoplexias, si eas efficeret una tantum perspiratio aut impedita, aut imminuta.

162. Plures quoque opinantur hujusmodi apoplexiam exoriri aliquando tum ex bile, quæ in cystide coagulata in calculos concre scat, tum ex calculis renum, atque vesicæ. Et revera

(c) Rat. Med. Part. I.

(d) Loc. cit. Part. II. Cap. XI.

si biliares calculi præter cardialgias, anhelationes mortales, aliosque morbos, invehunt spasmos perviolentos in omnes corporis partes, præcipue vero in occiput, ut adnotabat TISSOTIUS (e); cur ex iis gigni nequibit apoplexia hominibus præsertim, qui nervis sensiles sint valde, mobilesque?

Hicce de causis apoplecticus obiit celebris MALPIGHIUS, uti refert BAGLIVIVS (f). Ille enim evomuit biliosa, alvoque dejecit; cordis palpitatione, calculis tum renum, tum vesicæ, postremo & podagra laboravit; subinde præcedentibus curis, animique passionibus apoplecticus evasit cum hemiplegia lateris dextri. Convalescebat: at post menses quatuor, rursus calculo vesicæ per dies octo excruciatu, apoplexia rursus corripitur, qua tandem vita decessit.

163. Alia quoque extat *consensualis* apoplexia, quam facit causa infra diaphragma existens, quaque solent corripi senes præsertim debiles, frigidique. Hujusmodi causa est pituita

(e) Tratt. De' Nerv. Tom. II. Part. II. Cap. X. §. 41.

(f) Opera Omnia Dissert. De Observ. Practic.

quædam, quam primis viis fluctuantem coacervare solet solidarum partium, & præcipue vatorum hypochondriorum debilitas. Hic morbus a nausea incipit fere semper, subinde in vertigines convertitur, desinit tandem in apoplexiam.

Literatos præsertim homines senescentes, qui motu abstinent, huic morbo esse obnoxios adnotavit BOERRHAVIUS (g). In ejus initio levare videntur vomitu, calidisque potionibus. Quum vero his de causis vasa relaxentur magis, magis augetur in iis pituitæ copia, quæ tandem mortiferam gignit apoplexiam.

164. Nuper quoque SCHOENHEIDERUS in primo volumine Actorum Societatis Medicæ Hauniensis narrat de quodam apoplectico, qui usu convaluit emeticorum: iis enim magnam e stomacho crassioris mucicopiam ejecit. Hanc apoplexiæ speciem vocat Auctor *cardialgicam*; hoc est e ventriculo exorientem, qui magna mucicopia opprimebatur. Paralysis numquam, ut ipse subdit, subsequitur hanc apoplexiam, quæ curatur emeticis.

(g) De Morb. Nervor. Tom. II. pag. 255.

165. Quid vero dicendum de hoc hemiplegiæ defectu, licet non illico moriatur æger? Numne putandum paralyfim abesse, quod morbi causa, five materies non subtilis sit, sed densa imo, & crassa; ideoque comprimens potius, quam nervos irritans? Numne rarior saltem est hemiplegia, quum apoplexiæ causa in uno dominatur ventriculo? Numne tunc solum subsequitur hemiplegia, quum morbus unice sympathicus evasit jam idiopathicus facta in cerebro congestione? Vix quidem per vomitum ejectis tum cibis, tum magna pituitæ copia convaluit apoplecticus, cujus meminit SWIETENIUS, ut supra retulimus (n. 154.), nullam de ejus hemiplegia mentionem faciens.

166. Ego quoque nuper hæc observabam. Venerandus quidam Cœnobita jam a biennio octuagenarius vertigini haud raro obnoxius, pro sua tamen ætate satis vicens, per triduum, quadriduumve offas crassiores, spongiosasque ad excessum edebat: subinde aphonus evasit de improviso; ab illo autem aberant tum quælibet sensatio incommoda, tum ad somnum proclivitas. At brevi latinum aliquod verbum, licet inconcinne pronunciat, mentis deordinatæ in-

dubia proferens indicia . Stratus lecto facie rubebat modice , oculisque ; naturalis erat respiratio , arteriæ pulsus sufficiens , sed nimis tardus ; nullumque in ægro paralyfis , sive ad vomitum inclinationis indicium . Monasterii Medicus jubet copiosam sanguinis emissionem , subinde cucurbitulas , quæ scarificarentur : die sequenti coxendicibus , & tertio die occipiti vesicatorium apponunt ; at res in pejus ruebant . Hæc mihi referebant die morbi quarta , qua fui consultus .

Ego vero observabam ægrum jam aliquantulum stertorose respirare , neque verba nostra , neque rudem vesicatoriorum perfricationem sentire : arteriarum pulsus ad excessum tardabantur , oculi semiclaudebantur , multaque saliva fauces impediabantur , quin ulla corporis pars paralytica conspiceretur . Remedium satis purgans præcepi , quod vix paullatim deglutiri potuit : post horas aliquot alvus copiose deonatur , æger pallet , deficit , ac morti proximus videtur . Spirituosus , ut ajunt , adjutus oculos referat penitus , adstantes probe noscit , loquitur , convaletque .

167. In hoc quoque ægro paralyfim nul-

lam, ac pro certo morbi causam ventriculo tantum insidentem deprehendimus, aut intestinis. Quamobrem, si harum observationum numerus augeri posset, paralyfis defectus, præsertim si alia quoque adsint signa, haud inepte hanc præsertim apoplexiæ speciem forte innueret. Notatu de cætero dignus magis videtur huiusmodi hemiplegiæ defectus, quum illa imo soleat comitari, aut subsequi fere semper apoplexiam, nisi cito vita defungatur æger: *ex centum apoplecticis*, inquit SCHOMBERGIUS (h) *qui sanantur, vix unus evadit a paralyfi aut unius partis, aut lateris unius*. Ad distinguendam ergo apoplexiæ speciem, haud parvi momenti esse potest hemiplegiæ defectus.

168. Siquis autem ægros, de quibus hic loquimur, *caroticos* potius diceret, quam apoplecticos; multa, quæ haud rationi absona responderi possent, omittam: id tantum subdam, quod nempe *carus* est apoplexia *minor* plurimorum magni nominis Auctorum; & quod utilius habeo morbum describere, quam ejus speciem subtilius sancire.

(h) Aphor. Practic. De Apoplexia.

169. Postremo non solum nervea videtur dicenda apoplexia, quam gignunt febres perniciosæ intermittentes, sed videtur etiam huc revocanda. Clariss. enim RAHNIUS (i) affirmat, plerumque nulla læsionis indicia protulisse cerebrum eorum, qui ex febre perniciosa intermittente apoplectici obiere. SYDENHAMIUS vero, TORTIUS, atque WERLHOFIUS hoc durum symptoma perturbationi viscerum hypochondriorum tribuunt, ac bilis corruptelæ: hanc sententiam confirmant alii quoque Clariss. Viri, inter quos SENACUS, MONROUS, & MEDICUS, quibus bilis præsentia tam evacuationibus, quam cadaverum sectionibus sese manifestavit (k).

170. Ast objicies forte: siqua bilis primis viis turgescens apoplexiam hanc efficeret; haud tolleretur a China-china, ut sæpe; neque ab Opio, ut aliquando videmus. Id autem respondendum puto, quod nempe ex successu horum remediorum probatur solum spasticam fuisse causam proximam istiusmodi apoplectici soporis; sed ex eo negare nequimus causam re-

L

(i) De miro Capitis, & Abdominis Consensu pag. 78.

(k) SELLE Rudimenta Pyretologiæ Meth. Ord. IV.

motiorem biliofas fordes, ut innuebamus, esse potuisse.

171. Dignoscetur vero præsertim periodicam esse apoplexiam, si febres grassentur larvatæ; si æger aliunde non sit proclivis ad apoplexiam; sique hæc post horas octo, aut duodecim ab ortu suo evanescat omnino. Res vero magis, magisque patebit si febris intermittens adsint indicia, in quibus recenseri solet *urina*, quæ sub finem accessionis intense flava, mox jumentosa, demum lateritia fiat; quod tamen indicium haud raro deest in larvatis intermittentibus. Et ipsa omnino deest aliquando horripilatio: nuper enim hujusmodi larvatam febrim observabam, cujus accessiones nulla horripilatione, sed odontalgia molestissima incipiebant. Quamvis autem variimoda sit harum febrium aggressio; in eo cæterum illæ conveniunt, quod epidemice plerumque grassentur.

CAP. XIV.

*De Apoplexia Sympathica, ex causis
pectori insidentibus.*

172. **N**emini difficile est intelligere, spasmum, qui viscera pectoris, ejusque vasa dominetur, gignere apoplexiam posse. Facile enimprehendimus sanguini e cerebro regredienti satis obviare spasmum, qui tum pulmones obstringat, tum vasa referentia uti jugulares, tum denique musculares fibras (quod facillimum est juxta WALTHERUM (1), quæ venæ cavæ superioris circumstant hiatum. Quo quidem regressu impedito nonne facile intelligimus exortam apoplexiam? Sed etiam cor, ac vasa crassiora, quorum musculares fibræ satis sensibiles sunt, atque irritabiles, in ægris convulsis patiuntur quammaxime; ac turbæ, quæ hinc exsurgunt, in cordis præcipue motibus, apoplexiam inducere possunt.

(1) Apud TISSOT loc. cit. Tom. II. Part. I. Cap. IX.
Pag. 254.

173. Id autem accidere potest iis aliquando , qui asthmate torquentur convulsivo . In his tamen , si senes præsertim essent , oppositum sæpe , ut verum fatear , observavi ; sanguinem nempe in eorum cerebro deficere ; namque in ipsorum deliquiis phænomena syncopis , apoplexiæque *ex inanitione* deprehendi potius , quam nimix sanguinis copiæ cerebrum opprimentis . In juvenibus autem bis , ut videbatur observavi brevem asphyxiam , quum morbus ad gradum pervenerit maximum .

174. Alia quoque ratione vitiata materies , quæ pectori insidet , efficere potest aliquando apoplexiam , si nempe aliquo modo in nervos cerebri translata ibi spasmus cieat . Metastasis huiusmodi prodebant duo , quos asthma convulsivum vexabat diu : insperato evanescentibus morbi symptomatibus , per aliquod temporis solabantur ægri . At subinde post leves mox unius , mox alterius membri subsultus improvise sopore , atque lethali perempti sunt . Hoc idem summe dolens observavit in Matre experientissimus Medicus , suavissimusque amicus meus MEZERA . Diutino torquebatur Illa asthmate convulsivo cum aliqua muci excretio-

ne: abfuit tandem omnis anxietas; abfuit afthma, fed poft aliquos menses videbatur convulfa, fubinde vero moriebatur apoplectica.

Meminit BONETUS (m) Theologi cujusdam, qui apoplecticus obierat; fepto ejus cadavere nihil morboſi in cerebro inveniebatur. In thorace tamen pulmones diſcolores, & ichore ſpumoso infarcti apparuerunt; hinc conjectatum fuit aliquam ichoris illius portionem infeciſſe ſuccum nerveum, ſicque inveſtam fuiſſe apoplexiam. At jam dici poteſt portionem aliquam ichoris abſorptam, & in nervos cerebri detentam effeciſſe morbum hujusmodi. Hac quidem de cauſa videntur plures phthyiſici mori repente, quæ apoplexia dici poſſet *metaſtatica nervoſa*; cujus ecce exemplum.

Virgo quædam vigefimo altero ætatis anno laborabat phthyſi: antequam ad ſummam deveniſſet maciem, ſolitum illi defecit ſputum, quod quidem mediocri a duobus menſibus ejicere præcipue mane ſolebat. Poſt dies aliquot, quin eſſet anxia, confundebatur mente, ſubinde evadebat amens omnino, ac de repente interibat.

175. Difficilius quidem est intellectu, quomodo causæ irritantes, sive prementes, quæ pectori hærent, paralyfes quasdam aliquando, atque apoplexias gignant, quæ solis videntur tribui posse sympathiis, ut ajunt, nervosis. Hujus generis aliquatenus esse videntur paralyfes illæ, & leves apoplexiæ, quæ illico exoriuntur sputis imminutis, sive omnino suppressis; quibus vero redeuntibus expedite evanescunt, atque omnino.

Huic quoque sympathiæ libens adscribo convulsiones, quas haud raro observamus in phthysi tuberculari; quum mane præsertim nequeunt miseri ægri sputa exhaustire: omnis autem convulsio quiescit statim atque semel expuunt, aut bis. Si enim a cerebro compresso ob impeditum sanguinis regressum; sive a metastasi materiæ de prima sede demigrantis orientur istiusmodi convulsiones, levesque apoplexiæ; non video quomodo tanta facilitate, tantæque celeritate evanescere possent paucis eductis sputis, sive auctis aliquando.

176. Id mihi tamen persuasissimum est, quod asserit celeberr. CALDANIUS (n); plura

(n) Institut. Physiol. Cap. XIV. n. 191.

nempe morbosa phænomena , quæ perperam communicantibus nervis tribui solent , a sublatâ circuli æquabilitate fortasse oriri impeditaque communione ; quod quidem sæpe evenire potest ob communicationem spinalium arteriarum cum cervicalibus , dorsalibus , lumbaribus , & sacris .

177. Hoc autem loci plures memorari possent paralyfes , atque apoplexiæ , lenes quidem ut plurimum , sed aliquando & lethales , quas Antiqui observarunt , Recentioresque cum præcedente nervorum pectoris irritatione , seu pressione . Huc revocat ill. HAENIUS (o) etiam paralyfim , qua super sic effatus est HIPPOCRATES (p) : *si aortæ appellatæ valde inflammatae sunt* (bini scilicet Trachæe rami) , *ut ad latus affideant , hac corporis parte resolvuntur : hos autem Veteres icthos , aut sideratos vocabant .* Verum hæc sideratio ex sæva peripneumonia exorta , ac fere semper lethalis a cerebri potius compressione pendere videtur , quam a sola ,

(o) Rat. Med. Part. III. Cap. II. pag. 108.

(p) Libr. Coac. Prænot. Sect. II. n. 3.

ut ajunt; sympathia (12). Alias vero plures adnotavit HIPPOCRATES (q) in tussientibus, & in anginosi paralyfes, quæ solis quidem sympathiis aliquatenus saltem tribui posse videntur.

178. Illustr. HAENIUS duarum mulierum, virique paralyfim, initiumque apoplexiæ observavit, quam vera consequebatur hemiplegia (r). Tres hujusmodi ægri vomica pulmonum laborabant: paralyfes autem eorum, initiumque apoplexiæ suppressioni sputorum succedebant; quibus redeuntibus illæ statim evanescebant. Clarif. quoque STORCHIUS (s) vidit in pluribus ægris paralyfim, & apoplexiam sanari omnino, critica sequuta anacatharsi.

(12) „Paralyfis in peripneumonia, inquit BOERRHAVIUS, „dicitur omnium pessima: nonnulli hoc attribunt nervis „hic distributis, sed videtur fieri a sanguine, qui se non „potest evacuare per venas jugulares; hinc pender potius „a nervis compressis, quam alio modo affectis“. De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 284.

(q) Lib. De Morb. Popular. Sect. II. versic. 25: De Morb. Popular. Lib. IV. vers. 27. Et ibidem Lib. II. Sect. II. vers. 105.

(r) Rat. Med. Part. III. Cap. II.

(s) Ann. Medic. I. Tom. I. pag. 126.

179. Celeb. FRANKIUS mei amicissimus veram observavit asphyxiam, quæ ex pure in pulmonibus coactò oriebatur: historiam narrabat Ipse mihi oris iis, heu paucis! quibus datum est cum illo colloqui. Rus vocabatur a quadam Matrona, quam phthysi affectam jam judicaverat expertissimus WERLOPHIUS. Sub vesp̄as adivit Ægram; suam tamen proferre opinionem recusavit, nisi prius eam reviseret mane sequenti, quum febris inclinaret. Tunc vero Ægræ inspexit oculos fulgentes, venas frontis aliquantum tumentes, faciemque quid penitus insolitum referentem. Quum autem & arteriarum pulsus durescerent, jussit venam contundi: expectabant Chirurgum, qui dimidio milliarii distabat; interea vero Matrona de repente convellitur; & brachia contorquens proster nitur solo: oculos prodebat apertos, nec tamen obnubilatos, pupillam satis expansam, os spumas agens, inferioremque maxillam veluti prolabentem: evanuerē pulsus, & respiratio. Dum Vir dolore furens angebatur, experientissimus FRANKIUS, humanissimusque jussit pannis tepentibus corpus fricare, aliaque jussit excitantia remedia, quibus obnitebatur ad vitam re-

vocare , quam quidem defunctam judicabant omnes , Mulierem .

Post horam cum dimidio reviviscebant arteriarum pulsus , spiritusque , stertorosus tamen , oppressusque excitabatur : suborta tussi quam difficili , ac velut suffocante , Matrona aliquantulum ex ore materie purulentæ ejiciebat . Hinc Medicus , quam prius suspicabatur , vomicam in ægra pro certo asseruit . Has inter miserimas rerum circumstantias , exhibuit parva , sed iterata dose Ipecacuanham ; ex qua levis iterum , iterumque excitatus vomitus notabilem e pectore extruxit puris quantitatem : hinc bono fato levabatur ægra , quæ per annos aliquot vitam protraxit .

180. Fatetur HAENIUS (t) difficillimum explicatu , quomodo causa unice premens , aut vellicans quemdam in thorace nervum efficere possit apoplexiam : putat ergo satis esse ejus possibilitatem probare ; quod præstat tum proferens insolitos , terribilesque effectus , quos sæpe parit in ulcere irritatus nervus ; tum memorans apoplexiæ speciem , quæ a sola appli-

(t) Loc. cit.

catione venenorum ad nervos stomachi exorta, mox evanescit sæpe, expulso veneno. Mihi vero fatis est iterum asserere, paralyses hujusmodi, apoplexias, atque asphyxias ex aliqua, quas supra recensuimus, causarum oriri.

CAP. XV.

Prognosis.

181. **N**orunt Medici periculosissimum morbum esse veram apoplexiam: hæc enim aliquando vitam adimit repente, sæpe tribus diebus, aut septem ad summum. Hujusmodi morbus juxta suos gradus diversos, diversimode absolvitur: hinc scripsit HIPPOCRATES (u): *solvere apoplexiam vehementem quidem impossibile, debilem vero non facile.*

182. At magis periclitatur apoplecticus morbo correptus, nullis antegressis signis: ille vero e vita certo decedit, cui, uno latere paralytico, alterum convellitur maxime & cui pulsus sensim magnitudine crescat. Observa-

(u) Aphor. XLII. Sect. II.

tum est etiam apoplecticum semper mori (x); qui manum iterum, iterumque eidem capitis parti admoveat, licet haud gravia videantur reliqua morbi symptomata. Pessimum quoque est signum, si initia talis morbi primo a facie incipiant. Qui per nares potulenta rejicit, qui stertit, aut spumas agit ex ore, aut frigidum ex corpore sudorem emittit, plumbeamque prodit faciem, indicia fere semper mortis profert. Signum plerumque mortis est quoque, si deductis palpebris pupilla valde dilatata appareat, admissaque luce nihil omnino contrahatur; ac pariter si urina, & fœces clam elabantur.

183. Perniciem accelerat febris si inflammatoria, licet illico superveniat; si autem nimis fera, aut valde exigua, inuilis est omnino. Præterea, qui etiam hoc morbo convalescunt, rursus in eundem facile recidunt. Inter apoplexias autem generatim sanguinea, atque serosa magis pertimescendæ sunt, quam nervea.

184. Et revera apoplexia convulsiva sæpe, sublato spasmo, solvitur omnino; quin ullum,

(x) QUARIN. Animadv. Practic. Cap. I.

aut faltem notabile reliquum fit fui indicium. Aliquando evanescit, quin ulla sensibilis fiat evacuatio; aliquando vero habita aliquā aut vomitus, aut sudoris, aut urinæ crisi peculiari, aut fluxu menstruo restituto. Haud raro definit in hemiplegiam, aut in paralyfim five perfectam, five imperfectam alicujus tantum corporis partis. At contra spasmus majorem aliquando sanguinis quantitatem, uti diximus (n. 50. 80.) impetuque majori in cerebrum cogit: ipfius hinc vafa diftracta, ac sæpe etiam difrupta mortem afferunt repentinam. Imo vero spasmus idem occidere potest, quin ullam forte faciat in cerebro congestionem, aut difruptionem, uti multis patet observationibus; inter quas fignanter hic recale, quas ex Celeberr. TISSOTIO excrifi (n. 76.). (13)

185. Periculo quoque plena est ea apoplexia, quæ a venenis pendet, aut a quapiam alia substantia, quæ nervos lædat summopere; cujus generis sunt tum materies arthritica, tum vapor carbonum. Inter funestas apoplexias,

(13) Binos ægros apoplexia convulfiva correptos observavit Clar. PANZANIUS obiiffe quinta morbi die, ut lego dum hæc typis confignantur.

biliosa est recensenda ; nisi mox idoneis oppugnetur remediis . Quæ demum ex acrimonia , vel inanitione exoritur , fere semper in mortem definit .

186. Morbum autem levari dicunt , si febris maturius accedat , & valida quidem , ut ephemera est , at non inflammatoria . Utilitatem ferunt quoque succedentes hæmorrhoides , urinæ multæ , ac sudor copiosus , æquabilis , roridusque . Inter melioris notæ signa enumerat CAELIUS (y) caloris reditum , spasticos in partibus paralyticis subsultus , non ac prius molestam deglutitionem . Aliqua quoque effulget spes , si æger *inclamatus* palpebras , ac labia moveat ; ac pariter si liberior , & ordinata fiat respiratio . Salus tandem expectari potest , si post venæ-sectionem , atque alia congrua auxilia intra viginti quatuor horas consequatur levamen , remittantque symptomata .

(y) Acut. Morb. Lib. III. n. 51.

De Curatione Apoplexiæ Sanguineæ .

187. **Q**uam apoplexiâ generatim, si jam invaserit, & multum periculi, & multum damni inducat in ægros; hinc nobis curandum vel maxime est, ut ab hoc morbo homines, quoad fieri potest, præservemus. Quod quidem ut assequamur, nobis diligentissime animadvertendum, si ii, quibus Medici adstimus, aut ex proprio corporis habitu, aut ex parentum vitio ad hunc inclinentur ominosum morbum.

188. His quidem hominibus indicare præstaret, quod illis imminet, periculum, ut in quibusdam atmosphæræ constitutionibus sibi caverent ab iis quammaxime, quæ sanguinem commovere, ac rarefacere habent, eumve in caput cogere; scilicet ne vinum, nisi parce, potent, ne horizontaliter jaceant nimis, aut lecto strati legant, aut his similibus vacent.

189. Ad ea pariter nobis diligentissime attendendum est symptomata (n. 17.) quæ solent apoplexiam sæpe præcedere, quæque ut-

plurimum negligi solent. Ea enim significant sæpius, humorum accensionem, copiam eorum cerebro auctam, nervorumque læsionem.

190. Interim quum inter causas, quæ ad sanguineam disponunt apoplexiam, maxima sit ad plethoram quædam facilitas; hinc hujusmodi ad generandum sanguinem facilitas præcipue oppugnanda est. Id autem arduum videtur; præcipue quum & adhuc causam latere credant, quæ tam facile ad excessum augeat sanguinis quantitatem. Præcipua tamen methodus, ac magis efficax, qua huic vitio obstemus in eo videtur sita, ut hujus generis homines & corpus exerceant, & temperanter vivant.

191. Dum corpus exercent, dum parce vivunt, rationem tamen habeant oportet, tum consuetudini, tum ætati. Illud juvat corporis exercitium, quod perspirationem servat, & promovet: nocere contra potest, quo corpus ferveat ita, ut nimis humores rarefiant.

192. A cibis autem, & a potu multum se temperent, si tamen corpus vigeat, sique moderatam vitam agere soleant. At contra mediocri tantum utantur diæta, qui satis abunde comedere solent: sua enim jura habet con-

fuetudo. Præterea si quis se ad diætam inducat, quum vires corporis aut intemperantia, aut ætate fuerint attritæ; tunc diætâ illi futura erit pernicipi, præsertim nisi ea utatur gradatim.

193. Semper autem oportebit tum a cibis se abstinere nutrientibus nimis; ac nimis stimulantibus, tum a liquoribus nimis actuosis. Vino cum aqua, aut saltem valde modico vino uti. A somno tandem diutino, & signanter a pomeridiano aufugiendum est, quibus solet facillime plethora augeri.

194. Quamplures pro certo habent, ut & communis fert opinio, plethorâ evitari sanguinis emissionem; quæ tamen iterata plethorâ faciliorem reddit: majorem enim solidis inducit laxitatem, spatiumque copiosiori sanguini suppetit. Favet ergo præcipue plethoræ ad vires, illamque auget, quam *obesam* dicunt. Quapropter vena tantum secanda videtur, quum e nimia sanguinis quantitate imminere apoplexiam deprehendimus, tunc imo & multum sanguinis emittatur.

195. Curandum est etiam alvum leniter laxari purgantibus acescentibus: addit quoque

LAURENTIUS CRELLIUS (z) , eos , qui caput aqua valde refrigerabant , apoplexiam effugisse , quæ jam imminere videbatur .

196. Adnotare libet hoc loci monitum Clariss. Medici FOTHERGILLII (a) : monet nempe eos , qui ad apoplexiam sanguineam sua constitutione videntur proclives , ne unice caput vergentes oculos intendant diu in objecta , quæ post humeros jaceant : quid enim perniciæ ex hac violenta corporis positione exoriri possit , hac paritate Auctor exponit : Extrema flexilis tubi ex corio deprehende manibus , ad distantiam pollicum octo ; contrario manuum parvo motu torqueatur tubus ; vix ejus imminuitur cavitas : si vero manus distent duobus tantum pollicibus inter se , idem , ut supra , in partes oppositas motus ita tubum complicat , ut ejus cavitas ferme evanescens nulli pene fluido permeabilis sit . Haud alia quidem ratione fit , ut qui breves , crassioresque sint collo , caput retrorsum intendentes nimis plicent jugulares ad superficiem positas : hinc sua imminuta diametro minorem sanguinis copiam revehunt ad cor ; quum ab

(z) *Bibliothèque Medico-Physique Du Nord* Tom. I. art. XII.

(a) *Giornale Ven. per servire ec.* Tom. III. pag. 433.

ipso adhuc multam ducant carotides, quæ centro illius motus proximæ vix aliquid incommodum ex capitis retroflexione patiuntur. Quapropter in hisce hominibus facile exoriuntur vertigines & subinde apoplexia.

Et sane, ut idem refert FOTHERGILLIUS, vir brevis collo transvehabatur Thamesim patula quadam cymba, inspiciens intente, quod ad se pertinebat olim, navigium: iter prosequens retrospiciebat etiam: de improvviso evanuit mente, sua procubuit cymba velut apoplecticus; nec, nisi post aliquod temporis revixit iteratis adjutus artis subsidiis.

197. Quoniam autem apoplexia facile corripit studiis severioribus incumbentes, qui sæpe meditando, diuque non solum spasmus in nervos, uti diximus (n. 53. & 82.), sed etiam multum sanguinis in vasa encephali invehere solent; hinc TISSOTIUS (b), efficacem describit methodum, qua ab literatis hominibus morbus hujusmodi arceatur. Illi nempe, ait, qui istis minitantibus sanguinis congestionibus obnoxii sunt, a studiis nimis gravibus se ab-

(b) Epist. var. argum. pag. 76.

stineant, & a fermocinatione diutina; vix, aut ne vix quidem caput tegant, placidaque sedentes fruantur quiete; a nimis tepentibus conclavibus aufugiant; potiones tum vini, tum cœffée recusent; tenuique utantur victu.

198. Quum vero ingruerit apoplexia, utrum sit ipsa sanguinea dignoscetur ex iis, quæ adnotavimus (n. 15. 18.). Dum ergo sanguineam eam esse comperiamus, æger lucidiori conclavi, ac temperato locandus est; ejus corpus aliquantum erectum sternendum, ac demum caput ejus omnino nudandum: imo vero CULLENIIUS (c) ægrum monet exponendum esse aeri frigescenti, neque adstantibus stipandum.

199. Hisce peractis sanguinem mittere necesse est, & quidem abunde; habita tamen ratione tum ægri viribus, ætati, corporis habitudini, tum præcipue pulsuum magnitudini, vigori que. Haud me latet quidem in plethora a rarefactione, & expansione sanguinis, utpote quæ massam non auget, copiosas venæsectiones inutiles videri. Ast in ægris, de quibus hic sermo, plethora quoque cerebri par-

(c) Loc. cit. Art. MCXXXI.

tialis primario innuit semper venæ-sectionem. Hæc enim iterata, prout postulabit res, imminuet saltem velocitatem, impetumque, quo sanguis in caput fertur.

200. Hæc autem velocitatis, impetusque remissio in apoplexia, aliisque cerebri morbis maxime utilis censenda est. Hac una ratione fit, ut ægri, qui cerebri plethora, vel inflammatione laborant, opprimantur, ac pene suffocentur jacentes: sanguinis enim ad cerebrum affluentis velocitatem, impetumque ea auget corporis positio, quæ contra vel arcet, vel auferit deliquia ex inanitione.

201. Nobis insuper sperandum est, ut venæ-sectiones imminuant non modo impetum, sed & quantitatem sanguinis, qui cerebrum premit. Neque enim derivationes, revulsionesque, quas Prisci docebant, sunt in dubium revocandæ.

202. Ut ergo impetum sanguinis, expansionemque cohibeamus, contundenda est primo vena brachii, quod resolutum haud sit paralyti, si æger hemiplegia sit affectus. Quod si fluxus menstruus, sive lochialis, sive hæmorrhoidalis adesset, aut ipse impeditus repente

fuiſſet ; tunc vena pedis ſecanda . Maximam quoque præſtant utilitatem ſectio jugularium , quæ tamen fiat ſola digiti applicatione , arteriotomia , cucurbitula in occipite profunde ſcariſicata , hirudineſque tandem , quæ non ſolum temporibus , & pone aures , verum etiam ano applicentur .

203. Hiſce temporibus Celeb. WALTHERUS (d) pluſquam a venis brachii , pedisſque probat emiſſionem ſanguinis ab iis , quæ vicinioreſ ſunt cerebralibus internis ; hinc Ipſe ſectiorem innuit primo jugularium , ſubinde facialis , frontaliſque : poſtremo hortatur hirudineſ apponere venis , quæ ad anguloſ oculorum conſpiciuntur .

204. CALLISENIUS autem Clarifſ. (e) in morbis cerebri pleriſque , ut apoplexia &c. ; arteriotomiæ , hirudinumque uſui præfert ſectiorem artificialem ſinum duræ Matris . Obſervatione enim , compertum eſt ex una parte cranium poſſe , ubi neceſſitas ferat , terebrari , exceptis ejus baſi , ac parte frontaliſ inferiori ; & ex alia parte vulnuſ ſinum duræ matris haud eſ-

(d) Nouveaux Memoires de L'Acad. de Scienc. Berlin.

1784.

(e) Act. Nov. Soc. Haunienſ. Tom. I. pag. 37.

se lethale, ut ante hæc tempora putabatur. Me quidem haud latet homines facile improbaturos Medicum hujusmodi sectiones jubentem: vulgus enim curæ methodum ne ingeniosissimam quidem ullius æstimat; sed tantum ejus exitum, qui malus plerumque ex mala morbi naturâ his ægris metui debet. At, ut res scire, ac probe noscere; sic & judicium vulgi aspernari verum Medicum decet.

205. Quod ad sanguinis verò quantitatem exhaustiendam, æstimentur, ut innuebamus, prius ægri vires, ætas, sexus, & temperamentum. Neque enim athleticis quoque, uti cum LIEUTAUDIO præcipit illustr. QUARINIUS (f), tantum sanguinis detrahendum est, ut calor natus solvendo morbo necessarius extingatur.

206. Sed magni refert, aliquando saltem, ut ad venam hisce ægris secandam opportunum feligatur tempus: in hoc autem Auctores minus insistere forte, quam par fuerit. Observamus enim haud raro venæ-sectionem in certa quadam morbi periodo satis juvisse, in alia contra nocuisse quam maxime.

(f) Animadvers. Practic. Cap. I.

207. Et revera; ingruente vix morbo syncopis potius phænomena, quam apoplexiæ prodire aliquando videntur, uti diximus (n. 19. 20.). Hoc autem momento non modo detrimentum, sed & mortem afferre venæ contusio posset; quæ quidem maximæ esset utilitatis, imminutis valde, sive evanescentibus iis phænomenis, quæ ad syncopem pertinere æstimantur. Hæc vero inter phænomena recenferi debent, color faciei semiluteus, oris spumescencia, respirationis interceptio, arteriarumque pulsus depressi, languentes, deficientesque. In his quidem rerum circumstantiis, emissio sanguinis, præcipue copiosa, magnum vehere potest detrimentum: vitalis enim sic retunditur energia, dum ipsa conatur vitam revocare, motumque circulatorium promovere, qui ex musculorum resolutione in vasis præcipue minimis immaniter retardatur. Neque sperandum in hac rerum conditione illam, quæ hisce vasis inest, *contractilitatem* posse ad locum venæ contusum, qui minus resistit, sanguinem urgendo, motum circulationis pene sufflaminatum iterum excitare.

208. Id quoque persuasum vellem, quod

ob nervorum compressionem minus sensibile, minusque irritabile apoplectici cor majori, ut agat, stimulo egeat, idest majori sanguinis quantitate. Quamobrem patet, venæ-sectionem, quæ fiat importuno temporis momento, apoplexia quoque sanguinea correptis nocere vel maxime posse. Hinc forte fit, aliquando saltem, ut apoplecticus licet plethoricus, vix vena contusa emoriatur, dum vulgus solet, Medico etiam absente, venæ-sectionem præcipere statim atque ingruat morbus.

209. Abstinendum est igitur a venæ-sectione, donec vires vitales videantur deficientes, exsolutæve: interea præstat unice uti cucurbitulis; præcipue occipite scarificatis, quæ habent ægrum expergefacerè, quin vitalibus noceant viribus. Hinc olim ZACUTUS LUSITANUS unius ope cucurbitulæ, quæ bis occipite scarificabatur profunde juvenem *resoluto jam pulsu ut in horas moriturus* videretur, restituit: neque enim poterat aliis artis subsidiis adjuvari.

210. Jam vero massa sanguinis, uti exposuimus, imminuta, alvum laxare præstat clysmatibus, quæ tamen sin minus mitissima, sal-

tem haud multum acria sint: nam quæ stimulant, possunt in imi ventris visceribus spasmos excitare, qui majorem sanguinis quantitatem ad caput vehant. Dolendum quidem est Medicos aliquos in apoplexia hujus speciei curanda abuti sæpenumero clysteribus acrioribus, & valde stimulantibus. Ad summum mihi videtur ægris quibusdam profuturum clystima ex decoctione cœffée, quam VOGELIUS (g) laudat. Cæterum, quæ irritant, ut plurimum nocent.

211. Verum ægri aliquando, aut imminente apoplexia, aut ipsa sæviante, evomunt; aliquando ad vomitum incitantur tantum. Hoc autem indicio adducti Medici quidam emetica propinant; & tristi quodam fato gravissimi aliqui Viri hujusmodi tutantur praxim. Emetica enim detrimentum semper, aliquando etiam mortem afferunt in apoplexia sanguinea, præsertim idiopathica.

Id constanter affirmant summi in arte viri. MORGAGNUS (h) namque, atque BURSE-

(g) Loc. cit. Tom. II. §. 563.

(h) Ep. Anat. Med. III. n. 4.

RIUS (i) hemiplegias leviores, mitioresque apoplexias, emeticorum usu, in graves, atque lethales defuisse observarunt. Imo MORGAGNUS mala quoque suspicatur de vomitu apoplectici, qui lauta mensa exurgens morbo correptus fuerit. Ill. HAENIUS quoque queritur maxime SYDENHAMII in hujusmodi morbo probare emeticorum usum, quem Ipse perniciosissimum esse pro certo habet (k).

212. Et revera vomitus spontanei, quos in his ægris observamus, haud equidem idiopathici, sed sympathici, utpote qui ex cerebri læsione exoriuntur, procul dubio dicendi sunt (n. 17.). Hinc jure ac merito subdit celebr. QUARINIUS (l), *peffime errare illos, qui ob solum materiæ biliosæ vomitum propinant emeticum, cum e plethora caput obturbante, nausea, & vomitus biliosus oriri possit.*

213. Videmus quoque morbos quosdam apoplexiæ affines nausea, vomituque primitus manifestari. Sic cum vomitu aliisque ventriculi symptomatibus erumpit morbus a TISSOTIO

(i) Loc. cit. Tom. III. §. 131. & §. 132.

(k) Rat. Med. Part. IV. Cap. V.

(l) Loc. cit. Cap. I.

descriptus (m), qui in eo situs est, ut vasa cerebri paulatim, ac lente obstructa fuerint: hi quidem ægri omnes in pejus ruerent emeticorum usu. CULLENIVS idem, qui drastica velut probat remedia (n) imposterum monet, tenui dose exhibenda, metuens ne ad vomitum incitent, quem ipse quoque putat perniciæ plenum. Ast aliquando emeticum cuidam profuit apoplectico: idem autem laborabat ne apoplexia sanguinea?

214. Contra vero maximam utique afferre utilitatem videntur, quæ a capite humores revellunt remedia: hujusmodi sunt balnea tepida, in quæ crura, pedesque immittantur; membrorum ligaturæ, frictions, sinapismi, & vesicantia.

215. Verum in apoplexia sanguinea ab iis abstinendum, quæ nimis sanguinem exagitant; hinc apoplecticis hisce renuunt aliqui summi in arte viri vesicantia exhibere. TISSOTIVS (o) vesicatoriis anteponebat opinatur sinapismos, si sermo sit de apoplexia sanguinea. SWIETE-

(m) Epist. var. argum. pag. 77.

(n) Loc. cit. Art. 1133.

(o) Epist. var. argument.

NIUS (p) monet valde caute apponenda esse apoplecticis vesicantia; præsertim vero in apoplexia sanguinea, nisi post iteratas sanguinis evacuationes. VOGELIUS Clariss. (q) affirmat apoplecticis *vesicantia longe magis inimica, quam amica esse*. LENTINUS autem (r) generatim suggerit in apoplexia vesicantium usum hisce verbis: *vesicantium usum sua cujuscvis ægri constitutio determinet. Nec hæc enim indiscriminatim, nec statim ab initio adhibenda esse, non possum non monere.*

Hæc nimia indiscriminatim, subitoque vesicantia adhibendi facilitas damnatur etiam quam maxime a Clariss. TRALLESIO (14). Si autem

(p) Aphor. 1025. & Aphor. 1034.

(q) Loc. cit. §. 563.

(r) Apud MOLLIUM pag. 40.

(14) „ Quid, inquit TRALLESIUS, in communi praxi magis
 „ obvium est, quam vix viso apoplectico, subito, & in-
 „ discriminatim recurrere ad vesicatoria, eaque larga, &
 „ multa nuchæ, brachiis, suris apponere, ut nempe alto
 „ somno sopitus excitetur, aut partes insultu superato pa-
 „ ralyticæ remanentes validissimis stimulis ad motus suos
 „ perditos iterum subeundos agitentur, incitentur, &
 „ ex intentione artificis cogantur? Non ne decebat antea
 „ dijudicare ægri temperiem, solidorum, & fluidorum in-

post morbi attentam disquisitionem apoplexia inveniatur sanguinea, tunc Auctor spectatissimus absolute improbat vesicatoria tamquam exitialia (s) eademque vocat cum TISSOTIO remedium *apoplexiferum*, potius quam *apoplexifugum*.

216. Et enimvero quid primo agunt vesicatoria? nempe stimulis urgent partem, cui apponuntur; quæ quidem inflammatur, suaque deinde textura evētitur. Nervi ejus loci iisdem stimulis percelluntur, eorumque turbæ toto corpore diffunduntur. Hiscē peractis, retunditur ne vesicantium vis? Observationes indubiæ docent, magis actuosas, magisque volatiles cantharidum particulas totum corpus per-

(s) Usus Vesicantium Salub. & Noxius in Morborum Medela Sect. Posterior. pag. 23. & 31.

„ dolem, ætatem, vitæ genus, & inquirere sedulo in veram causam, subitanæ motuum voluntariorum, & sensuum impotentiam inferentem, quæ semper quidem in encephalo latitat, & pressu suo in cerebri medullam, & nervos inde egredientes, tristes suos effectus patrat, sed non semper eadem, & sibi similis est, adeoque etiam eadem remedia exposcere nequit? “ Usus Vesicant. Salub. & Nox. Sect. Priori. §. 1. pag. 22.

meare: earum stimulis vires vitales augeri; atque hinc metuendum quam maxime, ne in cerebrum cogatur major sanguinis quantitas, motuque majori percita.

217. Si vero in præsens ad mentem revoces nervorum irritamenta (23.) vires vitales nimis auctas (25.), nec non universalem liquidorum expansionem, solidorumque distensionem (37. 43.), quæ in vera apoplexia sanguinea fere deprehenduntur; facile intelliges quanta in hos ægros mala a vesicatoriis invehi queant.

218. Hæc autem mala timenda sunt magis, si ægri solidæ partes plus æquo irritabiles sint, atque rigescentes. Hac posita temperie, quis ægro putaret adferre levamen, stimulos addens stimulis, vim vi? Non ne hac ratione fit, ut quæ febris aliquando juvare apoplecticum ex fero videtur, ea semper, aut ferè semper noceat correptis apoplexia sanguinea? Animadvertit BAGLIVIVS (t) vesicatoria pulsum accelerare, atque contrahere; febrem, sitimque augere, atque hinc parere effectus omnino iis

(t) De Usu, & Abusu Vesicantium.

oppositos, quos ad curandam apoplexiam exquirere debemus. Sapienter ergo citatus LENTINUS monet, vesicantium usum ab ægri constitutione esse determinandum.

219. Extat quidem celeberrimus Medicus a stimulantibus alienus omnino, quum in apoplecticis imminui debent sanguinis tum quantitas, tum motus; qui tamen putat in apoplexia sanguinea vesicantia profutura, si potius capiti, quam aliis corporis partibus apponantur. Idem ipse est CULLENIVS (u), qui tunc vesicatorium, non ut remedium stimulans considerat, quodque alio revellere valeat sanguinem; sed illud capiti appositum reputat potens remedium ad illam tollendam dispositionem, quam ad hæmorrhagiam habent encephali vasa. Quidquid sit de hoc tanti Viri iudicio, alibi (x) tamen ipse fatetur, vesicatoria nil unquam juvaminis attulisse correptis hemiplegia, quam recte opinatur a causis iisdem pendere, a quibus ipsa pendet apoplexia.

220. Quare ex dictis huc usque videtur inferendum vesicatoria, quoad apoplexiam san-

(u) Loc. cit. Tom. III. art. 1135 - 1136.

(x) Loc. cit. art. 1169.

guineam, remedium esse satis incertum plerumque; aliquando absolute perniciosum, præcipue quum ægri partes solidæ vigent nimis, satisque rigescunt. Cantharides enim, ut (n. 216.), dictum fuit, non modo in partes, quibus admoventur, sed in omnia viscera stimulos agunt suos, quum quam citissime insinuentur quocunque. Irritant ergo nervos, licet, ut fert aliquorum opinio, diversa actione, qua alia stimulantia, id præstent.

221. Ergo ad eos obtinendos effectus, qui ad hanc apoplexiam curandam exquiri debent, accommodatiores potius videntur fomentationes ad caput frigidæ, tepentes contra ad crura, pedesque, quibus olim utebatur AVICENNA. Scite ergo Clariss. CRELLIUS (y) apoplexiæ sanguineæ curationem fomentationibus frigidis tentandam esse credit; & mox Cel. quoque NICOLAIUS usum satis frigidæ tum interni, tum externi adversus apoplexiam commendat (z). Quum vero ex horum clariss. Viro-

N

(y) Loc. cit.

(z) Bibliothéque Du Nord Tom. I. pag. 266.

plexia frigidaë usus , non ne confirmari videntur , quæ de motu sanguinis intestino differuimus Cap. II. ?

222. Cæterum illud negari nequit , quod nempe certa quadam morbi periodo videntur ægro profutura remedia modice *tonica* , ac roborantia , licet aliquantulum exstimulantia . Si enim morbi imminuta vehementia æger vitam protrahat , tunc pulsuum deficit robur (n. 18.) , hominisque tota languescit compages . Post mortem vero pallidaë fatis conspiciuntur Meninges , ac flacidum cerebrum sæpius , cruentoque sero redundans : quæ quidem innuunt summam vaporum exhalantium , & absorbentium debilitationem . A roborantibus ideo remediis non semper est aufugiendum .

CAP. XVII.

*De Curatione Apoplexiæ , quam serosam dicunt ,
aut lymphaticam .*

223. **P**lures utique Scriptores , ut vidimus (n. 6.) eos improbant , qui apoplexiam in sanguineam distinguunt , & in serosam : imo vero PORTALIUS , alique negant omnino primario serosæ existentiam . Quæ quum ita in controversiam cadant , id saltem ostendunt , quod nempe , certis deficientibus signis , serosa non raro accipiatur pro sanguinea , ac vice versa . Et revera ; sectis cadaveribus , ea apoplexia haud raro patuit sanguinea , quam quidem serosam asseriebant Medici , attentis hujus speciei indiciis .

224. Hanc veritatem confusioni generandæ aptam confirmant observationes plurimorum medico-anatomicæ ; eæ præsertim , quas PORTALIUS profert , atque MORGAGNUS . Suis enim docet PORTALIUS , faciei pallorem , pulsus exiguitatem , spumasque ex ore haud certa constituere apoplexiæ serosæ indicia . Observationibus autem MORGAGNI deducitur , non semper

esse serosam, quæ apoplexia lente, ac gradatim hominem adurit: plures enim sanguineas hoc modo corripuisse ostendit Auctor sapientissimus (a). E contra haud paucas recenset Idem (b) serosas, quæ de improvviso erumpunt.

225. Sed neque fibræ mollities, neque ætas senilis satis indicant apoplexiam esse, ut ita dicam, exquisitè serosam. Novi ego aliquos senes facie pallentes, fibra nihil rigidos, quibus ad sanguinem satis densum generandum maxima inerat facilitas.

226. Quapropter certi sæpe deficientibus signis, quibus serosam ab sanguinea distinguamus apoplexiam, magnis nitendum conatibus, ut qui fieri potest, earum exploremus naturam. Id autem præcipue tenendum, quod nempe serosæ indicia, non seorsim singula, aut pauca; sed pleraque, atque conjunctim sumpta sint perpendenda, ut curationis seligamus methodum.

227. Indicia tamen, quæ difficilius Medicum fallent, erunt ea, siquid videam, quæ possunt suppeditari vel ab integra corporis consti-

(a) Epist. Med. Anat. III. n. 11 - 20 - 24.

(b) Ep. Med. Anat. IV. n. 6 - 9 - 11 - 16 - 21 - 26 - 28.

tutione, vel ab iis, quæ præcesserunt: facilius contra eum fallent, quæ vel comitentur morbum, vel eum subsequantur. Quare si in ægro ea omnino deprehendatur corporis temperies, quam supra descripsimus (n. 45.); ea medendi methodo oportet uti, quam ad curandam apoplexiam serosam experientissimi præscribunt Medici.

228. Quæ quidem methodus in eo sita est, ut primo huiusmodi apoplecticis exhibeantur purgantia satis energica; quæ scilicet componantur ex senna, agarico, jalappa, manna, anglico sale, cremore tartari, atque ex his similibus. Emeticum quoque minus his metendum, quam sit correptis apoplexia sanguinea: plures tamen & in serosa hoc remedium improbant. Laudantur præterea acria clysmata, vesicatoria, setacea, cauteria: tum vero usus probatur, cautus tamen remediorum excitantium. Legimus quoque apud HAENIUM (c), apoplexiæ pituitosæ exemplum ope vaporis electrici sanatæ.

229. At quærunt Medici; utrum nec ne his in apoplexiis sanguinem mittere oporteat.

(c) Rat. Med. Part. II. pag. 105.

Maximi quidem momenti est quæstio : error enim hac in re summæ perniciæ est sepænumero . Plures opinabantur venæ-sectionem apoplecticis ex sero nocere quam maxime : innitebantur auctoritati CELSI , qui scripsit : *si omnia membra resoluta sunt , sanguinis detractio vel occidit , vel liberat* (d) . Contra vero viri gravissimi , inter quos MORGAGNUS (e) , atque BURSERIUS (f) putant & in serosa apoplexia venam secandam , dummodo prudens adsit suspicio cujusdam vasorum plenitudinis , rubeique sanguinis copiæ .

230. Quare ægri constitutio quam diligentissime exquirenda est , uti supra innuimus ; sique indiciis quibusdam apoplexiæ serosæ , indicia velut conjungantur , quibus sanguinis certa quædam quantitas dignoscatur , tunc tantum sanguinis emittatur , quantum rerum circumstantiis sit accommodatum . Et revera spumas agebat ex ore , facie pallebat vel maxime , difficilem valde respirationem , & exiguos prodebat pulsus apoplecticus , quem PORTALIUS iteratis ve-

(d) De Medic. lib. III. Cap. 27.

(e) Epist. An. Med. IV. n. 15.

(f) Loc. cit. §. 135.

næ-secctionibus sanavit; licet ab aliis Medicis serosa judicaretur ille apoplexia correptus. Ast ille athleticæ erat constitutionis, ut PORTALIUS fatetur: ex hac autem athletica constitutione inferri potuit apoplexiam fuisse sanguineam, aut saltem non *primario* serosam.

231. Arteriarum autem præcipue pulsus certam quamdam sanguinis quantitatem habent significare. Hic tamen mihi liceat junioribus Medicis adnotare, hæud semper pulsum elevationi, aut exiguitati vires vitales respondere. Vires enim adsunt aliquando sub pulsu exiguo, ferme nullæ sub elevato: tu tamen arteriam digito preme; si ejus subinde pulsationes magis vigescant, vigorem, & sanguinem; si evanescant, debilitatem argue, sanguinisque inopiam, quas quum deprehendas, venæ-secctionem metue: vigentibus autem sub pressione pulsationibus tentanda est venæ contusio. Licet enim sint pulsus exigui, & alia absint apoplexiæ serosæ indicia, hæud tamen æger sanguine inops potest semper conjectari.

232. Fatendum præterea est observationes docere apoplexiam, quæ, ut ita dicam, primario, & exquisite lymphatica sit, raro ho-

mines adoriri: ut plurimum enim sanguis quoque distrahit capitis vasa; ex hac autem distensione sanguinea oritur subinde lymphæ, aut feri e vasis eruptio. Hinc vena videtur secanda ut plurimum, nisi id vetet malus corporis habitus, ut sæpe jam dixi, qui paucum sanguinem innuat vasis contineri, eumque effectum, solutumque.

233. Hac enim posita sanguinis inopia, ejusque mala dominante crâsi, venæ-sectio ægrococeret quammaxime. Vasa enim sanguine ferme exinanita a sero turgescente premuntur; hinc motus sanguinis remoratur, qui quidem incitari deberet ad cerebrum sublevandum, vitamque servandam. In hoc rerum statu naturæ vires in sui origine opprimuntur a sero, quod vel in vasis exuberet, vel ex ipsis erumpat. Oportet ergo eas expedire, atque excitare clysteriis, purgantibusque, quæ satis agant; tum vero emeticis, vesicatoriis, aliisque remediis, unde alio derivetur serum, quo caput gravatur. Væ autem illi, cujus vena secaretur, quum ita esset affectus. Idem esset ac si curare velles hydropem Ascitem non aquas exhauriens, sed sanguinem.

234. Quæ quidem venæ-sectio majora in-
 veheret mala iis, quos ex cacœchymia leuco-
 phlegmatica apoplecticos descripsimus (n. 47.):
 horum autem valetudo ferme omnino despe-
 randa est; ac his tantum poterit prophylactica
 adhiberi cura. Namque apoplecticorum hujus-
 modi natura hebescit omnino; ac veluti expi-
 rat: nil fere agit; solum pati videtur, nova-
 que, ut ita dicam, anima indiget. Vires vix
 nullæ, vix nulla solidarum partium elasticitas,
 mucositas quædam lenta fluidorum, frigida, &
 iners, remediis igitur egent summa activitate
 præditis, quæque valeant rursus excitare soli-
 dorum oscillationes, vitalemque calorem resti-
 tuere, qui jam deficiens comperitur omnino.

235. Monet propterea Medicos HIPPO-
 CRATES, ne tangant quidem infirmos hosce:
 metuendum enim est, ne qui fato pereunt suo,
 medica arte pronuncientur extincti. Hinc præ-
 stat Domesticos hortari, ut & omnia, & vali-
 diora suppeditent remedia; nos tamen de mor-
 bi exitu velut desperantes conspiciant.

CAP. XVIII.

Ratio Curandi Apoplexiam Nervæam Sympathicam , sive Consensualem , & primo quidem Biliosam , sive Saburralem .

236. **V**idimus , quam caute , prudenter , seduloque agendum sit , ut recte medeamur correptis apoplexia sive sanguinea , sive serosa : at magnis æque conatibus nobis contendendum est , ut eam curare apposite possimus , quam dicunt apoplexiam *nervosam* . Quoniam autem hæc dividitur , ut diximus in *idiopathicam* , & in *sympathicam* ; hinc ad exquisitum examen nobis revocandæ sunt tum indoles , sedesque causarum , quæ nervos irritant , vel alia ratione lædunt ; tum ægri , suorumque præsertim nervorum constitutio . Ex sola enim horum attentissima inquisitione elici potest , quid remedii singulis causis , singulisque ægrotantibus conveniat , quodque expediat in varia earundem causarum complicatione .

237. Principio vidimus supra apoplexiam haud raro gigni ex causis extra cerebrum existentibus , quæ in ipsum agunt consensualiter ,

sive, ut dicunt, ex sympathia. Hujusmodi vero causæ quam sæpissime stomacho insident, ejusque viciniis; & inter eas frequentius sævit acris quædam bilis, adeoque satis irritans, quæ ut vidimus (n. 153. 154.) apoplexiam facit.

238. Comperiemus autem hujusmodi bilem, aliamve morbosam materiam primis viis coacervari, si illa adsint indicia, quæ (n. 150. 152.) memoravimus, quæque sunt a morbofis ægri vitiis, sive antecedentibus, sive præsentibus desumenda (15). Verum supra ex Illustr.

(15) Quoniam apoplexiam vocamus biliosam, uti supra diximus, tum quæ ab una bile, tum quæ a saburra quacunque primis viis coacervata pendet; non erit utique abs re nostra hoc loci diligentiori, ac fusiori methodo (in juniorum saltem Medicorum gratiam) iterum recensere indicia, quæ non solum bilem, sed innuant saburram quamcunque primis viis insidere, quæque necessarium ostendunt sive emeticorum, sive purgantium usum. Rem itaque diligenter exploranti bilis, vel saburræ indicium dabunt stomachus, os, caput, pectus, cor, intestina; aliquando etiam totum corpus, uti adnotavit Clariss. PLANCHONUS (Le Naturisme pag. 140.).

Primo. Primas vias saburra gravari indicabit stomachus, qui vel alienus sit a cibis, vel eos aliquando expetat nimis; quique laboret oppressione quadam, nauseis frequentibus, vomitu spontaneo, cardialgia, doloribus

QUARINIO adnotavimus haud semper ex solo stomachi consensu gigni apoplexiam, licet æger nauseis vexetur, vomituque bilioso. Ad diligentissimum ergo examen prius est revocan-

identidem veluti mordentibus, ructibusque nullius aliquando saporis, aliquando vero acidi, nidorosi, foetidi, amari &c.

Secundo. Quod ad os spectat; hoc viis primis insidere saburram innuit, quum afficitur amaritie, foetore, dulcedine quadam ingrata; quum saliva præter solitum redundat insipida, viscosaque; quum vaporem calidam emittit, odoresque inter respirandum, qui ex materiis cieri solent acribus, acidisque; quum tandem lingua viscositate quadam obducitur subfusca, vel flava; si vero albescente, saburram significabit præcipue pituitosam.

Tertio. Caput colluviem, sive saburram primis viis insidentem indicabit, si vertigine vexetur, aut post cibum ad somnum inclinetur. Qui enim in somnum maxime fertur post cibum, nisi valde plethoricus sit, saburra gravatur, quæ fere est frigida: qui contra a somno alienus est, saburra calida solet laborare.

Quarto. Sua quoque gastricæ saburræ profert pectus indicia. Et primo quidem siquando difficilis adsit respiratio, quæ tamen non sit continua, sed tantum horaria. Curandum tamen est, ut spiritus difficultas, quæ a quibusdam pectoris morbis pender, recte ab ea distinguatur, quæ a gastrica saburra exoritur. Conjectabis a saburra exoriri, si respirandi difficultas instet per horas quinque, aut sex, deinde deficiat; si cibis sumptis augeatur sta-

dum, utrum illæ stomachi turbæ a læso cerebro pendeant; an a materie biliosa, quæ certo primis viis inhæreat.

239. Quare si apoplexia corripiatur, qui prius vexaretur bilis, saburræve alterius gene-

tim; si eam comitetur stomachi veluti a pondere oppressio; sique tandem absit tussis; aut siqua adsit, ea stomachi conjungatur oppressioni, quæ ægro ipsi indicat tussim e stomacho exoriri.

Quinto. Cor vero eandem indicat saburram, quum ejus motus imminuatur, pulsusque lenti evadant, exiguique: hinc minor sanguinis quantitas in cerebrum fertur, & æger viribus destituitur, ac velut pondere quodam gravatur: ipsi etiam palpitat cor, ac sibi imminere sæpe deliquium suspicatur.

Sexto. Intestina sua dabunt signa; quum nempe turbis, colicis, diarrhæis, dyssenteriiis lædantur. Addendus est quoque dolor, qui genibus, musculisque crurum *gemellis* excitatur, ut observaverunt FERRENIUS, atque PLANCHONUS (Loc. cit.); & ego quoque adnotavi haud raro. Et enim vero; Matrona quædam nuper quærebat per biduum de hoc dolore; tertia autem nocte subsequente, violenta corripiebatur diarrhæa, post quam dolor evanuit omnino. Regali quodam Monasterio adest præstantissima Virgo, in cujus visceribus abdominalibus solet haud raro accumulari atrobilaris materies: inter alia hujus coacervatæ materiei signa, quæ mihi obversantur, fere semper adest dolor, aut aliquando etiam quædam eorumdem musculorum, crurum nempe, contractio vio-

ris coacervatæ effectibus, a nobis supra descriptis, eorumque signa proderet; quique habitum haberet îcterodem, ac temperamentum satis sensibile, atque irritabile; arguendum erit apoplexiam esse consensualem.

240. Jam vero his in ægro compertis, antea omnia vena contundatur illi, necesse est. Fateor quidem haud magnam sanguinis quan-

lenta, ac satis dolorifera. TISSOTIUS quoque (De' Nervi Tom. II. Part. II. Cap. X. §. 41.) hominem novit, cui stupor quidam crurum, & quædam eorum gravitas diarrhæam prænunciabant, qua ille vexari solebat.

Septimo. Tandem quoad totum corpus saburræ gastricæ indicia sunt; rigores quidam, atque pallores non permanentes, sed frequenter redeuntes; febres quædam ephemeræ; pulsus irregularis, inæqualis, intermittens, quem vocant *intestinalem*; ac tandem madores, sive sudores nocturni absque causa manifesta, quos purgantium usus tollit omnino, ut idem asserit HIPPOCRATES dicens: *Sudor multus a somno, citra causam manifestam, factus, corpus uberiori alimento uti significat: si vero cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.* Aph. IV. Sect. IV.

Medico exploranti utrum aliqua ex his multis adefsent in ægro, priusquam apoplexia corripereetur; licebit conjectando inferre eum apoplecticum evasisse coacervata primis viis saburra.

titatem inesse ut plurimum iis, qui sunt natura biliosi: necessaria tamen est venæ-sectio, tum quia biliosa colluvies majorem sanguinis copiam ad caput congerit, (n. 155.) tum quia immixta sanguinis massa tutius alia adhibentur remedia. Clysmata protinus oleosa præscribantur, & emollientia; subinde & stimulantia.

241. At postquam apoplecticis hujus speciei sit ita provisum; ausu majori obnitendum est, biliosam colluviem eliminare. Quare purgantia sunt statim adhibenda; sed plures in arte summi Viri magis commendant, & jure quidem, vomitum excitantia. MOLLIUS vero (g) ejiciendam affirmat sive vomitu, sive secessu bilem: sic putant Medici plures, HIPPOCRATES præcipue, qui clyσμα præscribit (h), quod *bilem vehementer ducat, & quæ vomitum, & alvum movent*. Rem confirmat MOLLIUS tum referens plures apoplecticos ex vitio hypochondriorum convaluisse clysmatum ope, atque emeticorum; tum quoddam subdens fragmentum ex Dissertatione Clariss. RHANII, qui ita scri-

(g) Loc. cit. pag. 37.

(h) Lib. III. De Morb. Cap. 3.

bit (i), „ si optimos quosque Medicos consu-
 „ las, nullum facile invenies, qui vomitorio-
 „ rum, & purgantium usum in quibusdam apo-
 „ plexiis interdicat; licet pauci ex fordibus
 „ intestinalibus illorum remedium indican-
 „ tia depromant, sed potius ad cerebri idio-
 „ pathicam affectionem, ex serosa nimirum,
 „ vel pituitosa colluvie, respiciant: non ad
 „ me pertinet, &c. sed id monemus,
 „ vomitoria, purgantia, clysteres, tunc sem-
 „ per, & egregie convenire, ubi certa signa
 „ adsunt vitiosorum, acrium in primis viis
 „ contentorum humorum, qui non minus ac
 „ venena, cruditates ex cibis, vermes, uti
 „ quoscunque capitis morbos, sic apoplecticos
 „ insultus excitare valent; neque tunc ad eos
 „ tantum casus adstringenda esse, in quibus
 „ sanguineæ congestionis ad caput signa de-
 „ sunt; sed etiam in iis locum habere, quibus
 „ facies rubet, extrema calent, totus corporis
 „ habitus viget; quum ipsum illum calorem,
 „ turgorem sæpiissime ex intestinali colluvie
 „ produci, & foveri videmus &c. “

(i) De miro caput inter, & viscera Abdominis commercio.

Hoc quidem confirmat STOLLIVS (k) scribens ; „ faciem prærubram , ac quasi minio pictam in biliosis frequentissime video . Verum etsi intensa rubedine genæ micent , quæ ad oris commissuram , & narium pinnas procurrunt , ruborem pallor excipit ex flavo viscens . Hunc oris habitum , præcipue si & splendor quidam oculorum , quasi lacrymis innatantium accedat ; adeo pro signo genuinæ inflammationis non habui , ut eum inter potiora diagnostica redundantis intra præcordia bilis reposuerim “ .

242. Si vero objiceretur , STOLLIVM hoc loci differere de iis tantum biliosis , qui acuta febre laborant ; responderem , eosdem ipsos aliquando evadere apoplecticos . Sed hæc eadem adesse signa etiam sine febre , tunc quum biliosa insidet primis viis colluvies horrendum in modum minitans , ideoque purgantia , atque emetica adhibenda esse , sequens ostendet historia .

Clariss. PLUDA amicissimus mei , Medicus de hac Civitate optime meritus , & morum sua-

O

(k) Rat. Med. Part. II. pag. 129.

vitate unicuique dilectus pridie Idus Augusti anni 1787, me duxit convivendum Adolescentem quemdam Germanum, quem Ipse curabat. Adolescentem, ut mihi prænarrabat, ætate annorum septemdecim, auricomus, forma, totiusque corporis constitutione satis commendabilis, solitus carnes edere quam avidissime, a pane vero, simplicioribusque cibis alienus, inventus est mane alto demersus sopore, ac cognitione orbatus. Adstantium voce, stimulisque tentabatur frustra: oculos vix ille apertos obserrabat rursus, quin ullum daret cognitionis indicium. Jubente Medico secta est vena, clysteria, & excitantia quoque remedia suppeditabantur; at nihil levabatur. Conviventibus nobis ægrum sub vespas, hæc comperiebantur: turgebat illi facies, rubebatque: fulgebant oculi rubentes, ac lacrymis madentes: pulsus debiles, exigui, humilesque aut nullam, aut ferme nullam prodebant febrim. Hæc nobis explorantibus observabatur animo anni tempus æstu magno fervens, in quo biliosæ grassabantur diarrheæ, atque dysentericæ; hinc una pronuntiavimus adolescentem sopore correptum, quem biliosa fecerat primarum viarum colluvies. Quapropter

oblatum est ægro tartarum emeticum aqua solutum; cujus ope magnam viridantis bilis copiam evomuit; hinc ipsi restituta continuo mens, loquela, ratiocinium. Asserebat autem nihil eo usque incommodi se perferuisse, ac nihil de eo usque actis sibi constare. Subinde vero aliquot clysteribus, tenuibusque purgantibus adjutus, post triduum omnino convaluit. Sic mihi licuit nova observatione confirmare, quæ ex RHANIO, & STOLLIO desumpta asserebam supra; ex biliosa nempe colluvie præcipue faciem rubere, oculosque; licet aliquando pulsus exigui dejectique sint; absit vero febris.

243. Biliosa igitur colluvie supradictis detecta indiciis; statim clysteria, purgantia adhibenda sunt, & præcipue vomitoria: materies hujusmodi morbose omnino evacuanda, ac cito; *periculum enim est in mora*. Inter remedia unum est vomitorium, quod statim agat. Non ne curaremus extemplo a ventriculo, intestinisve venenum exturbare; quod illic nosceremus? Cunctabimur autem, si bilis inest, quæ ad instar agit veneni? Audeat ergo aliquid, qui morbi causam in vitiata bile detexit; & ab hisce ægris blandi nimis absint Medici.

Hac forte ductus ratione SENNERTUS (l) ipsam materiæ præparationem spernit, dum quæstionem solvit, quam ipsi proposuerat PETRUS SALLIUS DIVERSUS: hic enim quærebat; *an stante cruditate pharmacum exhibere liceat apoplectico?* Respondet autem Ille: *ut præparationi opera detur, morbi magnitudo, & præsens, quod summo opere urget, periculum prohibet.*

244. Extat quidem vulgatissimus HIPPOCRATIS (m) aphorismus; *Concocta purgare, atque movere* &c. At medicamentorum inopia ita Priscos coarctabat aliquando, ut ipsis liceret tantum morbos observare: nos contra novis instructi medicamentis possumus, & sæpe tuto, ipsis mederi. Præstat insuper ægrum curare quocunque modo, si principium aliquod venenatum, lethiferumque ejus minetur vitæ, uti bilis in apoplexia, de qua agimus. Subdam postremo, quædam generalia medicinæ præcepta, haud raro esse restringenda; HIPPOCRATEM imo idem præstitisse, præcipue vero hoc super præcepto, ut patet aphor. 24.

(l) Loc. cit. Quæst. V.

(m) Aphor. XXII. Sect. I.

245. Sed quod vomitum generatim spectat, Vetustissimi quoque observarunt, bilem frequentius, tutiusque evacuari per vomitum solere. Id idem asserit HIPPOCRATES in libro de Morbis: *quantum quidem in ventriculo, & vesicula inest bilis, quod quidem in ventriculo est, aliquando deorsum exturbatur, plerumque vero in primis diebus vomitur*. Præferendum ergo est vomitorium, quod aptum est ad obsequendum naturæ, quæ in initio morborum ex vitiata bile, eam solet vomitu spontaneo eliminare. Quum vero temporis angustiiis, urgentique periculo prohibeamur inquirere utrum matura sit, an cruda biliosa colluvies (quæ quidem cruda conjici debet, quum apoplexiam facit) ; & magis adhuc vomitorium adhibendum est, quoniam habetur aptum ad evacuandam bilem licet immaturam. *Subpurgandi sunt ventres*, ait rem confirmans HIPPOCRATES (n), *in morbis ubi purganda matura fuerint : inferni quidem ubi confidisse videris. Signum habes si non anxii fuerint, neque capite gravati, & cum calores mitissimi, & cum post exacerbationes cessarint. Superni vero in ipsis exacerbationibus*.

(n) Lib. VII. De Morb. Popularibus.

246. Et enimvero haud raro vomitus spontaneus, ut supra adnotavimus, bilem initio morbi extrudit sæpe, vehitque salutem. Si ergo naturæ vires velut impeditæ id nequeant præstare; cur ejusdem naturæ auxiliatrix ars haud exhibebit remedium, quod vomitum excitet? Non ne prudentissimi viri, inter quos TISSOTIUS (o) vomitorium exhibent & epilepticis, quum morbi causam primis viis insidere detexerint; licet & in epilepsia satis sit metuendus quilibet ad cerebrum humorum affluxus?

247. Plura suppetunt exempla, ut exposuimus (n. 154.) apoplecticorum, qui post venæ sectionem vomitorii usu constanter valuerunt; quibus alia addi possunt exempla. Virgo quædam, quæ tum menstruorum defectu, tum aliis hypochondriorum vitiis laborabat, apoplexia corripiebatur: brevi in pristinam rediit salutem clysterum usu, atque vomitorii (p). Cel. NICOLAÏUS (q) historiam affert senis cujusdam satis vigentis, & cholericæ temperamento præditi, qui apoplecticus evasit: contusa vena, sum-

(o) Dell' Epilessia Cap. XX.

(p) *Commerc. Noric. an. 1739. pag. 366.*

(q) *Ex MOLL. loc. cit. pag. 38.*

ptaque copiosa tartari emetici dosi, ingentem pituitosæ materiæ, ac bilis copiam evomuit, atque convaluit. Nova ejusdem morbi prænuntia post aliquot menses minabantur, sed repetitis vomitoriis imminens insultus arcebatur.

248. Tandem ventris infimi colluvies triplici modo apoplexiam, de qua hic agitur, gignere posse videtur, ut vidimus (n. 155.). Primo quidem nil forte materiei morbosæ in cerebrum fertur; ast ægrotante ventriculo ob quemdam inexplicabilem consensum ægrotat quoque encephalum. Secundo vero quum bilis colluvies copiosorem sanguinem ad cerebrum propellit. Tertio tandem, quum aliqua abdominalis colluviei particula in cerebrum ipsum intruditur. Si primum dicas, cum nihil cerebro insit morbofi, tutissime vomitorio uti potes, emisso prius sanguine e vena: si alterum, aut tertium asseras, adhuc vomitorium esse adhibendum censeo, ut sublato fomite bilis, tum eam prohibeas cerebro augeri, suamque vim exerere funestissimam, tum sanguinem copiosorem a cerebro arceas, quem actio bilis in præcordia illuc determinare posset congestiones forte effecturum.

249. Hoc ideo loci serio animadvertendum est, vomitorium, quod cæteris remediis, huc usque anteferendum probavimus, absolute adhibendum esse antequam sympathicus morbus fiat idiopathicus, hoc est antequam sanguis in vasis cerebri, ejusve involucrorum consistat congestus, aut in cerebro fiat materie biliosæ metastasis. Quod enim vomitorium vitam servaret ante congestiones, atque metastasim, post eas forte mortem promoveret. Quapropter præstaret vel maxime Medicum dignoscere posse temporis punctum, quo congestio, sive metastasis in cerebro fiat. Quibus ergo indiciis harum tempus inquirere licebit? Rem quidem inquisitu difficilem primis præcipue earum inchoamentis.

250. Hæc tamen, quæ sequuntur, aliquod lumen videntur afferre posse: Primo nempe quum sanguinis congestiones cerebrum comprimunt, tunc arteriarum pulsus elatiores, ut plurimum, vividiores, atque tardiores evadunt; rubor faciei extensione augetur, & saturitate; oculique aliquam sæpe produnt mutationem.

Secundo autem, materie morbosa a ventriculo in cerebrum transvecta, veraque meta-

stasi facta, arteriarum pulsus, præcipue si notabilis sit metastasis, qui molles erant tota bile præcordiis insidente, durescunt satis, vibrati fiunt, angusti, rigidi, nihil omnino prementi digito cedentes; minusque frequentes evadunt, imo aliquando naturalibus vix celeriores: idque forte ex eo, quod materies metastatica habet non solum comprimere, sed etiam valde irritare cerebrum, ejusque involucra. Verum fere semper est perniciofa, atque lethalis hujusmodi ad caput facta metastasis, si adeo valida fit, ut supradicta prodat indicia: tunc serosoflatice turgidissimos laterales cerebri ventriculos in extispiciis offenderunt Observatores.

251. Quapropter ex his omnibus ulterius constat, quam præstet uti vomitoriis, priusquam sanguis congeratur in cerebrum, cerebrumque comprimatur; imo vero priusquam aliæ fiant metastases, quæ certo perficientur, nisi subito eliminetur in morbis præcipue febrilibus abdominalis colluvies.

252. Jam vero inter vomitoria laudantur, quæ ex antimonio sunt parata. Minus enim accommodata videtur apoplexiæ hujus speciei ipecacuanhæ radix, quæ aut effœta est, aut

fordibus non raro stomachi involuta nullum, aut non pro dignitate præstat effectum. Illi ergo anteponendum est tartarum emeticum in aqua, quæ sit purissima, solutum. Id quoque adnotandum, quod hisce apoplecticis nocere possunt aquæ potiones, quæ sumpto emetico ad faciliorem vomitum reddendum satis abunde exhibentur: hisce enim copiosis potionibus stomachus tumescit nimis, distrahiturque; hoc autem semper perniciosum est in apoplexia. Ab ea ergo abstinendum erit methodo, quæ tamen generatim debet probari.

253. Purgantia quoque subsidium afferent, præcipue quum æger emetico usus fuerit, visque morbi aliquantum remiserit. Salia vero, manna, tamarindi, tartari cremor, hisque similia reliquis videntur anteferenda. Quum vero hisce in ægris spasmi abdominales facilius excitentur, ideo exhibenda sunt etiam, quæ sedantia sint, & antispasmodica: inter quæ selegisse juvabit, quæ minus calida sint; & ea quoque clysteriis copulare præstabit.

254. Diximus tandem (n. 163.) senes, & senescentes, præcipue si vitam agant quietam, aliquando apoplexia consensuali corripi,

quæ pendet a pituita primis viis coacervata. In hac quidem apoplexia a venæsectione abstineri præstat, aut saltem quam diligentissime omnia expendenda sunt, priusquam ad eam procedatur. Præstabit autem clysteres præscribere aliquantum stimulantés, purgantia; imo & emetica, siquidem materies deprehendatur mucosa, ut in ægro, quem SCHOENHEIDERO referebamus (n. 164.). Ibi quoque utilitatem vidimus maximam attulisse Cœnobitæ (n. 166.), tum purgantia ex manna, & cremore tartari, tum clysteres aliquantulum extimulantes.

CAP. XIX.

Ratio Curandi Apoplexiam a febre intermittenti exortam.

255. **Q**uum bilis potentia in febribus intermittentibus alendis ab omni tempore cognita sit (r), quumque viri gravissimi affirmant (n. 153. 169.) se ne minima quidem læsionis vestigia invenisse in cerebro eorum, qui ex pe-

(r) SELLE Rudimenta Pyretologiæ Meth. Ord. IV.

riodica febris apoplectici obiere; sed tantum bilis corruptæ copiam eorum præcordiis insidentem; obvium ideo est, curationem subinde hoc loci tradere illius apoplexiæ; quæ ex febre intermittenti exoritur aliquando. Ubi ergo ad ægrum apoplectica febre decumbentem vocemur, in ipso quidem paroxysmo non alia adhibenda sunt remedia, quam quæ præsens periculum possunt imminuere, ac felicem præcipue accessionis crism, promovere.

256. Exacto autem feliciter paroxysmo; sequentis accessionis metuenda est ferocia, imminensque periculi certitudo; hinc tempus corticis peruviani usui opportunum frustra non est terendum. Ad summum si sanguinis copia adsit, atque turgor; venæsectio instituenda; & si qua sursum turgescens primarum viarum coluvies emeticum postulet; emeticum lene, antimoniale est propinandum. Sed vix finita remedii actione ad largiorem corticis usum accedere non cunctabimur; ita ut duas pulveris drachmas quavis tertia, vel altera hora ægro præbeatur, ne ille, superveniente exacerbatione e vita decedat; & turpe illud Medico supersit unice effugium; *quis hoc credidisset?* ut

optime scripsit prudentissimus RHANIUS (s) .

257. Liceat ergo rursus hic instare , ne tempus teratur in morbis hujusmodi , sed ægris cito china - china , nec parca dose , exhibeatur . Medico enim cunctante , parvaque remedii quantitate morbus insidiis plenus , ac sæpe fatalis nequit compesci : non est curanda nimis alvi purgatio , neque est metuenda haud modica corticis quantitas . Me quidem pœnituit nunquam hac mala morbi detecta natura suppeditare notabilem corticis dosim : idque sub finem alterius paroxysmi , ut quo diutius fieri possit , remedium suam exerat actionem , qua vel futuram accessionem prohiberet omnino , vel saltem retunderet .

258. Ast hic mihi præbetur occasio aliquid referendi de ægris hujus generis duobus , quos bono fato inter cæteros curavi : alter enim præferebat peculiare morbi circumstantias , alter dum hæc scriberem meam in sui subsidium vocabat opem .

Primus erat FERDINANDUS Comes CALINUS , Ecclesiasticus generis nobilitate , morum

pietate, scientiaque, cujus specimen tum verbis tradidit, tum typis vulgavit, præclarus. Hic autumnali tempore anno ætatis suæ sexagesimo septimo, dum rure vacaret, corripiebatur febre cum horripilationibus, quæ æstu superveniente invehbat alternis diebus verum soporem apoplecticum, alternis verum delirium. Nam prima morbi die post frigus subsecuto calore æger optimus apoplectico tenebatur sopore; qui tamen post horas octo circiter, febre declinante, solvebatur ita, ut Domestici morbum conjectarent omnino evanuisse.

At die sequenti (morbi secunda) redibat aliquo cum frigoris sensu febris, quæ, loco soporis apoplectici, delirium adferebat. Tunc ab Urbe advocatus rus sub vespertas perveni, & in ægrotante Virō tum febrim observabam jam desinentem, tum quæ metuenda comitabantur phænomena; inter quæ aderat sanguis urinæ immixtus, & alia quidem putridæ dissolutionis indicia. Proximo diei tertiæ mane, cum primis viis videretur biliosa colluvies inesse, jussi remedium, quo satis alvus purgaretur. At purgantis actionem subsequēbatur febris diei tertiæ, quæ rursus soporem apople-

eticum primo majorem invehebat. Peractis iis, quæ minus inepta videbantur ad præsentem accessionem compescendam, declinante febris, notabilem chinæ-chinæ quantitatem exhibui: hac non obstante renovabatur die quarta tum febris, tum delirium. Hac quoque vix declinante accessione æger optimus, me quidem suadente, doses corticis iterum, iterumque sumebat. Specificum ita devicit morbum, ut & quintam febrim cum sopore, & sextam cum delirio, aliasque futuras quascunque prohiberet omnino. Sed ad alteram procedamus observationem.

HYERONIMUS Comes NEGROBONUS ætatis annorum sexaginta, cui me totum devoverat gratus animus, libensque, erat Æger alter, Vir sanguine, moribus, officiis spectatissimus. Circa Kalendas Octobris anni 1787. eum adoriëbatur febris absque ullo frigoris sensu; cujus naturam insidiis, periculisque plenam patefaciebant ea, quæ sequuntur phænomena. Febris nempe, cujus periodus erat horarum ad minus triginta duo, doloresque acutissimi, colicos nephriticos similes, Ægrum lacebabant, cui passim videbantur deliquia imminere: comita-

bantur tum gravis ad somnum proclivitas, tum vaniloquium; quæ tamen omnia post horas triginta duo compescebantur.

Tunc emetico-cathartica potio ei propinabatur, quæ fæces biliosas dejecit copiose: quæ tamen dejectione subsequenter nequiverunt febrim cohibere, quæ immo satis valens majora minabatur, mecum mœrentibus valde Proceribus Urbis, Civibusque. Inter unam tunc, alteramque accessionem, duobus aliis assentientibus experientissimis Medicis, tres cum dimidio uncias corticis sumpsit, quæ tantum potuere febris subingredientis imminuere symptomata. Postremo tandem iteratis Chinæ-Chinæ dosibus morbus omnino evanuit.

259. Sed accidit aliquando sive ob deglutitionis vim sublatam, sive ob vomitus pertinaciter perdurantes ægrum ingerere non posse sufficientem corticis quantitatem. Tunc optimo cum successu clysmata substituuntur ex China-China parata, atque per justa intervalla repetita. Quod si neque chinata clysmata, nec qualescunque corticis præparationes feбри suffocandæ sufficerent; tunc juxta clariss. Virorum consilium Opii vires supererunt tentandæ.

260. Tali vero posita necessitate, una circiter ante novam accessionem hora, Opii sufficiens portio est porrigenda. Extant quidem, qui utilius existimant, semihorium post caloris initium Opium exhibere (t): hæc tamen methodus non videtur accommodata omni feбри intermittenti, quæ sit apoplectica; quum saltem aliquando, dum ingruit febris, adoriatur & apoplecticus sopor.

Hinc quædam in tanti remedii administratione observandæ sunt leges: harum est præcipua; si nempe causa desit materialis, & unus character nervis impressus febrim efficiat. In febribus tamen intermittentibus, quas soporosas, sive apoplecticas dicunt, Opium, causa licet adhuc adsit materialis, est porrigendum, materialisque causa post febris suffocationem tollenda. Nimium enim est, quod instat periculum (16).

P

(t) MURRAY loc. cit. Tom. II. pag. 210.

(16) Super hac re legi meretur perutilis Dissertatio JOANNIS JACOB. SCHAERTLICH *De Usu Opii in Febris intermittentibus*. Goettingæ 1783. & in suo Delectu Opusculorum Medicorum posita a Clariss. & de nobis meritissimo FRANKIO.

*Ratio Curandi Apoplexiam ex hypochondriaci,
atque ex difficultate tum fluxus Menstrui,
tum hæmorrhoidalis, & etiam ex podagra
abdominalibus nervis insidente.*

261. **E**xstat apoplexia, quæ, ut vidi-
mus (n. 131. 132.) ex spasmo viscerum ab-
dominalium exoritur. Illud etiam adnotavi-
mus, quod ab eorum viscerum, artuumque in-
feriorum spasmo sanguinis motus in iis parti-
bus præpeditur, aliorsum avertitur, cerebrum-
que versus majori impetu determinatur. Qua-
re hujusmodi ingruente apoplexia venæ-sectio-
nem instituere oportet, ut & humores ad ce-
brum affluentes arceantur, & ut jam remo-
rantes alio deriventur. HOFFMANNUS quidem
pluribus in locis, præcipue vero in suis Con-
sultationibus, venæ-sectionem probat in ea apo-
plexia, quæ ut Ipse scribit, *viros hypochondria-
cos, fœminasque hystericas, sæpenumero infestare
solet* (u). Auctor idem, dum suum profert ju-

(u) Consult. Medic. Cas. XVI.

dicium super ægrum, qui casu decimo nono describitur, hæc ait: *morbum equidem non alium esse iudico, quam leviolem apoplexiam passioni hypochondriaco-spasmodicæ supervenientem, cuius certe accessio hypochondriacis frequentior, quam a Medicis dijudicatur, deprehenditur. Hoc vero apoplexiæ genus tempestivis venæ-sectionibus, clysteriis, pediluviiis, aliisque sanatur.*

Præstantissimus quoque MORGAGNUS (x), bis iussit eadem die venam contundere Sacerdotis cuiusdam apoplexia correpti, qui ab aliquot annis convulsivas patiebatur hypochondriorum affectiones. Putabat quidem MORGAGNUS Sacerdotem periclitantem ex multi seri affluxu; sed tamen subdit: *constrictis insuper, ut sæpe in huiusmodi convulsivis hypochondriorum affectionibus usuvenit, sanguiferis in ventre vasis, illa propterea, quæ ad cerebrum attinent, magis sanguine distendi crederem. Sic in aliis quoque feci eodem exitu.*

Contundenda igitur est hisce apoplecticis vena: in iis enim præsumenda est plethora sal-

(x) Epist. Anat. Med. IV. n. 15.

tem localis, partialisque vasorum, quæ ad cerebrum attinent; licet absint signa, quæ innuant totum vasorum systema sanguine redundare.

262. Emissa vero opportuna sanguinis quantitate, exhibenda subinde sunt remedia, quæ & compescere valeant hypochondriorum turbas, & alio avellere humores caput gravantes. Effugienda vero sunt omnia stimulantia, quæ his præcipue apoplecticis nocent quammaxime. E contra fomentationes, cruriluvia, clysmata emollientia quam aptissima sunt reputanda. Quod si suspicemur primis viis saburram inesse, quæ flatus pariat, aliasque turbas hypochondriacas augeat; purganda est leniter alvus, idque blandis remediis præstare juvabit.

263. Ast inter hypochondriasis symptomata frequentissimæ sunt hæmorrhoides; licet non raro hæmorrhoidibus sint obnoxii, qui nequaquam sunt hypochondriaci. Inter hos tamen, qui sanissimi, fortes, vegetique non sunt, spasticis abdominis turbis conflictantur, quotiescunque ex intervallo instat hæmorrhoidum fluxus, uti adnotavimus. His quoque ægris accommodata est methodus supra descripta. Curandum

tamen est, ut & fomentationum, vaporumque usu, imo vero & hirudinum ope hæmorrhoidales venæ deonerentur.

264. Si vero mulier apoplectica evadat ex eo, quod menstrua cum difficultate, ac dolore fluant; in primis emittatur sanguis necesse est; ut vasa uteri nimis distenta expediantur. Quum vero in hujusmodi apoplexia maximum ferant auxilium menstrua facilius, atque copiosius fluenta, uti & LORRYUM observasse vidimus (n. 140.); adhibenda ideo sunt, quæ ad hunc effectum aptiora videntur, remedia. Ex his tamen respue stimulantia, præcipue si adsit nimia fibræ irritabilitas, nervorumque mobilitas, quæ fere semper hunc morbum quidem comitari solent. Tunc optimum præstabunt effectum fomentationes, semicupia, clysmata emollientia, sedantia, antispasmodica, atque similia.

265. Quum vero abdominales spasmi excitentur a materia pōdagrica; quæ in nervis abdominalibus se se manifestet, ibique atona sæviat; tunc post pedis venæ-sectionem sedantia adhibenda sunt remedia. Hisce peractis præstat topicis remediis insidiosum fomitem ad extremas ignobiliores partes invitare. Hinc adhi-

beantur fomentationes, pediluvia, epispastica, atque vesicatoria. Celeber: HALLERUS laborare solebat podagra: quam quidem, siquando vel infimum ventrem divexaret, vel aliam, quam nollet, partem, ad pedes revocabat pediluviorum ope, quæ ex sinapis decoctione parabat. Inter adjuvantia subtilissimi fomitis transmigrationem ex uno loco in alterum memoratur a præstantissimo MURRAYO (y) nixus signanter partis cujusdam intensior. Stimulata enim, si-ve debilitata a nixu pars ad suscipiendum virus alicubi latens aptior evadit. Valida ergo extremarum partium defricatio, atque distensio poterit maxime prodesse.

266. Si vero deglutitio impedita non sit, juvabit uno, eodemque tempore ad naturæ vires augendas ægro exhibere aliquantulum vini Canariensis, si-ve Burgundienfis, uti innuit LIGERUS (z). SYDENHAMUS quoque, atque MUSGRAVIUS energica vina commendant paullatim sumpta, præcipue quum podagricus fomes stomachi, ac intestinorum excitat turbas antequam

(y) De Materia Arthritica ad Verenda aberrante Disquisitione. Goettingæ 1785.

(z) Traité De la Goutte Part. III. Chapitr. XI.

extremities occupet . In hujusmodi tamen apoplexia caute procedendum .

CAP. XXI.

Ratio Curandi Apoplexiam ex venenis per os sumptis , fungis , Opio , aliisque similibus .

267. **S**iquis corripiatur apoplexia , quæ a veeno per os sumpto exoritur , difficile est peculiarem , appositamque præscribere medendi rationem . Quapropter opportunum videtur , aliquot generales veluti regulas recensere , quas jam præclarus protulit COLLENIUS (a) .

Primo ergo qui apoplecticus evadere videatur paullo , postquam venenum sumpserit , si sponte vomit , arte quoque ejus vomitus promoveatur ; si contra id non faciat sponte , Medicus ceter , ut arte statim e stomacho sumptum venenum extrudat . Qui vero veneni jam pridem impti actionem fero persentiat , ille aut nullam utilitatem ex vomitu , aut damnum quoque percipiet .

(a) Loc. t. Cap. De Apoplexia ex venenis .

Secundo . Admodum probabile est venenum jamdiu sumptum , quodque apoplexiam fecit , aut in cerebro humores aliquos congeffisse , aut motum humorum faltem imminuiffi in cerebri vafis . Præftabit ergo e jugularibus fanguinem mittere , five brachialibus .

Tertio . Suppofita in cerebro humorum motus imminutione , eorumve congeffione , adibenda erit ea medendi methodus , quæ tum congeffiones tollat , tum humoribus naturalem reftituat motum . Hinc generatim acriora cefmata alvum exonerando adjumentum ferent

268. Verum , fiquid ego video , ulteora requiruntur : nihil enim imminutionis maius , nihil congeffionis , ut plurimum , metuerum eft , quibusdam agentibus venenis , quæ vefanguinem ita folvunt , ut hoc ipfo apoplexiam cum morte ferant , vel convulfiones excando necant . Hæc autem exitia augeri imo æffent aliquando ea medendi ratione , quæ ad otum fanguinis accelerandum , vel ad congeffices auferendas inftitueretur . Aft in præfentinequimus hac fuper re ex profeffo differere .

269. Interim noftris in regionibus venena , quæ frequentius mortis apoplecticapericu-

lum inferunt, sunt fungi, & Opium. Si ergo ab Opio nimia quantitate sumpto pendeat apoplexia, omnia adhibenda sunt, quæ ægrum a sopore excitare valent: vena secanda, si adhuc vigeat pulsus, frigidusque absit sudor, emetica energica sunt exhibenda, ut tartarum emeticum, & vitriolum album, præcipue si sensum amiserit ventriculus, suamque irritabilitatem.

270. Sed præstantissimus MURRAYUS (b) experimentis innixus memorabilem affirmat potentiam ad Opium debilitandum inesse Ipecacuanhæ; quæ vel sola potest exhiberi, vel aliis utiliter emeticis addi. Etenimvero Puella quædam unciam bibit tincturæ, in qua scrupulus Opii continebatur: at licet sopore, convulsionibus, & spasmis vexaretur, e periculo tamen evasit sumens iterum iterumque Ipecacuanham (c). At quantum ista sit potis vim infringere Opii, indubie patet ex pulvere DOVERI, in quo duo, vel plura continentur Opii grana, totidemque Ipecacuanhæ. Hujusmodi enim pulvis unice sudorem promovet, ut ex quotidianis præcipue constat Anglorum observationibus.

(b) Appar. Medicam. Tom. I. Ord. XIII. pag. 444.

(c) MURRAY Loc. cit. ex SMITH Dissert. de Spasmis.

Si vero pharynx , & œsophagus spasmo contrahantur , ut nihil deglutiri possit , tunc remedia per tubum metallicum demitti jubet BOERHAAVIUS . Quod si jamdudum Opium ab ægro sumptum fuerit , præstabit loco emetico-
rum maximam aquæ limonatæ , sive aceto mixtæ quantitatem propinare , & clysmata ex aqua , & aceto injicere . Quum vero insultu jam devicto , stupor maneat , tristitia , atque debilitas ; occurrere hisce oportet aqua frigida , sale absynthii , & sale quoque viperino parva dose propinato .

271. Par autem esse debet ratio medendi etiam iis , qui aliis narcoticis opprimantur . Stramonium enim , Bella Donna , Hyosciamus tum in corpore viventis , tum in ejus cadavere eosdem , quos Opium , pariunt effectus . Agentibus enim venenis hujusmodi , totius corporis calor satis augetur , facies rubet , pelle exiliunt maculæ quædam , veluti echimoses , externus orbis palpebrarum præsertim nigrescit : sæpe etiam ex oculis , ex naribus , ex auribus , atque ex ano exprimitur sanguis : pulsus vero pleni sunt , vividique ; oculi fulgentes , os spumas agens ; lenta respiratio , membra rigescencia , & aliquando convulsa : si vero ad sanita-

tem redeant, incommodis capitis torquentur. In eorum vero cadaveribus ea pariter observantur, quæ in cadaveribus ex mephiti, aut ex Opio defunctorum.

272. Quum vero BOERHAAVIUS, cui subscripserunt HALLERUS, TRALLESIVS, LUDWIGIUS (d), alique plures, multam Opium inter & vinum affirmaverit analogiam; ideo (quicumque cæterum sit hujusmodi analogiæ gradus) præstare videtur curationem hoc loci tradere apoplexiæ, quæ ex ebrietate gignitur aliquando. Siquis ergo ex hac causa apoplecticus fiat, primo æger pronus locetur, aut ita saltem, ut facile evomere possit: imo vero si ventriculus turgescere videatur; tunc aut guttur irritando, aut potionem ex oleo, & aqua tepenti exhibendo, vomitum promovere necesse est. Maximam vero afferent utilitatem clysmata, quæ & irritando alvum deonerent: mergantur tandem aqua tepenti ebrii crura. Si vero liceat, tentanda est venæ-sectio.

273. Si denique a fungis gignatur morbus, emeticum statim exhibendum est, vomitumque decoctione althææ, oleoque magis magisque pro-

(d) MURRAY loc. cit. Tom. II. pag. 196.

movendum. Quum vero admodum difficile sit hoc in casu vomitum excitare, optimam propterea opem fert Nicotianæ decoctio clysteris ope injecta, utpote quæ adeo necessarium vomitum excitet. Hac decoctione ab imminente morte erepta fuit anno 1761. Princeps fœmina de CONTY, uti refert Clariss. POULETUS (e), a fungis venenata: hoc enim tandem remedio vomitus excitatus est, postquam alia plura emetica frustra jam tentata fuerant.

CAP. XXII.

Ratio Curandi Apoplexiam, quam faciunt Vapores Mephitici.

274. **Q**uum de venenis hic sermo sit, haud absolum erit methodum subinde tradere curandi eas apoplexias, quæ ex mephiticis exoriuntur vaporibus. Et primo quidem hujusmodi apoplecticos extrahamus oportet, five a sepulchris, five a cellis vinariis, five ab aliis subterraneis locis, in quibus miseri moriebantur. At qua ratione id, sine alterius mortis periculo, præstare licebit?

(e) Memoires de L' Acad. Roy. de Medicin. an. 1776.

275. Notum est acrem loci subterranei, sive sepulchri purgari, & ad respirationem idoneum reddi ignis ope, quam quidem facilius suppeditat pulveris pyrii explosio. Contra vero aer, qui in cellis vinariis, similibusque locis, fermentescentibus onustus est vaporibus; purgatur, & ad respirationem aptatur, aquæ ope. Quare diversa methodo destruendæ sunt causæ diversæ, quæ mortem mortalibus minantur. Quæ quum ita se habeant, diversimode quoque mederi debemus hujusmodi apoplecticis: quæ enim ratio curationis unum juvat vel maxime, eadem alteri omnino nocebit.

276. Jam vero hac apoplexia correpti sive a sepulchro, sive a cella vinaria, sive a conclavi vaporibus carbonum referto sublatis, aërique aperto expositi, statim methodo, quæ melior inventa est, nobis tentanda est curatio. Non enim miseri hujusmodi negligendi sunt, licet a pluribus horis spiritu exinanita videantur cadavera: haud veram indicant mortem pulsus, respirationisque defectus, membrorum rigor, & insensibilitas; quemadmodum oculi viventis similes, membrorum flexibilitas, & calor haud semper vitam significant.

277. Statim ergo aqua frigida abluendus est æger: res esset periculo plena cum super cineres calescentes sternere, pannisque calefactis fovere, licet hæc satis juvent aquis submersos. Eidem quoque noceres, si in ejus anum induceres fumum nicotianæ. Hujus enim vis narcotica haud parum damni invehet in ægrum, cujus irritabilitas, atque sensibilitas sint imminutæ valde, & forte etiam extinctæ. Præterquamquod, fumus nicotianæ, quum multum aeris, dum injicitur secum ferat, nimis intestina distendit: hinc urget diaphragma pulmones versus, iisque figit ferme: quare tum auget suffocationem, tum eam, quæ nimis ibi dominatur, humorum rarefactionem. Acetum itaque aquæ immixtum, & injectum satis irritabit intestina, rarefactionem minuet, atque hinc maximo erit adjumento ægris hujusmodi.

278. Non me latet plerosque censere nicotianæ fumum minus officere aqua submersis: iisdem tamen, quos asphixiæ gradus extremus occupat, melius consulas, si ab hujusmodi remedio abstineas omnino; juxta recentiores observationes, quas apud Gallos PORTALIUS, apud Italos pluries instituit TESTA (f).

(f) BIANCHI loc. cit.

279. Est igitur curandum in primis, ut diximus supra, ut multum aquæ frigidæ in caput eorum infundatur, qui ex mephiticis exhalationibus, & signanter ex vaporibus carbonum apoplectici evasere: id enim satis, ac cito eos juvat. Sanguis eorum ad summum, ut constat, rarefactus asperisionibus hujusmodi densatur, & ad naturalem statum facilius restituitur.

280. Nec minus nitendum, ut eorum cerebrum valde oppressum levetur, motusque sanguinis jam pene sufflaminatus augeatur: hinc venæ-sectio instituenda, signanter vero jugularium. Major autem sit, vel minor emissio sanguinis; iteretur etiam, prout rerum postulant circumstantiæ.

281. Verum sanguinis motus restituitur etiam, aptis in pulmones insufflationibus. Quo vero purior, majorique elasticitate donatus inducatur aer in hujusmodi apoplectici pulmones; eo magis, citiusque juvabit. Hinc minus aptus quidem censetur aer, quem homines expirant: at nihilominus fiat hæc insufflatio; quæ licet minus apta sit ad effectum, commodius tamen obtineri potest, citiusque. Felici eventu mu-

nerabatur pietas Chirurgi TOSSACHII (g): Ipse enim in os rustici cujusdam ex fumis apoplectici ore suo, tamquam Salvator, ut scribit SAUVAGESIUS, fortissime inspiravit, unde pectus ægri paullulum dilatatum, & cor pulsare cœpit. Hoc autem præcipue auxilio iterato post horam oscitavit, post alteram motum, sensusque recuperavit omnium anteaactorum immemor. Sed in horum apoplecticorum pulmones induci potest aer quoque atmosphæricus: idque sive siphonis ope, sive idonei follis. Quod si ægri os sit præclusum; per nares idem aer invehi potest.

282. Opportunum quoque est hujusmodi ægrorum corpus fricare: sic enim ad circumferentiam a centro moti revocantur humores. Extant quamplurima exempla apoplecticorum hujusmodi, qui uno frictionum usu convaluerunt omnino (h). Præstat autem eosdem fricare manibus, sive pannis aceto intinctis: sic enim densantur rarefacti humores.

283. Remedium insuper censetur aptissimum *fluor alcalinus volatilis*. Hac vero me-

(g) Ess. d' Edimburg Tom. VI. Art. XXXVI. Tota hæc ipsa observatio videri potest etiam apud MARTINIUM Della Morte apparente degli Animali ec.

(h) MICHAEL ADOLPHUS Dissert. De Friction. apud BLANCHUM Loc. cit. & apud MARTINIUM Loc. cit.

rhodo remedium hoc adhiberi solet : primo quidem duo veluti fusuli chartæ dicto liquore imbuti in nares inducuntur ; deinde ejusdem spiritus guttæ decem , aut duodecim aqua immixtæ deglutiendæ exhibentur . Huic tamen remedio anteferunt alii celebrem , quam dicunt *Lucis aquam* ; quæ ex spiritu salis ammoniaci , & ex oleo karabis componitur . Non impedita vero deglutatione , aquæ limonata potus est exhibendus .

284. Postremo observationibus iterum , iterumque institutis compertum est , plurimos hujus speciei apoplecticos convaluisse vapore electrico in eorum corpora injecto . Hic quidem vapor , quum valde , ac cito agat in omnes corporis partes extimulando , imo vero immediate in cor ipsum , potest ejus rursus excitare maximam irritabilitatem , quæ vitæ fons , & origo censenda est . Observationes autem , quibus hujus remedii patet utilitas , videri possunt apud plures Auctores , apud celeb. præcipue BERTHOLONUM (i) , & apud humanissimum BLANCHUM (k) .

Q

(i) De L'électricité du Corps Humain Dans l'état De Santé , et De Maladie Tom. I. pag. 517. et suiv. et Tom. II. pag. 91.

(k) Loc. cit.

*Ratio Medendi Apoplexiæ, quæ ex pectore
male affecto exoriatur.*

285. **E**xpositum fuit (n. 172.) apoplexiam haud raro exoriri, quum spasmus pectoris viscera, eorumque vasa perstringens viam præcludit sanguini e cerebro in cor regredienti. Tunc ergo nitendum est, ut spasmus auferatur: hoc autem in casu utilem, vel maxime futuram censeo sanguinis missionem ex jugularibus. Hæc enim, observante Celeber. HALLERO (1), non modo pulmonem levat, qui spasmo obstrictus solet sanguine opprimi; sed & sanguini in cor refluenti viam sternit, eique etiam quiescenti restituit motum. Si vero spasmus pectoris a materia irritante exoriatur in primis viis latente; tunc præmissa venæ-sectione irritans causa est evacuanda.

286. At vidimus quoque apoplexiam gigni, siqua pars, quæ pectori infideat, materieî vitiatæ de prima sede demigret, & aliquo modo

(1) Memoires sur le mouvement du sang pag. 301. ac Element. Physiolog. Tom. III. Lib. VIII. Sect. IV.

in nervos cerebri transferatur. Quæ materies & solo pectore detenta, sympathicam apoplexiam efficere potest aliquando, si nervos pectoris torqueat spasmus, qui cerebro communicetur. Apoplecticis hisce ea sunt exhibenda remedia, quæ juxta diversam causarum vellicantium, five prementium naturam, accommodatiora videantur. Siqua tamen methodo fieri possit, nitendum est fere semper, ut e pectore materies vitata exturbetur.

CAP. XXIV.

*Ratio Medendi Apoplexiæ Nervææ Idiopathicæ,
& primo illi, quæ a summa præcipue nervorum sensilitate, ac mobilitate exoritur.*

287. **Q**uid agendum, quum apoplexia est vere convulsiva, quumque exoritur a solis nervorum turbis, eorumque motuum irregularitate? Nos remedia seligenda docebunt morbi gradus, Ægri temperamentum, vires, ætas, sexus; maxime vero ejus major, vel minor sentiendi vis, mobilitas, irritabilitas, atque procatharticæ causæ indoles, qua in ægro nervi male afficiantur.

Si morbus ergo ad summum pervenerit gradum, præstabit continuo aerem liberiores red-
dere, faciem frigida aspergere, nares aceto ir-
rorare: si vero ægra sit hysterica, graveolentes
diffundantur odores, clystereſque ſuppeditentur
anti-spasmodici, quibus & Opium addatur,
præſertim ſi cauſa adſit dolorifera, atque irri-
tans. In ægris enim peculiari irritabilitate, ac
ſenſilitate præditis ad degluttonem reſtituen-
dam clyſmata Opio commixta laudantur val-
de (m). Si contra morbus haud maxime ſæ-
viat, præ oculis habere debemus pediluvia, fo-
mentationes, venæ-ſectiones; antiſpaſmodica in-
terna, inter quæ præcipue valerianæ infuſum,
vel quidquid tandem habet ſpaſmum compeſce-
re, & ſenſilitatem nimiam moderari.

288. Verum (n. 90. 91. 92.) aſſeruimus
prægnantes, parientesque mulieres, utpote ſpa-
ſmis nervorum, ita & nerveæ ſatis obnoxias
eſſe apoplexiæ. Nitendum ideo in primis eſt,
ut cauſæ arceantur a mulieribus hiſce tum phy-
ſicæ, tum morales, quæ habent earum nervos
urgere, atque adeo periculofum morbum exci-

tare: consultius enim est illum evitare. Aver-
tantur ergo ab illis, quam fieri potest, animi
commotiones, merus signanter mortis ex partu,
qui illarum insensibilis nervis solet eas sæpe
torquere.

Quod ad causas vero phycas, quæ plures
esse possunt, hoc unum attingam; gravidas nem-
pe mulieres plethoræ sæpe, ac phlogisticæ dia-
thesi obnoxias esse, uti adnotavit TISSOTIUS (n),
idemque ego quidem pluries observavi. En er-
go causæ nervis insensæ nimis, quæque possunt
peculiari vi apoplexiam promovere. Expediet
itaque in prægnantibus plethoram compescere,
phlogisticamque dispositionem: quod quidem il-
lis haud parum afferet utilitatis partus tempore,
ac puerperii.

289. At quoniam partus præsertim angu-
stia, ac puerperii difficultates minantur eam,
de qua agimus, apoplexiam; idcirco inter ejus
remedia præservativa Opium eminere videtur.
Me quidem haud latet Opium ab aliquibus re-
probari Clariss. Viris (o): ast in extremis præ-
sertim partus nixibus, ac protinus expleto partu

(n) Tratt. De' Nervi Tom. II. Part. I. Cap. VIII.

(o) LEVRET L' Art Des Accouchem. pag. 138.

optimum videtur aliquando futurum . Tunc enim animus agitur quammaxime , & corpus ; ideoque spasmus dominari solet semper metuendus . Quare viri experientissimi , ut spasmus vel averterent , vel compescerent , Opium suppeditarunt . Hos inter SWIETENIUS recensetur , qui sic loquitur : *candide fateor me semper adhibuisse opiata post partum , nec pœnituit unquam , cum sancte testari possim , quod nunquam inde ullam noxam viderim* (p) .

290. Opium vero magis videtur adhibendum , si puerpera sit convulsionibus obnoxia , sique illis præcipue tempore graviditatis fuit conflictata . Neque hujus remedii vis calefaciens est metuenda : phlogistica enim dispositio , siqua adsit , retundi poterit apta venæ-sectione ; & Opium parva dosi iteratis vicibus propinatum vim præcipue exeret spasmos compescentem . Quod adeo verum est , ut viri præclarissimi Opium exhibeant & in morbis inflammatoriis omnino , dummodo adsit spasmus (q) .

291. Neque ab Opio est abstinendum si viribus ægræ deficient , pulsusque arteriarum pro-

(p) Comm. Aphor. 1324.

(q) MURRAY loc. cit. pag. 202.

dant exiguos, five evanescentes: cordis enim motum auget, pulsusque roborat, expanditque (r). Hoc idem cum plerisque affirmat TRALLESIIUS (s) se observasse in iis quoque, quorum pulsus ob nimias evacuationes torpuit valde. Quid vero, si adsint hæmorrhagiæ, earumve metus? Videbimus alibi, Opium hæmorrhagias amovere, atque sedare.

292. Ex dictis huc usque colligitur in hoc morbo adhibenda esse remedia tantum sedativa, anodyna, antispasmodica; rejicienda autem esse stimulantia. Sed quod ad stimulantia; numne & vesicatoria semper vitanda sunt & omnino in spasmodica apoplexia? Licebit ne unquam ea ægris præcipere, qui natura sint, aut pro tempore sensiles satis, irritabilesque? Approbandum omnino videtur hoc generale principium, quod nempe abstinendum sit a stimulantibus, si de spasmodica, seu convulsiva agatur apoplexia. Ast in medicis generalia principia satis coarctantur: si enim intuitu primo videntur lumen nobis afferre, nos ipsos tamen dubitatione, atque obscuritate obrutos relinquunt, quum ad parti-

(r) MURRAY loc. cit. pag. 191.

(s) De Opio Sect. I. pag. 64. apud Murrayum loc. cit.

cularia discutienda descendimus. Videndum igitur est, quibus casibus possint, quibus nequeant aptari ea generalia principia, sui que limites statuendi sunt. Quæ quidem omnia præstare unice possunt sedula observatio, atque experientia.

293. Quod vero ad rem pertinet nostram; negari quidem nequit, vesicatoriis inesse extimulantem vim, quæ sæpissime maximos vehit spasmos, & irregulares in eos, qui sensiles valde sunt, atque irritabiles. Quapropter HOFFMANUS (t) scripsit sequentia: *si corpus acutioris sensus est; si æger a levissima causa movetur, magnasque facile in corpore experitur mutationes, ætas juvenilis, habitus corporis strictior, & macilentus; morbus etiam in paroxysmo, & impetu constitutus, vel locus, cui vesicatorium apponi debet, admodum nervosus, longe major motuum exacerbatio cum præsentaneo damno inde expectanda; ea propter ab iis abstineri consultius est.*

294. Sed contra e plerisque constat observationibus (u) cantharides ipsas habere ali-

(t) Differrat. De Vesicator. usu §. XIV.

(u) Vide inter cæteras. Prima Raccolta di Osservazioni Mediche pag. 113, e segg. del Dottrissimo Dottor TARGIONI TOZZETTI.

quando convulsivos morbos compescere, eosque sanare. Hinc perspicaciores quidam Medici sibi suadent, nervos cantharidum actione diversimode extimulari, quam ab aliis extimulantibus: ex qua diversa irritandi ratione salutare repetunt, quos in morbis convulsivis aliquando vident, effectus. Conjiciunt enim, cantharides nunquam stimulos excitare irregulares, atque tumultuarios in nervis, quos contra supponunt ab earum actione æquabiliter corroborari, aut saltem ab ipsa eam debilitatem, mollitiemque nervorum imminui, quæ est fomes turbarum, juxta Recentiores, atque irregularitatum, quas in nervorum systemate observamus.

295. Quidquid tamen de hac explicatione sentire velimus; haud equidem ex negligi possunt observationes, ex quibus deprehendimus, vesicantium actionem aliquando profuisse morbo convulsivo laborantibus. At quum pariter compertum sit, vesicatoria, ut supra innuimus, maximas turbas, irregularitates motuum periculo plenas, spasmosque satis perniciosos in iis sæpe promovere, qui nervis ægrotant; hinc difficile est statuere, quibus, & qua ratione apponendum sit vesicatorium correptis apoplexia, quum

vel omnino a nervis, vel saltem pendeat ex parte.

296. Præcipue tamen animadvertendum videtur, quoad hos ægros, eam vesicatoriorum signanter attendendam esse actionem, quam exerunt in partes corporis solidas: spasmodicæ quidem apoplexiæ a solidis, non vero ab humoribus, ferme semper pendere videntur. Hinc juxta solidorum diversam constitutionem, diversos in his vesicantia gignent effectus. Quare si partes solidæ generatim rigescant nimis, distendantur, extimulentur; si nervi præcipue plusquam satis tenelli existant, nimiumque mobiles; a vesicatoriis abstinendum est omnino.

297. Videtur vero, exhibitis primum cæteris tutioribus remediis, & vesicatoria apponi posse ægris, a quorum tum nervis abesse deprehendatur teneritudo illa summa, mobilitasque, tum ab aliis solidis illa nimia rigiditas, atque distentio, quas modo commemorabamus. Sperandum enim forte esset, quod aucto in nervis quibusdam motu ex vesicatoriis, in aliis autem eo imminuto, tunc irregularitas motuum auferatur, & quoddam veluti æquilibrium exsurgat inter diversas totius systematis partes;

ficque tollatur morbus. Novit jamdudum HIPPOCRATES, suborto in duobus membris dolore, stimuloque, alterum ab altero sæpe compesci. Quod vero id observassent Medici aliqui, vesicatorium, ut puto, inter anti-spasmodica recensuerunt remedia (x).

298. Ex hac vero, quam dicam libenter *revulsionem nervosam*, intelligi potest, qua fiat ratione, ut spasmus in membro aliquo excitatus arte, in alio spasmus morbosum, ac perniciosum destruere possit. Neque aliter mihi videtur explicari posse, cur convaleant partes convulsæ, spasmusque locali laceffitæ, adhibitis tempestive extimulantibus. Si enim dolor colicus sæviat convulsivus, non ne evanescit, aliquando vesicatorio, quod ventri apponatur? Addendum est quoque sympathias (quidquid sit de ratione, qua eas explicare conantur) satis innuere salutares hujusmodi nerveas revulsiones dari posse. Ipse Cel. TRALLESIIUS, licet sæpe vesicantia improbet ægris, quibus ea probant alii celeberrimi Viri; non tamen in morbis nervorum ea rejicit omnino. In sexta enim

(x) Bibliotheque Méd. Phys. Du Nord Tom. I. pag. 31.

regularum, quas Ille ad usum vesicatorii rectum in morbis sancivit, ita se se exprimit: (y) *In morbis nervorum a sola ataxia spirituum, ad stylum SYDENHAMI, pendentium caute cum vesicantibus agendum*. Itaque procedendum caute commendat, ab ipsis tamen non absterret omnino.

299. Ego quidem fateor me quammaxime abhorreere a vesicatoriis, atque a stimulantibus quibuscumque, siquidem agatur de morbis a sola ataxia spirituum: sed quum rerum circumstantiæ id ferre videbantur, aliquando adhibendum duxi hujusmodi remedium, quod & profuisse multum deprehendi. Memoranda præ cæteris videtur quædam D. PORTA, quæ sæpe horrendis artuum convulsionibus erat obnoxia, hystericeque suffocationibus ita validis, diutinisque, ut mortem illi imminere sæpe putarent adstantes. Die quadam vocatus eam inveni hysterico caro, ut ajunt aliqui, detentam: initio quidem expergiscebatur, sed momento temporis: subinde per horas ferme viginti opprimebatur omnino. Post omnimodam quietem aliqua sup-

(y) Loc. cit. Sect. Poster. pag. 5.

peditabam artis auxilia ; sed nihil illi proderat . Vesicatoria tandem præcepi , quæ cruri utrique apponerentur ; eorum actione convaluit omnino , ac cito .

Quod quidem observavi terve , quaterve in quadam nobilissima Moniali , quæ care hysterico adeo diutino obnoxia erat , ut plus semel eam metuerem apoplecticam futuram . Aliis Ipsa remediis nihil aliquando adjuta , vesicantium ope convalebat omnino . Liceat tamen hoc loci adnotare , quod nunquam capiti , sed partibus ab eo remotis semper apponenda vesicantia præcepi .

Ex hisce ergo satis constare videtur , non semper , & omnino in nervosa , ac vere convulsiva apoplexia a vesicantibus abstinendum ; sed imo ex hoc remedio multum aliquando levaminis esse expectandum , dummodo idonee , atque tempestive adhibeatur .

*Curatio Apoplexiæ, quam peculiariter
diximus Sensorii Communis.*

300. **L**icet omnis unice nervea apoplexia possit ex spasmo, sive paralyfi, sive quacunque alia insensibili *sensorii*, ut ajunt, *communis* læsione inferri; hoc tamen loci dicimus cum BOERHAAVIO apoplexiam præcipue *sensorii communis* (n. 84.), quæ ab animi commotionibus gignitur: quæ licet aliquando sanguinea quoque sit (n. 85.), aliquando biliosa (n. 150.), tamen haud raro invenitur simpliciter nervosa. At væ illi, qui hujusmodi corripiatur apoplexia: Medicos semper terruerunt vel maxime morbi, quos animi motus, affectusque efficiunt: eos enim fere semper observarunt aut cito, aut fero in mortem desisse; aut saltem ex his difficillime, & raro homines convaluisse.

301. In apoplexia ab hac causa orta fatendum quidem est, omnia in corpore integra videri aliquando: re tamen vera principium illud extinguitur, quod sentit, movet, *impetum facit*. Id autem animadversione dignum; quod

nempe principium illud *impetum faciens* aliquando velut suffocant materiales causæ; quum ex. gr. sanguis coacervatus cerebrum opprimit: sublata tamen ejusmodi compressione principium illud reviviscit, solitasque vires resumit; quod quidem rarius observamus, si agat in illud immaterialis causa; videlicet, ut supra diximus, animi motus, affectionesque. Tunc principium illud enervatum aut quam difficillime reficitur, aut extinguitur penitus; interitusque certus subsequitur. Hinc optime scripsit BOERHAAVIUS: (2) *Patet ratio, quare Medici in aliis curationibus felices, hic deficient; quia causa latet in hoc mobili sensorio communi, ita ut harum miseriarum sæpe tantum testes esse possint. Hoc fatebatur quoque HELMONTIUS dicens: quando apoplexia oritur a superbia ideæ, hanc remedia Paracelsica non curant, nam malum est spirituale.*

302. In tanta nihilominus curationis difficultate illud animadvertendum puto, quod nempe violentæ animi commotiones, ut plurimum, in cordis viciniis, sicut vidimus, magnam co-

(2) De Morb. Nerv. Tom. II. pag. 224.

gunt sanguinis quantitatem: hinc venæ - sectio, si per circumstantias licebit, haud parvi subsidii aliquando esse poterit. Præterea apoplectico ex validis quibusdam animi perturbationibus juvamen afferre possunt frigidæ ablutiones; habent enim compescere humorum rarefactionem, quæ hisce in casibus solet deprehendi.

CAP. XXVI.

Curatio Apoplexiæ, quæ ex dolore originem ducat.

303. **Q**uum dolor immanis cerebrum ita afficit, ut apoplexiam gignat, quæ statim haud mortifera sit; curandum est remediis excitantibus, præcipue aceti usu, ut æger velut exanimatus reviviscat. Continuo vero nitendum, ut doloris causa amoveatur.

304. Sed aliquando nequæ doloris causam Medicus detegere, nec potest remove. Tunc remediis uti oportet, quæ sin minus causam, doloris sensum saltem auferant. Si enim compressione validissima, aut sectione, aut quovis modo commercium auferatur inter partem do-

lentem, & cerebrum, permanente doloris causa, ejus sensus perit omnino. Aliquando vero nec præstat, nec potest siue doloris causam, siue commercium illud auferri: tunc reliquum est, ut nitamur facultatem cerebri sentientem narcoticorum usu sopire.

305. Expediet semper spasnum cerebri, ut ajunt, priusquam exoriat, arcere, Opium exhibendo, quum dolor sævit valde; idque præstabit, licet dolor inflammatorius esset. Hujusmodi vero remedium opportunissimum videtur in dolore intestinorum siue convulsivus ille sit, siue inflammatorius: in hoc tamen consultius erit Opium suppeditare post venæ-sectiones, clystereque emollientes. Vidimus jam (n. 120.) passionem iliacam vehementem gignere aliquando spasticam apoplexiam: sed ad illam quidem passionem compescendam Opium præcipue requiritur, a quacumque causa ea ortum habeat, maxime vero si simpliciter *spasmodica* sit, quam quidem observavit, & scitissime descripsit præstantissimus CALDANIUS (a). Experientia ali-

R

(a) Societ. Italic. Tom. IV. pag. 311.

quatenus hæc confirmat HAENIUS (b) asserens
in Colica Pictonum *ad præcavendam paralyfin ,*
Opio nihil præstantius dari , potèntiusque , propter
dolorum sopimentum .

CAP. XXVII.

Curatio Apoplexiæ , quæ oritur ex exinanitione .

306. **U**t recte apoplecticis hisce medea-
mur , exploranda est evacuationis species , quæ
apoplexiâ fecerit nervorum vires infirmando .
Hæc enim si ab hæmorrhagia efficiatur ; tunc
curandum in primis est , ut hæmorrhagiam com-
pescamus , atque sistamus : subinde odoribus ,
ac aliquo spiritu æger est excitandus ; & , si fieri
potest , cibo , potu , somno , ac quiete reficien-
dus . Sed jam fere cito pereunt hujusmodi
apoplectici .

307. Si ergo narium est hæmorrhagia , ad-
ministranda sunt omnia , quæ hanc sistere so-
lent : sed puerperas præsertim , ut vidimus , hæc

(b) Rat. Med. Part. III. Cap. II. pag. 103.

adoritur apoplexia. Tunc curandum statim est, ut præter alia auxilia, Obstetrix in ægræ pulmones insufflans cordis nitatur irritabilitatem revocare; eodemque vero tempore hæmorrhagiam quoque sistamus, necesse est. Clariss. SAXTORPHIUS (c) novam docet methodum, quæ cohibeantur post partum uteri hæmorrhagiæ: innuit nempe aquam aceto permixtam in utero injectandam. Hac quidem repetita injectione sanabantur ægræ, licet ex hæmorrhagia jam frigida, quibus arteriæ pulsus, spiritusque deficiebant: sanabantur quoque, quæ ex pervicaci sanguinis fluxu convellebantur, atque deliquiis premebantur. Illud quoque adnotari meretur, quod iis ægris potum prius gelidum suppeditaverant frustra, gelidasque fomentationes.

308. Verum non debet hoc loci prætermitti aliud potentissimum in hæmorrhagiis gravidarum, ac parturientium sistendis remedium; scilicet Opium, quod in hæmorrhagia nocet, quæ vel ab aucto sanguinis motu, & expansione, vel ab illius putrida dissolutione exoritur; sed juvat quam maxime in hæmorrhagia, quæ

(c) Giornale Veneto per servire alla Storia ec. Tom. I.
pag. 446.

vel a spasmo, vel a stimulo nascitur, vel conjunctum dolorem habet: *In fluxu nimio mensesum*, inquit MURRAYUS (d), *vel hæmorrhagia post abortum, quæ in connubio doloris dorsi, vel abdominis non inflammatorio incidit, & revertitur aucta vehementia, quoties vel dolor redit, vel increscit, Opium adstringentibus omnibus est præferendum*; & paullo post subdit, Opio hæmorrhagias uteri feliciter sisti prope finem graviditatis obortas, illasque etiã immodicas, & periculo plenas, quæ partum statim subsequuntur.

309: Videtur insuper, & rationi consonum, quod experientia confirmat; scilicet Opium cum spiritu vitrioli conjunctum majorem adhuc utilitatem asserre in gravidarum, ac parturientium hæmorrhagiis (e). Opium enim turbas compescit; spiritus autem vitrioli impedit, quominus illud humores accendat, ac rarefaciat, motumque augeat circulationis.

Quod ad gravidas vero mulieres, evidens est ad fœtus educationem deveniendum esse, si hæmorrhagia supradictis resistat artis subsidiis.

(d) Loc. cit. Tom. II. pag. 224.

(e) Giornale per servire alla Storia ec. Tom. II. pag. 309.

& MURRAY Tom. II. pag. 225.

310. Quod si apoplexia ortum habuit ab excessivis alvi evacuationibus; tunc nitendum in primis, ut earum impetus retundatur, & quidquid stomachum irritat, atque intestina, vel leniatur valde, vel removeatur: stimulo autem existente, optimum remedium in Opio invenitur. Subinde naturæ viribus subvenire oportet ope cordialium.

311. Si vero apoplexiâ oriatur vel ab inedia, vel a mœrore, vel a marasmo senili, vel a quibuslibet dissolventibus, & confumentibus morbis; tunc ægri crura, pedesque calidis fricentur pannis; ejusque olfactus satis validis odoribus excitetur. Siquid vero deglutire queat, vinum exhibeatur, quod satis energeticum sit: suppedientur inde nutrientia, & tonica, quæ tamen non sint irritantia. *Nova hic medela*, inquit celeber. TISSOTIUS (f), *adhibenda*. *Cra-
sis humorum, & copia restituenda; motus vita-
lis languens excitandus; roborantibus itaque, nu-
trientibus, & sollicita evacuantium evitacione
nititur curatio*. At semper fere lethalis est hæc apoplexia, quæ præcavetur magis, quam sana-

(f) Epist. var. arg. pag. 88.

tur, quoniam ultimæ elaborationis liquidum deficiens non adeo cito restituitur, uti se exprimit de hac loquens apoplexia TRALLESIIUS (g).

CAP. XXVIII.

Curatio Apoplexiæ, ex acrimonia.

312. **D**ifficillima semper curatu est hujus generis apoplexia, quum suas in ægrum explicuerit vires. Quare prophylactica potius methodo præcavendum est, ne qui acrimonia quacumque ad hanc apoplexiam inclinati sunt, ab ipsa corripiantur: hinc variis morbi causis, ut ajunt, proegumenis aptanda sunt tum remedia, tum ratio præcipue vivendi. Fateor, inquit SAUVAGESIUS (h), *illas principiorum diversitates in apoplexia actuali curanda parvi esse momenti ob lethalitatem hujus morbi; verum iterum dico ad prævertendam apoplexiam causarum proegumenarum varietas est attendenda.*

313. Quum tamen in hisce apoplecticis materia quædam acris, calida, ac subtilissima vi-

(g) Loc. cit. Sect. Post. pag. 39.

(h) Nosolog. Class. VI. Ord. V.

deatur nervos occupare, ut inter cæteros adnotavit SENNERTUS (i), & quum solidas corporis partes satis tensas; fluidas vero sulphureis, subtilissimis, acribus scatentes particulis adnotet SCARDONA (k); prædiligenda hinc erunt remedia, quæ refrigerent, humectent, sedent; cujus generis sunt clysteria emollientia, hordei decoctiones, lactis serum, & naturalis aqua.

314. Nec tamen negligerem semper, quæ possent remedia a capite dimovere acrem materiem, quæ ibi satis vicens insideret. Ab ipsis imo vesicatoriis multum juvaminis sperandum est, si in nervos dominetur materies, sive exanthematica, sive podagrica, sive rheumatica, aliave hujus generis. Incipiendum tamen est a venæ-sectione, si apoplexia adoriatur ægrum sub morbi arthritici, vel rheumatici initio: si vero morbo invadat progrediente, & ægri fractæ sint vires, a venæ-sectione abstinendum est; & vesicatoria, & balnea irritantia sunt usurpanda. TRALLESIIUS idem (l) ægris hisce probat vesicatoria.

(i) Lib. III. Part. V. Sect. II. Cap. IV.

(k) Loc. cit. Aphor.

(l) Loc. cit. Sect. Poster. pag. 6. & Sect. Prior. pag. 269.

315. Verum quum acrimonia etiam biliosa fere semper in hæc corpora sicca dominetur, illa eliminanda erit, aliqua præmissa venæ-sectione, pthyfannis cum tamarindis, cassia, aut manna largo potu exhibitis; acria enim purgantia observatum est nocuisse quam maxime.

CAP. XXIX.

Ratio curandi Paralyfim, quæ Apoplexiam generatim consequitur.

316. **O**bservamus quotidie, apoplexia vel ingruente, vel declinante varios excitari morbos; & præcipue quidem apoplectici solent evadere hemiplectici: vidi tamen bis hemiplegiam præcessisse per plures dies apoplexiam. Brachia in hoc morbo majorem quam crura semper produnt læsionem, difficiliorumque admittunt curationem: pulsus vero in parte paralyti affecta mollior est fere, quam in sana; & aliquando ob arteriæ paralyfim pene evanescens. Interdum partes paralyticæ molem suam servant; interdum evadunt aut œdematosæ, aut atrophicæ, aut gangrænosæ: unicuique vero pa-

ter, primi generis hemiplegiaco minus esse metuendum.

317. Id. autem adnotandum observavi, quod apoplexia aliquando deficit, aut saltem definit valde, superveniente post tempus aliquod hemiplegia; non secus, atque si crisis fieret. Sed hanc hemiplegiam, ut ita dicam, salutiferam adnotamus præcipue, quum apoplexiam effecerit materies quædam, quæ in nervos subtilis, mobilisque dominetur.

318. Præterea in hemiplecticis alia quoque diversa observantur symptomata, prout cerebri status differt, ægrorumque natura. Aliquorum enim paralyfim comitantur dolores capitis, vertigines, aurium tinnitus, hisque similia: aliqui vero hemiplegiaci ventriculo laborant, vesica urinaria, aliisque incommodis juxta diversorum nervorum læsionem: alii vix ullam patiuntur animi sensationem, alii contra vel summe tristes, vel præter solitum hilares.

319. Paralyfis ex apoplexia difficillimæ est curationis; imo semper metuendum, ne ipsa denuo invadat apoplexia. Pervicacior autem est, quæ serosam, sive pituitosam consequitur apoplexiam, quam quæ sanguineam. Major ve-

ro spes est curationis quum hemiplegia subsecuta est apoplexiam biliosam ; & major adhuc si spasmodica fuit apoplexia , dummodo æger sit non valde senex ,

320. Quum itaque sermo hic sit de ea tantum paralyfi , quæ apoplexiam consequitur ; constat qua medendi methodo apoplexiæ , eadem vires retundi hemiplegiæ : exoriantur enim iisdem ex causis . At quum apoplexiæ symptomata , ea præcipue , quæ cerebri compressionem significant , defecere , quumque longo tempore debilitatus est æger ; methodus curationis aliquando videtur , saltem ex parte , immutanda .

321. Si ergo paralyfim fecit apoplexia sanguinea , omnia arcenda sunt , quæ humores ad caput incitant , majorique impetu propellunt . Optima erunt remedia venæ-sectio , copiosa diluentia , ut serum lactis , decoctum graminis cum oxymelle , copiosus aquæ mellitæ potus , hisque similia . Si vero stricta sit alvus , optimam ferrent opem pulpa Tamarindorum , cremor Tartari , enemata emollientia . Sed præ omnibus tenuissima sit diæta oportet ; nunquam vidi hemiplecticum voracem (& plerique extant immodice voraces) diu vitam protraxisse .

322. Quod si paralyfis a serosa, vel pituitosa gignatur apoplexia; tunc remedia suppeditanda sunt, quæ validius agant. Hæc autem remedia sunt sapo venetus, extracta saponacea herbarum, salsa perilla, guajacum, sassafras, purgantia, diuretica, quæ parca dose iterentur, vesicatoria, atque setacea. In hac paralyfi usum quoque probant mercurii: inter mercurialia vero feligendus videtur mercurius dulcis summam habens vim tenuandi, & evacuandi. Majori autem detecta humorum viscositate Kermes minerale sæpe suppeditavi, nec pœnituit unquam.

Præterea solamen afferunt membrorum frictiones cum aromatibus, ac spiritus vini vapores, quibus partes paralyticæ nudæ exponantur: neque inutile remedium forte erit, si nempe æger membra paralytica in vinacea recentia demergat: intus enim penetrabit efficax illè gaz, quo illa redundant; sicque vasa omnia, omnesque fibras excitabit. Diæta vero sit paullo largior ex juniorum animalium carnibus, omnesque abjiciantur cibi, qui serum generant.

323. Verum sedulo vitandum erit quid stimulet, si paralyfim fecerit apoplexia sim-

pliciter spasmodica, quæ ab una nervorum scilicet mobilitate pendeat, nimiaque sensilitate. Exposuimus supra (n. 62.) clariss. adstante POMMIO, Marchionem quemdam ex hac hemiplegia convaluisse balneis unice domesticis, parvi pulli gallinacei jure, pluribusque aquæ communis clysteriis. At contra res in pejus ruebant, imminebatque rursus apoplexia, quum ipse remedium fumeret ex valeriana, cinnamomo, & cascarilla. Aufugiendum est ergo semper a stimulantibus.

Laudantur quidem hisce præsertim temporibus arnicæ folia, ejusque flores in paralyfi, aliisque spasticis morbis, ac convulsivis. Sed efficax hocce remedium prudenti satis eget administratione. Sensum enim fornicationis in artubus, & ventriculi molestissimum ardorem experiebatur quædam ægra, quam ego observabam, post glutitum florum arnicæ infusum. Alii vero vomitum observarunt, anxietatem, dolores lancinantes, & subinde quasi ab igne electrico succussiones (m).

324. Si vero paralyfis orta sit ab apoplexia, quam fecerint substantiæ narcoticæ; tunc

(m) MURRAY loc. cit. Tom. I. Ord. III. pag. 133.

imo exhibenda sunt, quæ stimulent, remedia. Quod si apoplexia fuerit ex metastasi materiei herpeticæ (n. 116.), vel rheumaticæ, vel arthriticæ, vel scabiosæ (n. 117.); tunc post balnea tepida, & copiosa diluentia optimus erit usus internus antimonii: addantur quoque decoctiones ex lignis sudoriferis, & tandem vesicatoria, jus viperinum, thermæ, electrizatio.

325. Sed aliquantulum hic immorari præstat ad tria hæc singillatim perpendenda remedia, quæ tum diversas in Medicos opiniones, tum varios invehunt in ægros effectus. Eorum itaque unum est jus viperinum, alterum electrizatio, alterum thermæ. Hæ autem, ut omnes norunt, ægris suppeditant aquas potandas, balnea, stillicidia, & luta; quæ omnia aliquando quammaximam hemiplegiacis afferunt utilitatem. At valde caute procedendum est: in paralyfi enim, quæ apoplexiam excipit sanguineam, quum tunc vel plethora adsit, vel saltem ad caput humores facile vergant, semper periculosa admodum sunt balnea thermalia, sæpe noxia omnino.

326. Neque prodesse possunt in paralyfi ex apoplexia biliosa, nisi prius ab omnibus for-

dibus primæ viæ satis expurgatæ sint: nocentimo indubie, si primis viis biliosa adhuc infundeat colluvies.

327. Quod si morbum fecerit materies vel rheumatica, vel arthritica, vel retropulsa scabies, vel intermittens male judicata febris (17)

(17) Forte suum extra locum binas hic subdo observationes, quum tantum relatæ fuerint in præsens a suavissimo Amico, doctissimoque Medico ALEXANDRO BONELLIO: utraque enim prodit apoplexiam cum paralyfi ex febrî periodica male judicata.

Quidam molestabatur ab annis aliquot periodicâ febrî, quæ eum solebat quocunque anni tempore hand rârô adoriri, & cui sensim conjungebatur acrimonia quædam pseudo-scorbutica. Plus tamen solito ægrum vexavit a vere usque ad autumnum labentem anni 1787. per id temporis vix ope chinæ-chinæ aliquando quiescebat febris, licet adhuc absque ullo dubio intermittens: Accessionem comitabantur dolor lumborum, capitisque, ejusque stupor, aliquando horripilationes; semper vero excessivæ oscitationes; nec æger sitiebat unquam: Declinabat febris, atque evanescebat nulla omnino crisi. Postrema febris, quæ eum corripuit mense Novembri haud cessit soli chinæ-chinæ, quæ tamen illam vicit cum tartaro emetico conjuncta. Æger sine febrî traducebat dies quinquaginta; viribus tamen mentis, corporisque exhaustus; sed de improvîso, quin ullum febris indicium adesset, hemiplecticus evasit, subinde post horas paucas apoplecticus cum

tunc a balneis thermarum multum boni sperari potest.

328. Aquarum mineralium balnea utilitatem afferunt quoque hemiplegiacis ex apo-

stertore, faciei pallore, pulsu exiguo, tremore, stimulisque ad vomitum. Post dies decem decessit.

Vir quidam nobilis temperamento ad atrobilarem vergenti præditus quoddam post rheuma corripiebatur febris duplici, ut ajunt, tertiana; quæ quidem remittebat saltem, sæpe etiam intermittebat omnino. Sub meridiem advenabat febris, comitantibus dolore scincipitis, oscitationibus violentis, tussique molesta: declinabat illa redeuntibus oscitationibus, quin ulla fieret sudoris crisis, aut urinæ: clausa imò semper erat alvus, ac pellis satis arida. Lenia exhibebantur purgantia, ad quorum actionem febris semper magis invalescebat: china-china autem suspenditata febrim per aliquot dies omnino suspendebat: hisce tamen apyrexiae diebus Æger mentē languebat maxime, & corpore. Redibat febris, quæ ter Cortici denovo cessit. Post febrim postremam, quam cortex suffocavit, stupebat ægro læva coxendix, ac mens ecclipsabatur: innovata rursus febris, quæ china-chinae subinde contumax restitit semper, exoriebatur sensim levis apoplexia, & perfecta hemiplegia. Post vicissitudines varias de repente evanuit apoplexia, quum in læva nate apparuisset gangræna: post paucas dies Æger moriebatur.

Equidem video fomitem febris periodicæ in hisce ægris eorum acrimoniis commixtum egisse. Fatendum tamen est, generalia nervorum symptomata, ac particularia

plexia serosa , atque pituitosa , dummodo illa frigida sint . Balnea enim , itemque potus aquarum mineralium , quæ calidæ essent , vires ægri magis attererent , magisque membra laxarent , & quidem metuendum esset , ne tum cerebri , tum medullæ spinalis substantia serositatibus obrueretur .

329. Præterea ex stillicidiis , & lutis , apud nos ex Aponensibus præcipue , multum haurient utilitatis hemiplegia correpti . Particulæ enim tenuissimi salis , sulphurisque , quibus lutum scatet , facile poros paralytici membri permeantes materiam percellent fibris coactam , tenuabunt , dissipabuntque ; sicque fibræ amissam recuperabunt elasticitatem : thermale autem stillicidium non tantum viribus aget medicatis , sed pondere quoque , & calore .

330. Animadvertendum tamen est , Balnea , luta , & Embrochationes magis , certiusque profutura in paralyfi , cujus causa sedem habeat

subsequuta fuisse varias febris sine crisi accessiones : hæc autem , feбри cessante , evanescebant . Fomes forte intermittens febris exstimulaverat , explicueratque naturalem acrimoniam ; hinc humorum depravatio . Ast actio fomitis febris periodicæ in his observationibus patet satis .

in tela cellulosa , qua omnia nervorum vasa obducuntur ; præcipue si nullum cerebro insit vitium , uti observavit inter alios BOERHAAVIUS , adnotavitque HALLERUS (n) . Paralytes enim post apoplexiam ferme nunquam sanabiles sunt , nisi cerebro in integrum restituto .

331. . Attentissime ergo expendendus est æger , antequam balneo thermali , stillicidio , lutisque subjiciatur : inter cætera autem status præsertim cerebri expendatur necesse est . Qui enim saliva profluente inquinati conspiciuntur , qui pendulum labrum , immotos oculos , dubiosve , stupidosve , qui memoriam notabiliter produnt imminutam , qui tandem aut sensiles sine causa , aut , quum causa sensibilitatis adsit , indifferentes se se offerunt ; hi sunt omnino a thermis absterrendi ; nisi cerebrum eorum ad sufficientiam convaleat : quod si convaluerit satis , est quoque procedendum caute . Hisce sine ulla dubitatione addendi sunt illi , qui ex quibusdam organicis præcordiorum affectionibus apoplectici , sive hemiplectici evasere . Memo-

S

(n) Prælect. HERMAN. BOERHAAV. Tom. II. §. 182.

res semper esse oportet moniti celeberr. TISSOTII (o) : *thermæ*, inquit, *paralyticis calore, & stimulo humores rarefaciunt, motum augent; sicque febrem, & plethoram generant; metus est, ne insultum apoplecticum denuo excitent.* Monito tanti viri addi meretur quoque illud MEADII (p), qui ita se exprimit: *ipse quidem novi nonnullos, qui cum varia Medicorum delusi spe ad thermas nostras Bathonienses profecti essent, ex aqua calida egres- si, mox iterum apoplexia correpti sunt, & perierunt.*

332. Cerebro tamen satis restituto non est spernenda saltem aliquandò, partis paralyticæ topica curatio: sublatis enim, aut saltem imminutis membri movendi resistentiis, solabitur cerebrum; quoniam causa in eo motrix, seu *impetum faciens* facilius ager. Præterea si iteratis observationibus compertum est (q) nervis inesse peculiarem energiam, quæ non a cerebro, sed forte ab alijs causis, &

(o) Epist. cit. pag. 103.

(p) Monit. Med. Cap. II. Sect. II. pag. 39.

(q) MONRO' Observations on the Structure Nervous System ec.; In Diar. Venet. cit. Tom. III. pag. 14., & seqq.

præsertim a vasis potius ortum habet (18); eo magis rationi consonum erit, magisque utilitati consultum inquirere, summaque diligentia perpendere membrorum paralyticorum constitutionem, & qua ratione in vasis eorundem moveantur humores, iisque topicam adhibere medelam.

333. At quid tandem de thermis dicendum est; quum hemiplegia spasmodicam conse-

(18) Celeberrimus hic Vir nervos circumvestiri putat a Pia Matre, quæ ipsis plurimum substantiæ cinereæ suppeditat. Id autem sibi persuadet tum quia nervi produntur obscuriores, quam pura medullaris substantia; tum quia eo crassiores evadunt, quo ab origine sua magis dimoventur: accedit etiam, quod secto animalis viventis uno ex nervis præcipuis, pars, quæ ab origine sua sejungitur, adhuc vivat nutrita. Observat insuper, de more humores circumagi, inflammationem aliquando excitari, vulnera conglutinari, ossa quoque consolidari in membro, quod ex nervi sectione immotum torpet, & sine sensu: quibus innixus præstantissimus MONROUS rationibus affirmat, energiam illam nerveam, quæ ad actionem tenuium vasorum requiritur, nervis suffici & a vasis Piæ Matris, quæ nervos circumvestit, & ab substantia cinerea, quam illa gignit. Hanc autem vim in nervos a vasis inductam confirmat pluribus observationibus: imo alia addit argumenta ex quibus infert, propriam quandam inesse nervis existentiam, atque energiam sine cerebri influxu.

quitur apoplexiam? Balneis tantum domesticis huc usque usus ego sum. In his enim paralyticis immanes turbæ quam facillime excitantur ex summa eorum irritabilitate, atque sensilitate: in eos dirus dominatur erethismus; ut probant subsultus, contractiones spasticæ, acutissimique dolores, quibus læsa eorum membra sæpe excruciantur. Id autem confirmatur magis, ex quo contactus vel levis, vel lenis sonitus, odoresque vel mites, licet gratissimi, hujus classis ægros exagitant, divexantque. Quot ergo turbæ, & quantæ excitabuntur in iis tum ex efficaci stillicidii impulsu, tum ex validis salis, sulphurisque vaporibus, quos balnea, & luta thermalia circumquaque diffundunt? Namque ex his haud parum excutiuntur, & qui natura firmissimi sunt. Quapropter paralytici hujusmodi blanda tantum methodo, imo lenissima curandi sunt.

334. Has quidem animadversiones plerique neglexere: hinc factum est, ut nonnulli opinarentur opposita de usu thermarum. Quæ quidem opiniones oppositæ magis confirmabantur ex quo alii pejus, alii melius se haberent, qui a thermis redibant.

Verum quidem est, ægri corpus præparandum, ut thermas utiliter adeat. Hujus tamen præparationis defectus non est semper (ut a quodam summo viro) culpandus, si æger a thermis detrimentum capiat. Non enim unice quoad corporis præparationem, verum etiam quoad ægri affectiones, atque constitutionem interpretari debemus illud HIPPOCRATIS; *quæ profuerunt, ob rectum usum profuerunt: quæ nocuerunt, ob id, quod non recte usurpata sint, nocuerunt.*

335. His autem disquisitis de thermarum usu, aliqua addere oportet de jure viperino. Hemiplegia, aliaque paralyfi correptis probant jus viperinum Medici plerique; quod tamen alii futile quiddam, & iners, alii contra nimis acre, irritans, calefaciensque existimant. BECCARIUS (r), ut aliquid certius statueret, summa cum diligentia, & sagacitate instituit experimenta, ex quibus deprehendit, viperis inesse succum quemdam mitissimum, gelatinosum, tenuissimum, imo & resolventem: nam sero sanguinis humani admixtus, expositusque eo calo-

(r) Instit. Scient. Bonon. Comment. Tom. II. Part. I. pag. 101.

ris gradui, quo serum in gelatinam cogi solet, hujus congelationem retardat: coagulato tandem hujusmodi sero, adhuc reliquum in eo invenitur quidpiam solutum, aqueumque. Neque ergo iners, neque inutile penitus est jus viperinum, quod contra aptumprehenditur, & ad serum viscosum, lentamque lympham leniter dissolvendam, & ad vividam, ut ita dicam, nutritionem præstendam.

Verum sicut energicæ viperarum particulae diversimode agunt juxta diversitatem ægrorum; ita nequeunt omnibus congruere. Observatum est enim, jus vipereum haud convenire ægris, qui vel diathesi phlogistica, vel febre lenta cum calore, vel nimia nervorum mobilitate, spasmissque vexentur; quibusque sit temperamentum irritabile satis, atque biliosum. Substantia viperarum validius, quam par est, ægros hujusmodi commovet, ac calefacit, ut quotidie observamus; sed hac ipsa ratione innuitur utilis futura hemiplecticis, quibus vires vitales, solidæque corporis partes languescant; lymphæ vero lenta sit, atque viscosa. Optimum ergo remedium erit in paralyssi tantum, quæ apoplexiæ serosæ, vel pitui-

tosæ, vel alicui metastaticæ succedat, uti adnotavimus supra.

336. At difficilior quidem est statuere, quibus suppeditanda, quibus deneganda sit electrizatio; remedium utique aliquibus paralyticis satis utile, aliquibus contra satis metuendum. Observationes eadem, licet multiplicentur in dies, nondum patefaciunt omnino, quibus remedium hujusmodi utilitatem, quibus nocumentum sit adlaturum.

Pro certo quidem constat, electrizationem solidas corporis partes excitare, fluidas dissolvere, pulsus accelerare, hæmorrhagias promovere, impetuque majori humores in caput impellere; imo & convulsiones excitare, ac paralyses gignere aliquando. Quos quum effectus electricitatis observarent experientissimi Medici, inter quos TISSOTIUS celeberrimus, statuerunt, eos unice ægros electrizandos esse, in quibus circulantium humorum acceleratio, eorumque rarefactio metui nequirent, aut spasmus nervorum.

337. Quæ quum ita sint, sin minus metuere omnino, saltem suspicari debemus ex hoc remedio iis damnum, qui ex apoplexia

sanguinea paralytici evasere; nec minus iis, qui, quum paralytici sint ex apoplexia quacunque, vel cerebrum produnt adhuc deordinatum satis, vel spasnum, contracturam, & immodicam membri paralyti affecti, aliorumque sensibilitatem.

338. Has vero veluti leges, quæ jure videntur sancitæ, haud satis scrupulose observant Medici plures, qui solent quotidie electrico uti vapore. Omnes quidem in hoc conveniunt, quod nempe electrizatio vel aliquid damni, vel nihil utilitatis adferat iis, qui gravem adhuc produnt cerebri læsionem. At restituto sufficienter cerebro tentandam putant electrizationem: affirmant enim, eas adesse methodos, quibus vel ægro satis efficax suppeditetur electricitas, quæ vehementer stimulet, atque dissolvat, vel mitis ejus actio aptetur, quæ leniter resolvat obstructa, rigentia laxet, irritata sedet. Videtur ideo aliquibus lenis tentanda electrizatio etiam in hemiplegia, quæ veram subsequitur, vel præcedit apoplexiam sanguineam, restituto tamen satis cerebro. At magis audendum in paralyti, quæ a pituitosa, vel serosa exorta sit apoplexia: vis enim efficax electricitatis habebit glu-

lis metallicus inhærens virgæ metallicæ, quam manu quis terræ communicans teneat. Quod si ægrum nimis sensilem notabili afficiant molestia scintillæ; membrum paralyti affectum obducatur lamina plumbea, sive, ut libet MAUDUITIO clariss., panno laneo, qui carni adhæreat penitus: tunc super lamina, sive panno discurrat excitator, qui plures, lenesque scintillas exhauriet, lenique velut calore fovebitur membrum. Auctor citatus pluries se usum perutiliter fuisse hac methodo affirmat (s).

345. Majores tandem vires exercet vapor electricus, qui ex phiala Leydensi deducatur, vel ex quadrato magico: tunc enim alios præter effectus, artus concutit, commovetque. Licet autem Medici haud sæpe usi sint hac methodo, constat tamen multiplici experientia, concussiones hujusmodi electricas, prudenter adhibitas, fatis ægris plerisque profuisse. Perpendenda sedulo tum ægri, tum morbi natura, Medicus pro indigentia limitare potest locum, & efficaciam electricæ concussionis. Pars enim

(s) Memoir. sur les différentes Manières d'administrer l'électricité pag. 80.

corporis quælibet commoveri potest, intacto reliquo corpore: præterea, ut & per alias methodos, sic & per concussionem suppeditari electricitas potest ea mensura, quæ rerum prospectui apposita putetur.

346. Hoc quoque addendum puto pro iis, qui sunt mobiles, atque sensiles nimis: infideant ipsi telluri, & horum pars electrizanda vel sub conductore statuatur, vel sub catenula, quæ ab conductore pendeat: tunc electricitas in ipsos aget unice inter permeandum. Nam vapor in hos ægros immissus, ex ipsis continue in terram influet, quin ejus ulla fiat congeries. Hæc autem eadem electrizatio augeri poterit, ac minui juxta diversam tum corporis distantiam ab conductore, tum vaporis mensuram, qui in conductorem devehatur.

347. Hæc autem omnia dicebamus de positiva electrizatione; aliquid nunc addendum de negativa, cujus existentia multis evincitur observationibus, indubiisque. Dicimus hominem positive electrizatum, quum ante in ipsum inducta est electricitas major, quam sua naturalis exigit constitutio: negative electrizatum eum vocamus, cujus naturalis electricitas arte immi-

nuatur. Innuimus supra methodos eas, quibus positive quis potest electrizari; iisdem constat electrizari hominem posse negative; si negativa utamur machina. Adfunt enim multiformes tum positivæ, tum negativæ machinæ, ut videre est apud auctores: sed & possumus machinam solitam adhibere, dummodo ab anelectricis eam machinæ partem sejungamus, quæ conductori vaporem suppeditat; eique parti jungatur electrizandus negative, dum ab anelectricis, & ipse semotus sit.

348. Verum quidem est electricitatem quoque hujusmodi negativam agere in corpus humanum tanquam remedium aperiens, oscillationesque excitans; ideoque, siquid ego video, in paralyfi apoplexiam sanguineam excipiente vel semper metuendam, vel saltem maxima cum cautione esse administrandam: de materiali enim se habet ad eosdem, saltem ex parte effectus præstandos, quod vapor quamvelocissime se movens in corpus influat, sive effluat ex ipso. Sed peculiare quoque electrizationis negativæ utilitates affirmant plures experientissimi Viri, quas ut exponamus, aliqua sunt prænotanda.

Et primo quidem, pars substantiæ corpus humanum componentis idioelectrica est; scilicet natura sua cohibet in se vaporem electricum, cujus particulæ particulis ejus substantiæ immiscentur, assimilanturque ita, ut difficilius sejungantur: hunc autem vaporem *fixum* dicunt. Pars vero substantiæ humanum corpus componentis anelectrica est: nempe ad instar vasis recipit vaporem electricum, qui in ipsam incurrat, eam rursus relicturus, si deficiente generali electricitatis æquilibrio, in aliud corpus aditum pateat: & hunc vaporem *liberum* vocant.

Quum ergo quis electrizatur positive, oneratur ipse novo vapore libero, cujus pars, ut plerique conjiciunt, assimilatur substantiis idioelectricis hominis; nec ab ipsis avolat, ut vapor liber, quum homo idem iterum conjungitur cum anelectricis corporibus. Contra, quum quis electrizatur negative, expoliatur ipse, saltem ex parte tum vapore libero, tum quoque portione aliqua vaporis fixi, ut asserit cum aliis BERTHOLONUS; quæ quidem portio fixi, ut portio liberi, haud redit in corpus humanum statim, atque communicet iterum cum anelectri-

cis. Quare, inquit, præter communes utriusque electrizationis effectus; peculiaris effectus est positivæ augere, negativæ imminuere electricitatem corporis humani naturalem. At quidquid BERTHOLONUS conjectet, alique, ut vim explicent electricitatis negativæ; me quidem illud præcipue commovet, quod in semetipso observabat LICTHEMBERGIUS (t); quod nempe illæsus electrizabatur positive per horas aliquot; at contra negative vix electrizatus angustiis vexabatur, vertiginibusque.

349. Quum itaque plures opinentur nimiam irritabilitatem, nimiamque sensilitatem, ac inde partium spasticam contracturam, atque convulsiones a nimia electricitate pendere; ideo contra hæc vitia affirmant summum esse remedium electrizationem negativam, quæ aptissima est ad nimiam electricitatem naturalem imminuendam. Afferunt enim (u) pluries se observasse eorum tantum mortuorum, qui dum viverent, convulsionibus obnoxii erant, nervos excessive saturatos electricitate. Affirmant in-

(t) *Bibliothèque Du Nord* Tom. II. pag. 339.

(u) BERTHOLON *De L'electricité du Corps Humain* Tom. I. pag. 335.

super hujusmodi electrizationis theoriam apprimè cohærere experientiae: quamplures enim spasmodicis, & convulsionibus affectos ad salutem integram negativa electrizatione restitutos fuisse testantur. Et revera, inquiunt, in spasmodicis morbis, atque convulsivis; saltem sæpius, calida nocent remedia, & phlogistica; juvant contra refrigerantia, & antiphlogistica: at quid magis antiphlogisticum, quam negativa electrizatio, dum per hanc verus detrahitur humano corpore electricus ignis? Negativa ergo electrizatio videtur satis profutura hemiplecticis ex apoplexia convulsiva, qui spasticis contractionibus, convulsionibus, atque immodica sensibilitate vexantur.

350. Ast erit utilior tum positiva, tum negativa electrizatio, siquidem Medici utramque juvent victu, vestitu, aliisque idoneis remediis pro rerum exigentia.

Hæc erant, quæ veluti attingere putavi super electricitate. Quumque in dies augeatur utilitas, quam ex electricitateprehendunt Medici plerique clarissimi; id satis videtur cupiendum, quod hæc omnia generatim apud nos probe noscantur. Sunt enim inter nos, ut olim

inter externos, qui medicam electrizationem parvipendunt, ac velut inutilem experti sunt aliquando. Hisce tamen permotus nemo, ut auguror, efficax negligat remedium: si enim Medici, certa quadam constantia, suos compellant ægros ad Machinam electricam, &, quantum Medicum deceat, diligenter omnia perpendant, eo forte deveniemus, ut certius statui possit, quibus ægris, quibusque modis futura sit utilis, sive inutilis, sive nocens electrizatio: nostris hinc ægris quammaximum forte emolumentum, quod ab omnibus mecum cupiendum est.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A vendo veduto per la Fede di Revisione , ed Approvazione del *P. F. Carlo Dom. Bandiera* Inquisitor General del Santo Offizio di *Brescia* nel Libro intitolato : *DE APOPLEXIA PRÆSERTIM NERVEA COMMENTARIUS MS.* non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e parimente per Attestato del Segretario Nostro , niente contro Prîncipi , e Buoni Costumi , concediamo Licenza alli *Fratelli Pasini* Stampatori di *Brescia* , che possi essere stampato , osservando gli ordini in materia di Stampe , e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia , e di Padova .

Dat. li 28. Settembre 1788.

(GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN K. Rif.

(ZUANNE VALLARESSO Rif.

(FRANCESCO PESARO K. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 270. al Num. 2536.

Marcantonio Sanfermo Segr.

